

6 月 10 日上午 新三站考生回忆真题

1. 阵发性头痛伴恶心 10 年，头痛加重 6 小时

参考考官宝典题库 25 号题

简要病史：女性，48 岁。阵发性头痛 3 年，右侧头痛 6 小时门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及 相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

评分标准 总分 15 分

一、问诊内容 13 分



(一) 现病史 10 分

关注公众号，获取更多医考资讯

添加微信号，进群学习效果更好

1. 根据主诉及相关鉴别询问

发病诱因：有无劳累、紧张、饮食不当（不洁饮食、进食刺激性食物）或 服用药物，是否与月经周期相关。

1 分

头痛：具体部位、性质、程度、发作频率、每次持续时间，加重或缓解因素。 3 分

伴随症状：有无畏光和畏声、恶心、呕吐，有无视力减退、肢体活动障碍、抽搐、发热。3 分

2. 诊疗经过

是否曾到医院就诊，做过哪些检查：血常规、头颅 CT 或 MRI 。 1 分

治疗情况：是否用过止痛药物治疗，疗效如何。 1 分

3. 一般情况：近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况。 1 分

(二) 其他相关病史 3 分

1.有无药物过敏史。 0.5 分

2.与该病有关的其他病史：有无上呼吸道感染、高血压病史，有无烟酒嗜好，月经与婚育史，有无遗传性疾病家族史。

2.5 分

二、问诊技巧 2 分

1.条理性强，能抓住重点。 1 分

2.能够围绕病情询问。 1 分

2.女性，28 岁，停经 41 天，突然右下腹剧痛 2 小时，异位妊娠破裂，输血性休克参考考官

宝典题库 144 号题

病历摘要

女性，26 岁，停经 41 天，阴道淋漓出血 5 天，下腹剧痛 2 小时。

患者月经规律，周期 28-30 天，经期 5 天，量中，无痛经，末次月经 41 天前，停经后偶感乏力，5 天来淋漓阴道出血，2 小时前突发右下腹剧痛，呈撕裂样，伴恶心、呕吐、头晕，急诊入院，既往体健，否认传染病接触史。结婚半年，生育史：0-0-0-0。无传染病家族史。

查体：T37.4℃，P118 次/分，R26 次/分，BP80/50mmHg。平车推入病房，神志清，面色苍白，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 118 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹平软，腹肌紧张，右下腹压痛伴反跳痛，移动性浊音阳性。

妇科检查：外阴：已婚未产式；阴道：见少量暗红色血液；宫颈：举痛；子宫：稍大稍软，子宫右侧可触及不规则包块，约 6cm×5cm×4cm，软硬不均，压痛明显。

实验室检查：血常规：Hb35g/L，RBC 2.0×10^{12} /L，MCV80fl，WBC 11.1×10^9 /L，N0.80，Plt 210×10^9 /L

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个及两个以上诊断，应分别列出各

自诊断依据,未分别列出者扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上)。

考试时间: 15 分钟

评分标准 总分 22 分

一、初步诊断 4 分

1.异位妊娠(答“宫外孕”亦得 2.5 分) 2.5 分

2.失血性休克 1 分

3.失血性贫血 0.5 分

二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分) 5 分

1.异位妊娠

(1) 停经 41 天,阴道淋漓出血,下腹剧痛 2 小时,伴恶心、呕吐、头晕。1 分

(2) 腹部查体腹肌紧张,右下腹压痛伴反跳痛,移动性浊音阳性。1 分

(3) 妇科检查:阴道:见少量暗红色血液;宫颈:举痛;

子宫:稍大稍软,子宫右侧可触及不规则包块,约 6cm×5cm×4cm,软硬不均。压痛明显。1

分

2.失血性休克

(1) 阴道出血,头晕, BP80/50mmHg,面色苍白,心率 118 次/分。腹部移动性浊音阳性,提示腹腔内大量出血。0.5 分

(2) 血常规提示正细胞性贫血。 0.5 分

3.失血性贫血

(1) 阴道流血,头晕,面色苍白,心率 118 次/分。 0.5 分

(2) 血常规提示正细胞性贫血。 0.5 分

三、鉴别诊断 3 分

1.流产 0.5 分

2. 盆腔炎性疾病 (答“急性盆腔炎”或“急性输卵管炎”亦得 0.5 分)

0.5 分

3.急性阑尾炎 0.5 分

4.黄体破裂 1 分

5.卵巢囊肿蒂扭转 0.5 分



四、进一步检查 5 分 关注公众号，获取更多医考资讯 添加微信号，进群学习效果更好

1.HCG 检测 (答“血、尿妊娠试验”得 2 分)。 2.5 分

2.妇科 B 超。 1 分

3.阴道后穹窿穿刺。 1 分

4.血型，交叉配血。 0.5 分

五、治疗原则 5 分

1.积极纠正休克，纠正贫血。 2.5 分

2.同时行手术治疗。 2.5 分

3. (5 号题) 发热咳嗽病史采集

参考考官宝典题库 62 号题

简要病史：女孩，6 岁。发热 5 天，咳嗽 3 天门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及

相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

评分标准 总分

15 分

一、问诊内容 13 分

(一) 现病史 10

1.根据主诉及相关鉴别询问 发病诱因：有无受凉。 1 分

发热：程度、热型，有无畏寒或寒战。 2 分

咳嗽：性质、程度，加重或缓解因素。有无咳痰，痰的性状。 2 分

伴随症状：有无流涕、咽痛、呕吐，有无喘息、胸痛，有无皮疹，有无惊厥。 2 分

2.诊疗经过

是否曾到医院就诊，做过哪些检查：血常规、胸部 X 线片。 1 分

治疗情况：是否用过抗菌药物、退热药物、止咳化痰药物治疗，疗效如何。 1 分

3.一般情况：发病以来精神状况、饮食、睡眠及大小便情况。 1 分

(二) 其他相关病史 3 分

1.生长发育情况。 1 分

2.有无药物过敏史。预防接种史。 1 分

3.与该病有关的其他病史：有无反复发热、咳嗽病史，有无传染病患者接触史。 1 分

二、问诊内容 2 分

1.条理性强，能抓住重点。 1 分

2.能够围绕病情询问。 1 分

左背部痛部病例分析参考考官宝典题库 248 号题

病历摘要

男，65 岁，项部皮肤硬肿伴疼痛、发热 5 天。

患者 5 天前自觉颈后部痒。自己挠抓后有少量血迹，然后出现皮肤硬肿、疼痛，随后皮肤硬肿

范

围逐渐增大，疼痛加剧。伴有畏寒、发热、乏力。糖尿病史 18 年，口服降糖药物治疗，未规律监测血糖。

查体：T39°C，P99 次/分，R22 次/分，BP130/85mmHg。体胖，神志清，皮肤巩膜无黄染。

颈部可见约 6cm×4cm 似椭圆形皮肤隆起区。色暗红，中央呈紫褐色，表面有多处脓点。颈部两侧可触及数枚肿大、质韧淋巴结，有触痛，心、肺、腹部、脊柱四肢查体未见异常。

实验室检查：Hb 125g/L，WBC20×10⁹/L，N 0.70，Plt290×10⁹/L。尿糖（+++）。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

考试时间：15 分钟

评分标准 总分 22 分

一、初步诊断 4 分

1.项部痛 3 分

2.2 型糖尿病 1 分

二、诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分；未分别列出各自诊断依据，扣 1 分）5 分

1.项部痛

(1) 项部皮肤硬肿、疼痛伴畏寒、发热、乏力。 1 分

(2) 项部似椭圆形皮肤隆起区，色暗红，表面多处脓点。颈部两侧可触及肿大淋巴结，有触痛。

2 分

(3) 血白细胞计数和中性粒细胞比例升高。 1 分

2.2 型糖尿病：老年患者，有长期糖尿病病史，尿糖阳性。 1 分

三、鉴别诊断 4 分

1. 疖或疖病 2 分

2.急性蜂窝织炎 1.5 分

3.神经性皮炎 0.5 分

四、进一步检查 4 分

1.血生化、血糖，尿酮体 1 分

2.脓液细菌培养+药敏。 2 分

3.血培养+药敏。 1 分

五、治疗原则 5 分

1.静脉应用抗生素。 1 分

2.控制血糖。 2 分

关注公众号，获取更多医考资讯

添加微信号，进群学习效果更好

3.手术治疗：麻醉下行“+”或“++”形切开。 2 分

4.男，50 岁，腹痛 5 天

参考考官宝典题库 16 号题

简要病史：男性，45 岁。左上腹痛伴腹胀 5 小时急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

评分标准 总分 15 分

一、问诊内容 13 分

(一) 现病史 10 分

1.根据主诉及相关鉴别询问发病诱因：有无进食油腻食物、饱餐、饮酒、服用药物。 2 分

腹痛：性质、程度、持续时间，有无放射及转移，加重或缓解因素（与进食和体位的关系）。 2

分

腹胀：程度，加重或缓解因素。 1 分

伴随症状：有无寒战、发热、胸闷、胸痛，有无反酸、烧心、恶心、呕吐、腹泻，有无头晕，心悸。 2 分

2.诊疗经过

是否曾到医院就诊，做过哪些检查：血、尿淀粉酶检查，心电图，腹部 B 超或 CT。 1 分

治疗情况：是否禁饮食、用过止痛药物治疗，疗效如何。 1 分

3.一般情况：发病以来大小便、肛门排气情况及近期饮食、体重变化情况。 1 分

(二) 其他相关病史 3

1.有无药物过敏史。 0.5 分

2.与该病有关的其他病史：有无心血管疾病、消化性溃疡、胆囊炎、胆石病、肾结石病史。

有无外伤、手术史。 2.5 分

二、问诊技巧 2 分

1.条理性强，能抓住重点。 1 分

2.能够围绕病情询问。 1 分

5.女，27 岁，停经 41 天，阴道淋漓出血，腹痛，腹部平稳，左侧包块血红腹白 144 号题

病历摘要

女性，26 岁，停经 41 天，阴道淋漓出血 5 天，下腹剧痛 2 小时。

患者月经规律，周期 28-30 天，经期 5 天，量中，无痛经，末次月经 41 天前，停经后偶感乏力，5 天来淋漓阴道出血，2 小时前突发右下腹剧痛，呈撕裂样，伴恶心、呕吐、头晕，急诊入院，既往体健，否认传染病接触史。结婚半年，生育史：0-0-0-0。无传染病家族史。

查体：T37.4℃，P118 次/分，R26 次/分，BP80/50mmHg。平车推入病房，神志清，面色苍

白，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 118 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，

腹平软，腹肌紧张，右下腹压痛伴反跳痛，移动性浊音阳性。

妇科检查：外阴：已婚未产式；阴道：见少量暗红色血液；宫颈：举痛；子宫：稍大稍软，子宫右侧可触及不规则包块，约 6cm×5cm×4cm，软硬不均，压痛明显。

实验室检查：血常规：Hb35g/L，RBC 2.0×10^{12} /L，MCV80fl，WBC 11.1×10^9 /L，N0.80，Plt 210×10^9 /L

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个及两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出者扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上）。

考试时间：15 分钟

评分标准 总分 22 分

一、初步诊断 4 分

1.异位妊娠（答“宫外孕”亦得 2.5 分） 2.5 分

2.失血性休克 1 分

3.失血性贫血 0.5 分

二、诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分） 5 分

1.异位妊娠

(1) 停经 41 天，阴道淋漓出血，下腹剧痛 2 小时，伴恶心、呕吐、头晕。1 分

(2) 腹部查体腹肌紧张，右下腹压痛伴反跳痛，移动性浊音阳性。 1 分

(3) 妇科检查：阴道：见少量暗红色血液；宫颈：举痛；子宫：稍大稍软，子宫右侧可触及不规则包块，约 6cm×5cm×4cm，软硬不均。压痛明显。1 分

2.失血性休克

(1) 阴道出血，头晕，BP80/50mmHg，面色苍白，心率 118 次/分。腹部移动性浊音阳性，提示腹腔内大量出血。0.5 分

(2) 血常规提示正细胞性贫血。 0.5 分

3. 失血性贫血

(1) 阴道流血，头晕，面色苍白，心率 118 次/分。 0.5 分

(2) 血常规提示正细胞性贫血。 0.5 分

三、鉴别诊断 3 分

1. 流产 0.5 分

2. 盆腔炎性疾病（答“急性盆腔炎”或“急性输卵管炎”亦得 0.5 分） 0.5 分

3. 急性阑尾炎 0.5 分

4. 黄体破裂 1 分

5. 卵巢囊肿蒂扭转 0.5 分

四、进一步检查 5 分

1. HCG 检测（答“血、尿妊娠试验”得 2 分）。 2.5 分

2. 妇科 B 超。 1 分

3. 阴道后穹窿穿刺。 1 分

4. 血型，交叉配血。 0.5 分



五、治疗原则 5 分

关注公众号，获取更多医考资讯

添加微信号，进群学习效果更好

1. 积极纠正休克，纠正贫血。 2.5 分

2. 同时行手术治疗。 2.5 分

6. 患者女性，18 岁主诉 2 天前因眼部瘙痒自行到药店买滴眼液，今日晨起时发现鼻部两侧皮肤呈带状红斑，伴瘙痒，余无其他不适，查体：沿双眼内侧到下颌处可见境界清楚的红斑

(1) 最有可能的诊断

(2) 该病的治疗原则

1 211 号题

病历摘要

女性，28 岁。面部红斑 5 个月，多关节肿痛 1 周。

患者 5 个月前无诱因出现面部红斑，日光照射后明显，伴频发口腔溃疡，有脱发，未诊治。1 周前出现双手指、双腕关节肿胀、疼痛，无发热，发病以来大小便及睡眠均正常，体重无明显变化。

既往体健，否认传染病接触史。无手术、外伤史。未婚，月经正常。无遗传病家族史。

查体：T36°C，P78 次/分，R18 次/分，BP115/70mmHg。面部皮肤发红，可见散在皮疹，高出皮肤，呈蝶形分布，无瘙痒及压痛。浅表淋巴结未触及肿大。舌尖部可见 3cm×3cm 大小溃疡。甲状腺不大。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 78 次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双手掌指关节、近端指间关节、双腕关节有压痛，右腕关节肿胀。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb120g/L，WBC7.5×10⁹/L，Plt205×10⁹/L。粪常规（—）。尿蛋白（++），尿沉渣镜检 RBC5-6/HP，ANA1:640（均质型），抗 dsDNA 抗体 150IU/ml，抗 ENA 抗体（—）。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个及两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出者扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上）。

考试时间：15 分钟

评分标准 总分 22 分

一、初步诊断 4 分

系统性红斑狼疮 4 分

二、诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分） 5 分

1.青年女性。 1 分

2.面部红斑，多关节炎，光过敏，口腔溃疡，脱发。 1 分

3.查体：面部蝶形红斑，口腔溃疡，多关节压痛，右腕关节肿胀。1.5 分

4.ANA 阳性，抗 dsDNA 抗体阳性，尿蛋白 (++)，尿沉渣镜检 RBC5-6/HP 1.5 分

三、鉴别诊断 3 分

1.类风湿关节炎 2 分

2.肾小球疾病 1 分



四、进一步检查 4 分 关注公众号，获取更多医考资讯 添加微信号，进群学习效果更好

1.复查血常规，尿常规。 1 分

2.24 小时尿蛋白定量。 1 分

3.抗心磷脂抗体 (ACL)，补体 C3、C4。 1 分

五、治疗原则 6 分

1.休息、避免日光照射。 1.5 分

2.糖皮质激素治疗。 2.5 分

3.免疫抑制剂治疗。 2 分

7.【例】女性，28 岁。下腹疼痛 2 天，加重 1 天。

患者 2 天前无明显诱因出现下腹疼痛，无发热，无呕吐、腹泻，在当地医院口服解痉药物，未缓解。1 天前腹痛较前加重，以下腹为主，伴恶心。既往体健，月经规律。生育史:1-0-1-1。

查体:T 37.6°C，P 90 次/分，R 22 次/分，BP 120/80mmHg。一般情况可，双肺未闻及干湿性啰音。全腹有腹肌紧张、压痛，压痛以右下腹为著，反跳痛 (+)。

妇科检查:子宫大小正常，表面光滑，活动。左侧附件区未触及包块，无压痛。右侧附件区可触及一约 10cm×10cm 大小的囊性包块，张力较高，压痛 (+)。实验室检查:血常规:Hb 107g/L，

RBC 3.4×10¹²/L，WBC 11.2×10⁹/L，N 0.80，Plt 175×10⁹/L。

一、初步诊断 (4 分)

1.卵巢囊肿蒂扭转 (3 分)

2.急性腹膜炎 (1 分)

【例】女性，28 岁。下腹疼痛 2 天，加重 1 天。

二、诊断依据 (5 分)

1.卵巢囊肿蒂扭转

(1) 青年女性，急性起病，以右下腹疼痛为主要症状，伴恶心 (1 分)

(2) 全腹压痛，以右下腹为著 (1 分)

(3) 妇科检查：右侧附件区可触及一约 10cm×10cm 大小的囊性包块，张力较高（或者活动受限），压痛 (+) (1 分)

2.急性腹膜炎

(1) 查体：全腹有腹肌紧张，压痛，压痛以右下腹为著，反跳痛 (+) (1 分)

(2) 血白细胞总数及中性粒细胞比例增高 (1 分)

三、鉴别诊断 (4 分)

1.黄体破裂 (1 分)

2.急性阑尾炎 (1 分)

3.异位妊娠 (1 分)

4.急性盆腔炎 (1 分)



关注公众号，获取更多医考资讯

添加微信号，进群学习效果更好

四、进一步检查 (5 分)

1.腹部及腹部 B 超检查 (2 分)

2.腹腔镜检查 (1 分)

3.血β-hCG 检测、血清 CA125 检测 (2 分)

五、治疗原则 (4 分)

1. 尽快行手术治疗 (3 分)

2. 抗菌药物治疗 (1 分)

(第一站) (1) 听诊心包摩擦音, 心电图: 室颤, 左束支传导阻滞 肺: 哮鸣音

(2) 病史采集: 腹痛、呕吐

参考考官宝典题库 21 号题

简要病史: 女性, 42 岁。反复发作上腹痛 3 年, 加重伴呕吐 1 周门诊就诊, 既往有“十二指肠球部溃疡”病史。

要求: 你作为住院医师, 请围绕以上简要病史, 将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间: 11 分钟

评分标准 总分 15 分

一、问诊内容 13 分

(一) 现病史 10 分

[关注公众号, 获取更多医考资讯](#)

[添加微信号, 进群学习效果更好](#)

1. 根据主诉及相关鉴别询问

发病诱因: 有无劳累、季节变化、精神紧张、饮食不当 (不洁饮食、进食刺激性食物) 及服用药物。1 分

腹痛: 具体部位、性质、程度、发作频率及规律性, 有无放射及转移。加重或缓解因素。2 分

呕吐: 次数, 呕吐物性状、气味、量、与进食的关系。2 分

伴随症状: 有无发热、腹胀、便血、大便性状及规律改变。2 分

2. 诊疗经过

是否曾到医院就诊, 做过哪些检查: 肝功能、肾功能、血电解质、胃镜或消化道钡餐造影。1 分

治疗情况：是否用过抑酸剂、抗酸剂或胃黏膜保护剂治疗，疗效如何。 1 分

3.一般情况：发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况。 1 分

(二) 其他相关病史 3 分

1.有无药物过敏史。 0.5 分

2.十二指肠球部溃疡诊治情况。 0.5 分

3.与该病有关的其他病史：有无肠道疾病、肝胆疾病病史。有无手术、外伤史。月经与婚育史。

有无肿瘤家族史。2 分

二、问诊技巧 2 分

1.条理性强，能抓住重点。 1 分

2.能够围绕病情询问。 1 分

8. (3) 病例分析：左侧股骨骨折，失血性休克

参考考官宝典题库 203 号题

病历摘要

男性，28 岁。车祸外伤后左大腿疼痛、畸形伴活动障碍 3 小时。

患者 3 小时前骑自行车时与汽车相撞，伤后左大腿疼痛、肿胀、畸形，不能活动，无意识障碍，

由救护车送急诊就诊。伤后无呼吸困难，无恶心、呕吐，未排大小便。既往体健，无手术、外伤

史及药物过敏史。父母身体健康，无遗传病家族史。

查体：T36.9℃，P116 次/分，R21 次/分，BP85/60mmHg。神志清楚，表情淡漠，痛苦面容，

口唇苍白，胸部压痛（—），双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 116 次/分，律齐，腹平

软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（—）。

骨科专科检查：左大腿中段皮肤完整、局部肿胀、向外侧成角畸形，有反常活动。左足趾活动正

常，左足背动脉搏动弱。

实验室检查：血常规：Hb100g/L，WBC 6.7×10^9 /L，Plt 120×10^9 /L。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个及两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出者扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上）。

考试时间：15 分钟

评分标准 总分 22 分

一、初步诊断 4 分

1.左股骨干骨折 2 分

2.失血性休克 2 分

二、诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分） 6 分

1.左股骨干骨折

(1) 外伤史：车祸外伤后左大腿疼痛、畸形伴活动障碍。 1 分

(2) 左大腿中段肿胀、向外侧成角畸形，有反常活动。 2 分

2. 失血性休克

(1) 表情淡漠，口唇苍白。 1 分

(2) 血压下降（85/60mmHg），心率增快（116 次/分） 1.5 分

(3) 血红蛋白降低。 0.5 分

三、鉴别诊断 2 分

1.左大腿软组织损伤。 1 分

2.病理性骨折。 1 分



四、进一步检查 5 分 关注公众号，获取更多医考资讯 添加微信号，进群学习效果更好

1.左股骨正侧位 X 线片。 2 分

2.左下肢血管超声。 1 分

3.血型、凝血功能检查。 1 分

4.心电图。 1 分

五、治疗原则 5 分

1.抗休克治疗。 2 分

2.待休克纠正、生命体征平稳后，行骨折切开复位内固定或手法复位外固定。 2 分

3.康复治疗。 1 分

9. (三站) (35 号题) 测身高，腹部四分区，腹部柔软度，压痛，反跳痛，液波震颤检查，巴氏征检查



关注公众号，获取更多医考资讯

添加微信号，进群学习效果更好