

1. 【答案】D

【解析】氯苯那敏还具有抑制中枢和抗胆碱作用，故服药后有困倦感、口干、便秘、痰液变稠及鼻黏膜干燥。

2. 【答案】C

【解析】伏立康唑属于肝药酶的抑制剂，与地西泮合用，会使地西泮的血药浓度增加。

3. 【答案】E

【解析】吗丁啉是多潘立酮的商品名。

4. 【答案】E

【解析】室温 10~30℃；阴凉处不超过 20℃；凉暗处不超过 20℃并避光；冷处 2~10℃。

5. 【答案】C

【解析】人促红素震荡后会改变其二级结构，导致先前隐藏的抗原决定簇暴露或产生具有免疫原性的结构，促使人促红素具有抗原性，使得一些促红素生成制剂较易刺激人体产生抗体，从而出现纯红细胞再生障碍性贫血。因此人促红素不能震荡。

6. 【答案】B

【解析】可卡因属于精神刺激剂，会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生性快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力。因而并列为兴奋剂管理。

7. 【答案】C

【解析】本题考查滴速的计算。 $100 \times 15 / 60 = 25$ 滴。

8. 【答案】C

【解析】中药学文摘、医学索引属于二级信息，药物信息手册、中国药典属于三级信息。

9. 【答案】E

【解析】胰腺分泌的胰液对消化脂肪起关键作用，当急性胰腺炎伴脂代谢紊乱时再注射脂肪乳注射液会加重病情。

10. 【答案】D

【解析】加替沙星对糖尿病患者可能增加其出现高血糖或低血糖症状的隐患，并影响肾功能，故糖尿病患者禁用。

11. 【答案】E

【解析】万古霉素具有强烈扩血管作用，在快速大剂量滴注时会出现“红人综合征”。

12. 【答案】D

【解析】肝脏合成胆固醇峰期在夜间，晚餐后服用调血脂药他汀类有助于提高疗效。泼尼松属于糖皮质激素类，早 8 点给药；美洛昔康、奥利司他餐中给药。

13. 【答案】D

【解析】促胃肠动力药餐前服用以利于促进胃蠕动和食物向下排空，帮助消化。氨茶碱片、呋塞米片清晨给药；吡罗昔康片餐中给药；头孢呋辛酯片最好餐后给药。

14. 【答案】D

【解析】甲硝唑会产生双硫仑样反应，因此服用甲硝唑期间，不要饮酒。

15. 【答案】E

【解析】胃粘膜保护剂硫糖铝、果胶铋等，服药后在胃粘膜中形成保护膜，服药后1h内尽量不要饮水，避免保护层被水冲掉。

16. 【答案】B

【解析】无

17. 【答案】B

【解析】BMI < 18.5，体重过低；18.5~23.9为体重正常；24~27.9为超重；BMI ≥ 28.0为肥胖。

18. 【答案】C

【解析】体重指数（BMI）= 体重（kg）/ 身高²（m²）. 90/1.8²=27.8

19. 【答案】B

【解析】无

20. 【答案】D

【解析】酵母片为助消化药，餐前服用；硝酸甘油片在心绞痛发作舌下含服，不可嚼碎；氧氟沙星滴眼液打开后，4周内用完；红霉素眼膏可涂敷于眼睑内，红霉素软膏不可以。

21. 【答案】C

【解析】能透过胎盘的药物特点包括脂溶性高、分子量小、与血浆蛋白结合率低、碱性药物。

22. 【答案】D

【解析】地西洋脂溶性高，较易进胎盘。ABE为酸性药物不易进乳汁，华法林血浆蛋白结合率高也不易进乳汁。

23. 【答案】A

【解析】四环素和钙离子发生络合反应，影响胎儿骨骼发育异常。

24. 【答案】E

【解析】无

25. 【答案】A

【解析】右美沙芬属于镇咳药，镇咳药在服用后会出现眩晕、幻觉，影响驾车，故驾驶员慎用。

26. 【答案】E

【解析】水痘由水痘-带状疱疹病毒引起，属于病毒感染，病毒感染常见淋巴细

胞增多。

27. 【答案】B

【解析】无

28. 【答案】B

【解析】无

29. 【答案】D

【解析】无

30. 【答案】C

【解析】根据患者描述，应该是感染了沙眼，沙眼应选C答案。色甘酸钠滴眼液治疗过敏性结膜炎；玻璃酸钠滴眼液、七叶洋地黄双苷滴眼液治疗视疲劳；毛果芸香碱滴眼液用于散瞳。

31. 【答案】C

【解析】治疗流感的神经氨酸酶抑制剂有奥司他韦、扎那米韦。

32. 【答案】C

【解析】复方酚咖伪麻胶囊中含有伪麻黄碱，会使血管收缩血压升高。

33. 【答案】A

【解析】无

34. 【答案】C

【解析】无

35. 【答案】E

【解析】双歧三联活菌制剂可用来治疗因菌群失调导致的腹泻。

36. 【答案】B

【解析】无

37. 【答案】E

【解析】无

38. 【答案】C

【解析】双八面体蒙脱石为止泻药；聚乙二醇 4000 为泻药；莫沙必利、多潘立酮为促胃肠动力药。

39. 【答案】B

【解析】瘙痒明显，阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物说明是由白色念珠菌引起的真菌性阴道炎，此时首选硝酸咪康唑。

40. 【答案】B

【解析】无

41. 【答案】B

【解析】局部较小面积轻度烫伤，可以外涂京万红、湿润烧伤膏等，B正确。烫伤创面不可涂有颜色的药物，如红汞、甲紫；切忌用塑料布包扎或覆盖创面；血容量不足时，镇痛、镇静不用氯丙嗪（低血压）；补液时不宜喝白开水或无盐

饮料，以免发生水中毒。故 ACDE 错误。

42. 【答案】E

【解析】患者，患有青光眼 3 年，异丙托溴铵为 M 胆碱拮抗剂，会使眼内压升高，故有青光眼的患者不宜使用。

43. 【答案】D

【解析】无

44. 【答案】A

【解析】无

45. 【答案】A

【解析】无

46. 【答案】B

【解析】苯海索属于抗胆碱药，闭角型青光眼以及前列腺肥大患者禁用，老年患者慎用。

47. 【答案】C

【解析】阿尔茨海默病患者应避免使用有抗胆碱作用的药物：颠茄、东莨菪碱、苯海拉明、苯海索、奥昔布宁、三环类抗抑郁等。

48. 【答案】C

【解析】抑郁症急性期及维持治疗、伴有睡眠障碍和焦虑障碍的抑郁症用 NA 能及 5-HT 能抗抑郁药米氮平。

49. 【答案】C

【解析】抗抑郁药起效较慢，大部分抗抑郁药至少 2 周才能发挥疗效。

50. 【答案】E

【解析】患有胃食管反流病的患者避免使用加重反流症状的药物，包括 CCB、 α 受体激动剂、 β 受体激动剂、茶碱类、硝酸盐、镇静剂、雌激素；同时停用可引起食管损害的药物：米诺环素、氯化钾、铁剂、奎尼丁、双磷酸盐。

51. 【答案】A

【解析】硫脲类的不良反应包括：过敏反应（最常见）、粒细胞减少（最严重）、红斑系统样症状（荨麻疹、关节痛）。

52. 【答案】C

【解析】无

53. 【答案】A

【解析】抗癫痫药所致的骨质疏松需要长期口服维生素 D 400~800 IU/d。

54. 【答案】D

【解析】无

55. 【答案】A

【解析】 α_1 肾上腺素能受体阻断剂典型的不良反应是体位性低血压。

56. 【答案】E

【解析】无

57. 【答案】C

【解析】无

58. 【答案】E

【解析】镇痛药给药是按时给药，E 答案的描述属于按需给药，所以是错误的。

59. 【答案】D

【解析】本题考查绝经激素治疗的禁忌症，包括激素依赖性肿瘤（乳腺癌、子宫内膜癌）、近6个月内有血栓栓塞性疾病、严重肝功能障碍、血卟啉病、耳硬化症等。

60. 【答案】E

【解析】无

61-63 【答案】ABE

【解析】无

64-66 【答案】BDC

【解析】无

67-69 【答案】ABD

【解析】无

70-72 【答案】DAC

【解析】无

73-75 【答案】ABE

【解析】无

76-78 【答案】CEB

【解析】无

79-80 【答案】AC

【解析】无

81-82 【答案】CE

【解析】无

83-85 【答案】BDA

【解析】无

86-87 【答案】CE

【解析】无

88-90 【答案】EAC

【解析】无

91-93 【答案】BAC

【解析】无

94-95 【答案】CA

【解析】无

96-97【答案】BE

【解析】无

98-100【答案】BE

【解析】无