

中医妇科学

1. 下列各项不属于阴户的功能的是

- A. 是防御外邪入侵的第一道门户
- B. 是排月经、泌带下、排恶露之出口
- C. 是合阴阳之入口
- D. 娩出胎儿、胎盘之产门
- E. 排出月经的通道

2. 阴道的功能是

- A. 娩出胎儿
- B. 排恶露之出口
- C. 防御外邪入侵的第一道门户
- D. 阴阳交合的入口
- E. 娩出胎儿、胎盘之产门

3. 下列除哪项外均是玉门的别称

- A. 胞门
- B. 阴门
- C. 产门
- D. 子门
- E. 龙门

4. 胞宫的主要生理功能是

- A. 主月经
- B. 主带下
- C. 主孕育胎儿
- D. 主月经和孕育胎儿
- E. 主经、带、胎、产

5. 下列哪项不是“天癸”臻熟的条件

- A. 肾气充盛
- B. 脾气健旺
- C. 年已 18 岁
- D. 精血充实
- E. 肾阴充盛

(6~7 题共用备选答案)

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 季经
- D. 避年
- E. 居经

6. 妇女终身不来潮而能受孕者，称为

7. 受孕初期仍按月经少量出血而无损胎儿者，称为

8. 下列关于生理性带下的描述，错误的是

- A. 色白或无色透明



- B.质地黏稠
- C.其量适中
- D.无特殊气味
- E.从阴道内排出的一种阴液

9.预产期的计算是从

- A.末次月经结束那天算起
- B.受孕前月排卵期算起
- C.末次性生活算起
- D.末次月经第 14 天算起
- E.末次月经的第 1 天算起

10.妊娠月份已足，腹痛或作或止，腰不痛者，称为

- A.临产
- B.盛胎
- C.试胎
- D.弄胎
- E.正产

11.围产期是指

- A.孕期 28 周到产后 1 周
- B.孕期 28 周到产后 2 周
- C.孕期 29 周到产后 1 周
- D.孕期 29 周到产后 2 周
- E.孕期 29 周到产后 4 周

12.顺产的产妇，可以哺乳的时间是

- A.产后 30 分钟
- B.产后 24 小时
- C.产后 6 小时
- D.产后 8 小时
- E.产后 12 小时

13.婴儿可以添加辅食的时间是

- A.出生后 3 个月
- B.出生后 4 个月
- C.出生后 5 个月
- D.出生后 6 个月
- E.出生后 2 个月

14.下列各项易导致妇产科疾病发生的是

- A.风、寒、湿
- B.风、湿、热
- C.寒、热、湿
- D.寒、暑、热
- E.寒、湿、燥

15.血虚致冲任血海不能由满而溢，或失于濡养，不会发生下列哪种疾病

- A.痛经
- B.月经后期
- C.月经过少



- D.闭经
E.月经先期
- 16.以温胞饮为代表方的中医治法是
A.滋肾益阴
B.补肾养肝
C.补益肾气
D.补肾滋阴
E.温补肾阳
- 17.下列各项中不属于中药离子导入法治疗范围的是
A.子宫肌瘤
B.慢性盆腔炎
C.子宫内膜异位症
D.陈旧性宫外孕
E.外阴炎
- 18.下列各项，不属月经病主要病因的是
A.寒热湿邪
B.房劳多产
C.内伤七情
D.营卫不调
E.体质因素
- 19.下列月经病的治疗，错误的是
A.重在治本调经
B.分清先病和后病
C.急则治标，缓则治本
D.顺应不同年龄阶段论治
E.多用辛温暖宫之品
- 20.下列哪项不是月经先期之肝郁血热证的主症
A.月经提前 8 天
B.经量或多或少
C.经色淡、质稀
D.心烦易怒
E.口苦咽干
- 21.治疗月经先期之阳盛血热证，应首选
A.两地汤
B.逍遥散
C.当归芍药散
D.清经散
E.逍遥丸
- 22.下列哪项不是月经后期虚寒证的主症
A.经期延后，量少色淡，质清稀
B.小腹空痛，心悸失眠
C.腰酸无力
D.小便清长，大便稀溏
E.脉沉迟或细弱无力



23.患者，女，29岁，已婚。经期前后不定，量少，色淡，质稀，头晕耳鸣，腰痛如折，夜尿多，舌淡苔薄，脉沉弱。治疗应首选

- A.人参养荣汤
- B.十全大补汤
- C.大补元煎
- D.保阴煎
- E.固阴煎

24.月经过多常见的病因是

- A.气虚、血热、肾虚
- B.气虚、血热、血瘀
- C.血热、血瘀、血虚
- D.血热、肝郁、气虚
- E.气虚、血瘀、气滞

25.患者，女，19岁。月经29天一行，量多，色紫红，质稠，心烦，口渴，舌红苔黄，脉滑数有力。其诊断是

- A.月经过多血热证
- B.月经先期血热证
- C.月经先期虚热证
- D.月经先期肝热证
- E.月经过多气虚证

26.患者，女，28岁。近2月经量渐减，点滴即止，胸闷呕恶，带下量多，形体肥胖，舌淡苔白腻，脉滑。其诊断是

- A.月经过少之血瘀证
- B.带下病脾虚证
- C.月经过少之痰湿证
- D.月经过少之阴虚证
- E.月经过少之血虚证

27.下列哪项不是经期延长之阴虚血热证的主症

- A.月经持续8、9日，量少、色红、质稠
- B.小腹疼痛拒按
- C.咽干口燥
- D.手足心热
- E.舌红少苔，脉细数

28.患者，女，36岁，已婚。两次月经中间，阴道少量出血，色鲜红，头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，舌质红，苔薄，脉细数。其治法是

- A.益气补肾，固冲止血
- B.滋肾养阴，固冲止血
- C.养阴清热，固冲止血
- D.补肾养肝，固冲止血
- E.益气养阴，凉血清热

29.治疗月经先后无定期肾虚证，应首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.固阴煎
- C.定经汤

D. 归肾丸

E. 大补元煎

30. 崩漏的治疗原则是

A. 塞流与澄源结合

B. 澄源与复旧结合

C. 复旧与塞流结合

D. 固本与澄源结合

E. 急则治标，缓则治本

31. 患者，女，41岁。月经不规律8个月，现阴道出血39天，量时多时少，近3天量极多、色淡、质稀，伴气短神疲，面浮肢肿，舌淡苔薄白，脉缓弱。治疗应首选

A. 举元煎

B. 补中益气汤

C. 固本止崩汤

D. 清热固经汤

E. 保阴煎

32. 患者，女，29岁，已婚。近1年月经后期量少，现已停经4个月，伴五心烦热，潮热颧红，舌红少苔，脉细数。尿妊娠试验阴性。其治法是

A. 养阴清热调经

B. 理气活血通经

C. 豁痰活血通经

D. 益气养血调经

E. 补肾养肝调经

33. 患者，女，38岁，已婚。近几年形体渐胖，胸闷呕恶，倦怠乏力，月经停闭半年，平时带下量多色白，舌淡胖苔白腻，脉沉滑。尿妊娠试验阴性。治疗宜选用

A. 血府逐瘀汤

B. 苍附导痰丸

C. 参苓白术散

D. 开郁二陈汤

E. 香砂六君子汤

34. 下列各项，不属痛经气血虚弱证主症的是

A. 月经量少，色淡，质稀

B. 腹痛出现在行经之后

C. 神疲乏力，面色无华

D. 头晕眼花，腰痛如折

E. 下腹隐隐作痛，喜按

35. 患者，女，28岁，已婚。经前小腹疼痛拒按，有灼热感，平素少腹时隐痛，经来时疼痛加剧，低热，经色暗红，质黏，带下黄稠，溲黄，舌红苔黄腻，脉弦数。其治法是

A. 理气活血，化瘀止痛

B. 清热除湿，化瘀止痛

C. 益气补血，化瘀止痛

D. 养血柔肝，理气止痛

E. 调和营卫，化瘀止痛

36. 在下列各项中，属于经行乳房胀痛常见病因的是

A. 气血虚弱

- B.肝肾亏虚
- C.阴虚血热
- D.肾气亏损
- E.湿热阻滞

37.血虚引起经行头痛的特点是

- A.头晕，头部绵绵作痛
- B.颠顶掣痛，头晕目眩
- C.头痛剧烈，痛如锥刺
- D.头部胀痛重着
- E.头痛如裹，头晕目眩

38.经行感冒之邪入少阳证，治宜

- A.理气疏肝，和血调经
- B.活血化瘀，和血调经
- C.解表散寒，和血调经
- D.疏风清热，和血调经
- E.和解表里，和血调经

39.下列月经前后诸证中，除哪项外，均可由肝气郁结所致

- A.经行身痛
- B.经行吐衄
- C.经行水肿
- D.经行乳房胀痛
- E.经行头痛

40.经行身痛之血虚证的治法是

- A.养血益气，揉筋止痛
- B.补肾疏肝，和络止痛
- C.滋肾养肝，和络止痛
- D.疏肝理气，和络止痛
- E.活血通络，益气散寒止痛

41.下列各项属于经行泄泻常见病因的是

- A.脾肾两虚
- B.气血亏虚
- C.湿热内蕴
- D.肝郁火旺
- E.阴虚血热

42.患者，女，45岁，已婚。每逢月经将潮便泄泻，脘腹胀满，神疲肢软，面浮肢肿，月经量多，色淡质薄，舌淡红，苔白，脉濡缓。治疗应首选

- A.健固汤
- B.四神丸
- C.六君子汤
- D.痛泻要方
- E.参苓白术散

43.患者经行肢体肿胀，按之随手而起，经血色暗有块，脘闷胁胀，善叹息，舌紫暗，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A.四物汤

金域大医学网
JINYINGJIE.COM



- B.八物汤
- C.八珍汤
- D.失笑散
- E.五苓散

44.患者，女，20岁，未婚。每于经期鼻衄，量多、色深红，心烦易怒，口苦咽干，尿黄便秘，近3个月来，月经提前7天，量少、色红，舌红苔黄，脉弦数。其诊断是

- A.逆经肺肾阴虚证
- B.月经先期血热证
- C.逆经肝经郁火证
- D.月经先期肝郁化热证
- E.月经过少血虚证

45.经行情志异常之痰火上扰证的经血特点是

- A.月经量偏少，经色深红，质黏稠
- B.月经量少，夹有血块
- C.月经量多，色深红
- D.月经量少，色淡
- E.月经量多，色淡

46.绝经前后诸证的产生机制主要是

- A.肝血不足，冲任亏虚
- B.脾气虚弱，冲任失养
- C.肾气虚衰，天癸渐竭
- D.心肾不交，冲任失调
- E.心脾血虚，冲任俱虚

47.患者，女，49岁，月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选

- A.左归丸
- B.内补丸
- C.肾气丸
- D.两地汤合二至丸
- E.二仙汤合二至丸

48.带下量多的主要病机是

- A.湿邪伤及任督
- B.湿邪伤及脾肾经
- C.湿邪伤及冲任
- D.湿邪伤及任带
- E.湿邪伤及肝脾经

49.患者，女，27岁，已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄，胸闷心烦，纳少便溏，舌淡红，苔黄略腻，脉细。其治法是

- A.清热利湿止带
- B.健脾利湿止带
- C.健脾益气止带
- D.清热解毒止带
- E.补肾健脾止带

50.患者，女，32岁，已婚。带下量多，色淡黄，质黏稠，无臭气，面色萎黄，四肢不温，



舌淡，苔白腻，脉缓弱。治疗宜选用

- A.内补丸
- B.八珍汤
- C.健脾丸
- D.参苓白术散
- E.完带汤

51. 患者，女，25岁。带下过少，阴中干涩，头晕，心悸失眠，神疲乏力，经行腹痛，舌质暗淡，边有瘀斑，脉细涩。治疗应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬
- C.少府逐瘀汤
- D.小营煎加丹参、桃仁、牛膝
- E.左归饮加三棱、莪术

52. 治疗带下过少血枯瘀阻证，应首选的方剂是

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.四物汤
- D.小营煎
- E.六味地黄丸

53. 下列除哪项外，均是妊娠禁药

- A.峻下剂
- B.破血剂
- C.逐瘀剂
- D.和血剂
- E.有毒剂

54. 下列除哪项外，均为妊娠病的发病机制

- A.血聚养胎，阴血偏虚，阳气偏亢
- B.胎体渐大，气机升降失调
- C.寒湿停聚，冲任受阻
- D.肾气不足，无力系胞，胎元不固
- E.脾胃虚弱，化源不足，影响胎元

55. 妊娠恶阻的主要发病机制是

- A.脾胃虚弱，化源不足
- B.肝郁气滞，失于条达
- C.痰湿内停，中焦受阻
- D.重伤津液，胃阴不足
- E.冲气上逆，胃失和降

56. 患者孕三月余，小腹胸胁胀痛，情志抑郁，嗳气吐酸，烦躁易怒，苔薄黄，脉弦滑。其治法是

- A.调理气血，止痛安胎
- B.疏肝解郁，止痛安胎
- C.疏肝解郁，养血安胎
- D.养血行气，止痛安胎
- E.理气行滞，补肾安胎

全球医学网
WWW.JYINGJIE.COM

57. 下列各项，不属胎漏、胎动不安常见病因病机的是

- A. 肾虚
- B. 肝郁
- C. 血热
- D. 血瘀
- E. 气血虚弱

58. 患者，女，34岁，已婚。4年前因患子宫肌瘤自然流产1次，现妊娠43天，阴道不时少量下血，腰酸，胎动下坠，口干不欲饮，舌暗红，脉沉弦。治疗应首选

- A. 下瘀血汤
- B. 固下益气汤
- C. 补肾安胎饮
- D. 加味圣愈汤
- E. 桂枝茯苓丸

59. 患者停经50天，阴道少量出血3天。伴小腹隐痛，腰酸，恶心，纳差。舌淡红，苔白，脉细滑。妊娠试验阳性。其中医诊断是

- A. 胎漏
- B. 胎动不安
- C. 胎死不下
- D. 胎堕难留
- E. 激经

60. 患者，女，31岁，已婚。曾孕3次，均自然流产，腰酸膝软，小腹隐痛下坠，纳呆便溏，头晕耳鸣，尿频，夜尿多，眼眶黯黑，面色晦黄，面颊部黯斑，舌淡胖色黯，脉沉细滑，尺脉弱。治疗应首选

- A. 加味阿胶汤
- B. 补肾安胎饮
- C. 泰山磐石散
- D. 补肾固冲丸
- E. 安奠二天汤

61. 患者，女，29岁，已婚。妊娠8个半月，头晕胀痛，面目肢体肿胀，但皮色不变，压痕不明显，舌苔薄腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 镇肝息风汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 天仙藤散
- D. 羚角钩藤汤
- E. 半夏白术天麻汤

62. 患者，女，30岁，已婚。怀孕3个月，近3天尿频、尿急、尿道灼热刺痛，两颧潮红，五心烦热，舌红苔薄黄，脉细滑数。治疗应首选

- A. 五皮饮
- B. 加味五淋散
- C. 知柏地黄丸
- D. 六味地黄汤
- E. 导赤散

63. 产后“三急”是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗

- B.高热、昏迷、自汗
- C.心悸、气短、抽搐
- D.尿闭、便难、冷汗
- E.下血、腹痛、心悸

64.下列哪项是产后用药“三禁”

- A.活血、通便、消导
- B.大汗、峻下、利小便
- C.清热、凉血、滋阴
- D.祛寒、开郁、化瘀
- E.以上均非

65.产后“三病”是指

- A.呕吐、泄泻、盗汗
- B.尿失禁、缺乳、大便难
- C.血晕、发热、痉证
- D.病痉、病郁冒、大便难
- E.腹痛、恶露不下、发热

66.下列各项，不属产后发热病因的是

- A.感染邪毒
- B.外感
- C.血瘀
- D.血虚
- E.阳盛血热

67.治疗产后发热血虚证，应首选

- A.荆穗四物汤
- B.生化汤
- C.桃红消瘀汤
- D.清暑益气汤
- E.补中益气汤

68.患者，女，27岁，已婚。产后5日，高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多，色如败酱，有臭气，纳呆，便秘。应首先考虑的是

- A.产后伤食
- B.产后腹痛
- C.产后发热
- D.疟疾
- E.肠痈

69.患者，女，28岁，已婚。产时失血较多，产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少、色淡，头晕耳鸣，大便干燥，舌淡苔薄，脉虚细。治疗应首选

- A.肠宁汤
- B.生化汤
- C.十全大补汤
- D.人参养荣汤
- E.八珍汤

70.患者，女，27岁，已婚。产后恶露1个月未止。量多、色淡、无臭气，小腹空坠，神倦懒言，舌淡，脉缓弱。治疗应首选



- A.举元煎
- B.固本止崩汤
- C.生化汤
- D.八珍汤
- E.补中益气汤

71.生化汤治疗血被寒凝，瘀阻胞宫而致的产后恶露淋漓不爽，常加用的药物是

- A.桃仁、赤芍
- B.红花、赤芍
- C.蒲黄、五灵脂
- D.蒲黄、益母草
- E.黑荆芥、茜草

72.患者，女，45岁，已婚。下腹积块，固定不移，疼痛拒按，舌边瘀点，脉沉涩。治疗应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.逍遥散
- C.乌药汤
- D.香棱丸
- E.三棱煎

73.患者，女，25岁，已婚。有盆腔炎病史，下腹部疼痛结块，缠绵日久，痛连腰骶，经行加重，经血量多有块，带下量多，精神不振，纳少乏力，舌质紫暗，有淤点，苔白，脉弦涩无力。治疗应首选

- A.理冲汤
- B.膈下逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.血府逐瘀汤
- E.银甲丸

74.患者，女，38岁，结婚3年。夫妇同居未孕。月经先后无定期，经行乳房胀痛，善太息，舌淡红苔薄白，脉弦细。其证候是

- A.肝肾阴虚
- B.肝郁脾虚
- C.肝阳上亢
- D.肝气郁结
- E.气滞血瘀

75.下列哪项对阴痒的描述是恰当的

- A.阴痒肝经湿热证用知柏地黄汤
- B.妇女外阴及阴道瘙痒，甚则波及肛门周围，痒痛难忍，坐卧不宁，或伴有带下增多者，称为“阴痒”
- C.阴痒多见于虚证
- D.阴痒多见于实证
- E.阴痒肝肾阴虚型用龙胆泻肝汤

76.患者，女，56岁。阴部瘙痒难忍，外阴皮肤粗糙增厚，有抓痕，带下量多、色黄如脓，舌体胖大，色红苔黄腻，脉弦滑。治疗应首选

- A.知柏地黄汤
- B.保阴煎

- C.龙胆泻肝汤
D.六味地黄丸
E.左归丸
- 77.下列各项，属于阴挺发病主要病机的是
A.胞络损伤
B.肾气虚损
C.肝肾两亏
D.湿热下注
E.产育过众
- 78.下列各项，不属放置宫内节育器禁忌证的是
A.滴虫性阴道炎
B.月经过多
C.重度痛经
D.宫颈口松
E.足月产后3月
- 79.下列各项，不属人工流产并发症的是
A.人流综合征
B.子宫穿孔
C.人流后宫缩不良
D.人流不全
E.人流术后感染
- 80.子宫内膜增生早期，其内膜厚度约为
A. 1~2mm
B. 3~4mm
C. 5~6mm
D. 7~8mm
E. 9~10mm



健康无价
JINYINGJIE.COM

参考答案

1.【参考答案】E

【解析】阴户的功能：(1)是防御外邪入侵的第一道门户。(2)是排月经、泌带下、排恶露之出口。(3)是合阴阳之入口。(4)娩出胎儿、胎盘之产门。

2.【参考答案】A

【解析】阴道的功能是：(1)娩出胎儿。(2)排出月经、带下、恶露的通道。(3)合阴阳的器官。(4)禁闭子精，防御外邪的处所。

3.【参考答案】D

【解析】子门，又名子户。是指子宫颈口的部位。

4.【参考答案】E

【解析】胞宫的主要生理功能主经、带、胎、产

5.【参考答案】C

【解析】天癸，男女都有，是肾中精气充盛到一定程度时体内出现的具有促进人体生长、发育、生殖的一种精微物质，天癸来源于先天肾气，靠后天水谷精微的滋养，而逐渐成熟，后

又随肾气的虚衰而竭止，天癸主宰月经的潮与止。

6.【参考答案】B

7.【参考答案】A

8.【参考答案】B

【解析】色白或无色透明，其量适中，质地粘而不稠，滑润如膏，无异臭气味，色白或无色透明

9.【参考答案】E

【解析】现代预产期推算的公式是：从末次月经的第1天算起，月数加9(或减3)日数加7(阴历则加14)。

10.【参考答案】D

【解析】弄胎(假宫缩)：若数月已足，腹痛或作或止，腰不痛。

11.【参考答案】A

12.【参考答案】A

【解析】顺产者，产后30分钟即可开始哺乳。

13.【参考答案】A

【解析】3个月后婴儿开始添加辅食。

14.【参考答案】C

【解析】易导致妇产科疾病发生的病邪是寒邪、热邪、湿邪。

15.【参考答案】E

【解析】血虚致冲任血海匮乏不能由满而溢，或失于濡养，可发生月经后期、月经过少、闭经、痛经、妊娠腹痛、胎动不安、滑胎、胎萎不长、产后缺乳、产后身痛、产后血虚、不孕。

16.【参考答案】E

17.【参考答案】A

【解析】中药离子导入是通过直流电场经皮肤黏膜导入。主要适用于慢性盆腔炎、输卵管阻塞、术后盆腔粘连等。

18.【参考答案】D

【解析】月经病发生的主要机理是脏腑功能失调，气血不和，导致冲任二脉的损伤。其病因除外感邪气、内伤七情、房劳多产、饮食不节之外，尚须注意身体素质对月经病发生的影响。

19.【参考答案】E

【解析】月经病的治疗原则：(1)治本调经。(2)分清先病和后病的论治原则。(3)本着“急则治其标，缓则治其本”的原则。

20.【参考答案】C

【解析】主要证候：经期提前，量多或少，经色深红或紫红，质稠有块，经前乳房、胸胁、少腹胀痛，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔黄，脉弦数。

21.【参考答案】D

22.【参考答案】B

【解析】月经后期虚寒证的主要证候：月经延后，量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟或细弱。

23.【参考答案】E

【解析】月经先后无定期的肾虚型——主要证候：经行或先或后，量少，色淡，质稀，头晕耳鸣，腰酸腿软，小便频数，舌淡，苔薄，脉细弱。——治法：补肾调经。——代表方：固阴煎。

24.【参考答案】B

【解析】月经过多的主要病机是冲任不固，经血失于制约而致血量多。常见的病因有气虚、

血热和血瘀。

25.【参考答案】A

【解析】月经过多:血热型——主要证候:经行量多,色鲜红或深红,质黏,或有血块,口渴饮冷,心烦,尿黄便结,舌红,苔黄,脉滑数。——治法:清热凉血,固冲止血。——代表方:保阴煎加地榆、茜草。

26.【参考答案】C

【解析】月经过少——痰湿型主要证候:月经量少。色淡红,质粘稠如痰,经期正常,形体肥胖,胸闷呕恶,或带下量多黏腻。舌淡苔白腻,脉滑。——治法:化湿燥痰调经。——代表方:苍附导痰丸或二陈加芎归汤。

27.【参考答案】B

【解析】经期延长:虚热型:——主要证候:经行时间延长,量少,经色鲜红,质稠,咽干口燥,潮热颧红,手足心热,舌红,苔少,脉细数。

28.【参考答案】B

【解析】两次月经中间,阴道少量出血判断为经间期出血,由色鲜红,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,舌质红,苔薄,脉细数,辨证为肾阴虚证。治宜滋肾养阴,固冲止血。

29.【参考答案】B

【解析】妇女不在行经期间阴道突然大量出血,或淋漓下血不断者,称为“崩漏”,前者称为“崩中”后者称为“漏下”。

30.【参考答案】E

【解析】崩漏的治疗原则采用“急则治其标,缓则治其本”的原则,灵活运用塞流、澄源、复旧三法。

31.【参考答案】C

【解析】崩漏:脾虚型——主要证候:经血非时而下,量多如崩,或淋漓不断,色淡质稀,面色白,神疲体倦,气短懒言,不思饮食,四肢不温,或面浮肢肿,小腹空坠,舌淡胖,边有齿印,苔薄白,脉沉弱。——治法:补气摄血,固冲止崩。——代表方:固本止崩汤或固冲汤

32.【参考答案】A

【解析】闭经:阴虚血燥证——主要证候:经期延后、量少、色红质稠,渐至月经停闭不行;五心烦热,颧红唇干,盗汗甚至骨蒸劳热,干咳或咳嗽唾血;舌红,苔少,脉细数。——治法:养阴清热调经。——主方:加减一阴煎加丹参、黄精、女贞子、制香附。

33.【参考答案】B

【解析】痰湿阻滞证——主要证候:经期延后,量少,色淡质黏腻,渐至月经停闭;伴形体肥胖,胸闷泛恶,神疲倦怠,纳少痰多或带下量多,色白;苔腻,脉滑。——治法:健脾燥湿化痰,活血调经。——主方:四君子汤合苍附导痰丸加当归、川芎。

34.【参考答案】D

35.【参考答案】B

【解析】痛经:湿热瘀阻证——主要证候:经前或经期小腹灼痛拒按,痛连腰骶,或平时小腹痛,至经前疼痛加剧,量多或期长,色黯红,质稠或夹有黏液;平素带下量多,黄稠臭秽,或伴低热,小便黄赤,舌红,苔黄腻,脉滑数或弦数。——治法:清热除湿,化瘀止痛。——代表方:清热调血汤加车前子、薏苡仁、败酱草或银甲丸。

36.【参考答案】B

【解析】经行乳房胀痛的常见的病因病机是肝气郁结,不通则痛;肝肾亏虚,不荣则痛;或肝肾亏虚,乳络失于濡养而痛;或者脾胃虚弱,运化失职,水湿聚而成痰,冲气夹痰湿阻络,乳络不畅,遂做乳房胀痛或痒痛。

37.【参考答案】A

38.【参考答案】E

39.【参考答案】A

【解析】经行身痛是由于素体正气不足，营卫失调，筋脉失养，或宿有寒留滞，经行时则乘虚而发。

40.【参考答案】A

【解析】血虚证——治法:治宜养血益气，柔筋止痛。——代表方:当归补血汤加鸡血藤、白芍、丹参、玉竹。

41.【参考答案】A

【解析】经行泄泻的病因病机主要在于脾肾虚弱，二者功能失于协调，脾气虚弱或肾阳不足，则运化失司，水谷精微不化，水湿内停。经行之际，气血下注冲任，脾肾益虚而致经行泄泻。

42.【参考答案】E

【解析】脾虚——主要证候:经期或行经前后，大便泄泻，脘腹胀满，神疲肢倦，量多，色淡质稀，平时带下量多，色白质粘，无臭气，或面浮肢肿，舌淡红，苔白腻，脉濡缓。——治法:健脾渗湿，理气调经。——代表方举例:参苓白术散。

43.【参考答案】B

【解析】气滞血瘀证——主要证候:经行肢体肿胀，按之随手而起，色黯有块；脘闷胁胀，善叹息；舌紫黯，苔薄白，脉弦涩。——治法:理气行滞，养血调经。——主方:八物汤加泽泻、益母草。

44.【参考答案】C

【解析】经行吐衄的定义是每逢经行前后，或正值经期，出现周期性的吐血或衄血，亦有倒经、逆经之称。由题干每于经期鼻衄，辨病为逆经，由心烦易怒，口苦咽干，尿黄便秘，辨证为肝经郁火证，舌脉俱为佐证。

45.【参考答案】A

46.【参考答案】C

【解析】本病发生的主要病机以肾虚为主，常见的有肾阴虚、肾阳虚和肾阴阳两虚。

47.【参考答案】A

【解析】肾阴虚证——主要证候:经断前后，月经紊乱，量多或少，色鲜红。头晕耳鸣，腰酸腿软，烘热汗出，五心烦热，失眠多梦，口燥咽干，或皮肤瘙痒。舌红，苔少，脉细数。——治法:滋养肾阴，佐以潜阳。——代表方:左归饮合二至丸加制首乌、龟甲。

48.【参考答案】D

49.【参考答案】A

【解析】湿热下注证——主症:带下量多，其色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒，小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。

50.【参考答案】E

【解析】脾虚证——主要证候:带下量多，色白或淡黄，质稀薄，或带如涕如唾，绵绵不断，无臭，面色白或萎黄，伴四肢倦怠，脘肋不舒，纳少便溏，或伴四肢浮肿，舌淡胖，苔白或腻，脉细缓。——治法:健脾益气，升阳除湿。——代表方:完带汤。

51.【参考答案】D

【解析】血枯瘀阻证——主要证候:带下过少，甚至全无，阴中干涩，阴痒+血枯瘀阻证(面色无华，头晕眼花，心悸失眠，神疲乏力，或经行腹痛，经色紫黯，有血块，肌肤甲错，或下腹有包块)；舌质黯，边有淤点淤斑，脉细涩。——治法:补血益精，活血化瘀。代表方:

小营煎加丹参、桃仁、牛膝。

52.【参考答案】D

53.【参考答案】D

【解析】凡峻下、滑利、祛瘀、破血、耗气、散气及一切有毒药品，都应慎用或禁用。

54.【参考答案】C

【解析】阴血素虚，孕后阴血下聚以养胎元，阴血益虚，可致阴虚阳亢而发病。脾虚湿聚，则泛溢肌肤或水停胞中而为病；肾虚则肾精匮乏，胎失所养；或肾气虚弱，胎失所系，胎元不固。冲气上逆犯胃，胃失和降则呕恶。素多忧郁，气机不畅，腹中胎体渐大，易致气机升降失常，气滞则血瘀水停而致病。

55.【参考答案】E

【解析】病因：脾胃虚弱，肝胃不和；病机：胃失和降，冲气上逆。

56.【参考答案】C

【解析】妊娠腹痛：气滞证——主要证候：妊娠期间，小腹胸肋胀痛，情志抑郁、胸闷暖气，烦躁易怒。舌苔薄黄，脉弦滑。——治法：疏肝解郁，养血安胎——代表方：逍遥散。

57.【参考答案】B

【解析】胎漏、胎动不安的病因包括：①肾虚。②肾虚。③气血虚弱。④血瘀。

58.【参考答案】E

【解析】由题干现妊娠43天，阴道不时少量下血，腰酸，胎动下坠，辨病为胎动不安，由口干不欲饮，舌暗红，脉沉弦，辨证为血瘀证，代表方剂是桂枝茯苓丸。

59.【参考答案】B

【解析】在妊娠期间，阴道不时有少量出血，时出时止，或淋漓不断，而无腰酸、腹痛、小腹下坠者，称为“胎漏”，也称“胞漏”“漏胎”。妊娠期间出现腰酸、腹痛、小腹下坠，或伴有少量阴道出血者，称“胎动不安”。

60.【参考答案】E

【解析】滑胎：脾肾虚弱证——主要证候：屡孕屡堕；腰酸膝软，小腹隐痛下坠，纳呆便溏，头晕耳鸣，尿频，夜尿多，眼眶黯黑，面色晦黄，面颊部黯斑；舌淡胖色黯，脉沉细滑，尺脉弱。——治法：补肾健脾，养血安胎。——代表方：安奠二天汤。

61.【参考答案】C

【解析】子肿：气滞证——主要症状：妊娠三四月后，肢体肿胀，始于两足，渐延于腿，皮色不变，随按随起；气滞证(胸膈肋胀，头晕胀痛)舌苔薄腻，脉弦滑。——治法：理气行滞，除湿消肿。——代表方：天仙藤散或正气天香散。

62.【参考答案】C

【解析】妊娠小便淋痛：阴虚津亏证——主要证候：妊娠期间，小便频数，淋漓涩痛，量少色淡黄+阴虚内热证候。舌红少苔，脉细滑数。——治法：滋阴清热，润燥通淋。——代表方：知柏地黄丸加麦冬、五味子、车前子。

63.【参考答案】A

【解析】产后三急：是指产后呕吐、盗汗、泄泻，三者并见必危。

64.【参考答案】B

【解析】产后用药“三禁”：(1)禁大汗以防亡阳；(2)禁峻下以防亡阴；(3)禁通利小便以防亡津液。

65.【参考答案】D

【解析】产后三病：是指产后病痉、病郁冒、大便难。

66.【参考答案】E

【解析】产后发热的病因包括：感染邪毒，正邪交争，外邪袭表，营卫不和，阴血骤虚，阳

气外散，败血停滞，营卫不通。

67.【参考答案】E

68.【参考答案】C

【解析】发热见于产褥期，尤以新产后为多见，常伴有恶露异常，或小腹疼痛等症。产后 10 天内发热不解，连续 3 天体温在 38℃ 以上，并伴有腹痛及阴道分泌物的色、质、量、气味等异常。

69.【参考答案】A

【解析】产后腹痛：气血两虚证——主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块+气血虚证候。舌质淡，苔薄白，脉细弱。——治法：补血益气，缓急止痛。——代表方：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

70.【参考答案】E

【解析】从题干产后恶露 1 个月不止，可确定为产后恶露不绝，从症状量多、色淡、无臭气，小腹空坠，神倦懒言，舌质淡，脉缓弱，可诊断为气虚证，方用补中益气汤。

71.【参考答案】D

【解析】产后恶露：血瘀证——治法：活血化瘀止血。——代表方：生化汤加益母草、炒蒲黄。

72.【参考答案】A

【解析】癥瘕：痰湿瘀结证——主要证候：下腹结块，触之不坚，固定难移，经行量多，淋漓难净，经间带下增多+痰湿瘀结证候。舌体胖大，紫黯，有淤斑、淤点，苔白厚腻，脉弦滑或沉涩。——治法：化痰除湿，活血消癥。——代表方：苍附导痰丸合桂枝茯苓丸。

73.【参考答案】A

【解析】慢性盆腔炎：气虚血瘀证——主要证候：下腹部疼痛结块，缠绵日久，痛连腰骶，经行加重，量多有血块，带下量多，疲乏无力，舌黯红有淤点，苔白，脉弦涩无力。——治法：益气健脾，化瘀散结。——代表方：理冲汤。

74.【参考答案】D

【解析】由题干结婚 3 年，夫妇同居未孕，辨病为不孕症；由经行乳房胀痛，善太息，舌淡红苔薄白，脉弦细，辨证为肝气郁结证。

75.【参考答案】B

【解析】妇女外阴及阴道瘙痒，甚则痒痛难忍，坐卧不宁，或伴有带下增多等，称为“阴痒”。

76.【参考答案】C

【解析】阴痒：肝经湿热证——主要证候：阴部瘙痒难忍，坐卧不安，外阴皮肤粗糙增厚，有抓痕，黏膜充血破溃，或带下量多，色黄如脓，或呈泡沫米泔样，或灰白如凝乳，味腥臭+湿热证。舌体胖大，色红苔黄腻，脉弦滑。——治法：清热利湿，杀虫止痒。——代表方：龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤，外用蛇床子散。

77.【参考答案】A

【解析】本病的主要病机是气虚下陷与肾虚不固致胞络损伤，不能提摄子宫。

78.【参考答案】E

【解析】放置宫内节育器禁忌证：月经过多过频；生殖道急性炎症；生殖器官肿瘤；子宫畸形；宫颈过松、重度陈旧宫颈裂或子宫脱垂；严重全身性疾患。

79.【参考答案】C

【解析】人工流产综合征、子宫穿孔、人流不全、宫腔或颈管内口粘连、术后感染。

80.【参考答案】B