

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.“证”的基本含义是
 - A. 疾病发展过程中某一阶段的病理概括
 - B. 疾病过程的体征总和
 - C. 对症状的调查过程
 - D. 疾病过程的病因病性
 - E. 疾病过程的症状总和
2. 中医学的基本特点是
 - A. 整体观念和阴阳五行
 - B. 四诊八纲和辨证论治
 - C. 同病异治和异病同治
 - D. 整体观念和辨证论治
 - E. 阴阳五行和五运六气
3. 有机整体的“主宰”是
 - A. 脑
 - B. 心
 - C. 神
 - D. 经络
 - E. 精
4. 其有“汇集水液”生理机能的是
 - A. 小肠
 - B. 大肠
 - C. 膀胱
 - D. 三焦
 - E. 脾胃
5. 贯注于心肺之脉的气是
 - A. 元气
 - B. 宗气
 - C. 营气
 - D. 卫气
 - E. 脏腑之气
6. 肺病及心的五行传变是
 - A. 相乘传变
 - B. 相侮传变
 - C. 母病及子
 - D. 子病犯母
 - E. 相克传变
7. “孤阴不生, 独阳不长”主要属于何种阴阳关系
 - A. 对立
 - B. 互根
 - C. 消长
 - D. 转化
 - E. 平衡
8. 肝主疏泄的基本生理功能是
 - A. 调畅情志活动
 - B. 调畅全身气机
 - C. 协助脾胃运化
 - D. 促进血行和津液代谢
 - E. 调节月经和精液的排泄
9. “水谷之海”指的是
 - A. 胆
 - B. 小肠
 - C. 大肠
 - D. 膀胱
 - E. 胃
10. 自汗、多尿或小便失禁可由气的哪项功能减退引起

- A.推动作用
 - B.固摄作用
 - C.温煦作用
 - D.防御作用
 - E.气化作用
- 11.区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是
- A.分布部位的不同
 - B.解剖形态的不同
 - C.功能特点的不同
 - D.阴阳属性的不同
 - E.以上均非
- 12.营气的分布特点是
- A.上出息道,下走气街
 - B.熏于肓膜,散于胸腹
 - C.与血同行,环周不休
 - D.行于脉外,布散全身
 - E.通过三焦,流行全身
- 13.饮食五味偏嗜,引起“骨痛而发落”的原因是
- A.多食咸
 - B.多食苦
 - C.多食酸
 - D.多食甘
 - E.多食辛
- 14.“正气存内,邪不可干”的意义是
- A.邪气是发病的重要条件
 - B.邪气伤人,正气必然受损
 - C.正气充足,与邪抗争,驱邪外出
 - D.正气旺盛,邪气难以入侵
 - E.以上都不是
- 15.导致病证虚实的主要机制是
- A.气血的盛衰变化
 - B.气机升降出入的失调
 - C.阴精与阳气的偏盛偏衰
 - D.正气与邪气的消长盛衰
 - E.脏腑功能活动的盛衰变化
- 16.具有固摄、中介、温煦与凉润功能的是

- A.精
 - B.气
 - C.血
 - D.津
 - E.液
- 17.与尿液排泄关系密切的是气的哪种功能
- A.推动作用
 - B.温煦作用
 - C.固摄作用
 - D.防御作用
 - E.以上都不是
- 18.疠气与六淫邪气最主要的区别是
- A.发病与季节有关
 - B.发病与地区有关
 - C.病情重笃
 - D.发病急骤
 - E.传染性强
- 19.所谓“寒从中生”病机,主要是指
- A.寒邪伤人,影响脏腑功能
 - B.寒邪直中脾胃,伤及阳气
 - C.阳气虚衰,温煦气化功能减退
 - D.恣食生冷,内脏受寒
 - E.寒邪从肌表而入,渐侵脏腑
- 20.外感风寒化热,与下列哪种因素密切相关
- A.居住环境
 - B.气候特点
 - C.饮食不节
 - D.体质因素
 - E.以上都不是
- 21.“邪之所凑,其气必虚”的意思主要是指
- A.邪气伤人,必伤人体的正气
 - B.邪气是发病的重要条件
 - C.正气不足,邪气易于侵犯人体
 - D.正气不足,邪气亢盛
 - E.以上都不是
- 22.饮在肠间,沥沥有声者称为

- A.痰饮
B.悬饮
C.支饮
D.溢饮
E.水饮
- 23.进入阴毛中,环绕阴器,上达小腹的经脉是
- A.任脉
B.冲脉
C.足太阴脾经
D.足厥阴肝经
E.足少阴肾经
- 24.与血生成无关的脏腑包括
- A.心
B.肺
C.肝
D.脾胃
E.肾
- 25.具有滑利关节、补益脑髓作用的是
- A.气
B.血
C.津
D.液
E.精
- 26.能够主管声音、言语的气是
- A.元气
B.宗气
C.营气
D.卫气
E.清气
- 27.具有行气血作用的气是
- A.元气
B.宗气
C.营气
D.卫气
E.脏腑之气
- 28.与人体情志活动关系最密切的是
- A.心、肺、肝
B.心、肝、脾
C.肺、脾、肾
D.心、脾、肾
E.心、肝、肾
- 29.称三焦为“孤府”的依据是
- A.无表里配合
B.形态似腑功能似脏
C.有名而无形
D.十二脏腑中唯它最大
E.总司人体气机与气化
- 30.七情配伍中,可以提高药效的配伍是
- A.相杀、相反
B.相杀、相使
C.相须、相使
D.相须、相恶
E.相恶、相反
- 31.半夏与陈皮合用以增强燥湿化痰作用,属于哪种配伍关系
- A.相畏
B.相杀
C.相须
D.相使
E.相恶
- 32.能治疗瘰疬、痰核、癥瘕等证的药味是
- A.辛味
B.酸味
C.苦味
D.咸味
E.甘味
- 33.下列说法哪一项说法是错误的
- A.麻黄清表热
B.石膏清里热
C.柴胡疏散少阳半表半里之邪
D.银花透表热,清里热
E.丹皮清血热,退虚热
- 34.素体表虚,复因外感,恶风汗出,发热脉浮缓,治疗应首选的药物是
- A.薄荷
B.荆芥

- C. 香薷
D. 防风
E. 桂枝
35. 荆芥的主要归经是
A. 肺、肝
B. 肺、脾
C. 肺、心
D. 肺、肾
E. 肺、膀胱
36. 具有祛风胜湿止痛功效的药组是
A. 防风、荆芥、白芷
B. 藁本、紫苏、防风
C. 防风、羌活、藁本
D. 白芷、紫苏、桂枝
E. 麻黄、香薷、桂枝
37. 既能发散风热, 又能透疹的药组是
A. 葛根、升麻、麻黄
B. 菊花、升麻、浮萍
C. 蝉衣、升麻、桑叶
D. 葛根、升麻、浮萍
E. 木贼、荆芥、白僵蚕
38. 治疗气虚下陷、脱肛、子宫脱垂等症, 黄芪宜配伍的药组是
A. 人参、白术
B. 葛根、桑叶
C. 柴胡、升麻
D. 麻黄、细辛
E. 大黄、芒硝
39. 治疗心阳不振、心悸、脉结代者, 当选用的药物是
A. 桂枝配白芍
B. 桂枝配附子
C. 桂枝配茯苓
D. 桂枝配猪苓
E. 桂枝配甘草
40. 治疗口舌生疮、小便短赤, 宜首选的药物是
A. 茯苓
B. 夏枯草
C. 竹叶
D. 芦根
E. 知母
41. 治疗阴虚发热, 骨蒸盗汗, 宜首选的药物是
A. 栀子
B. 石膏
C. 黄柏
D. 黄连
E. 玄参
42. 有“疮家圣药”之称的药物是
A. 连翘
B. 金银花
C. 蒲公英
D. 紫花地丁
E. 黄连
43. 既能退虚热, 又能除疳热的药物是
A. 柴胡、银柴胡
B. 黄连、胡黄连
C. 牡丹皮、赤芍
D. 银柴胡、胡黄连
E. 白薇、秦艽
44. 巴豆内服的用量是
A. 0.1~0.3 g
B. 0.5~1 g
C. 1.5~3 g
D. 3~5 g
E. 5~10 g
45. 祛风湿兼可解表的药物是
A. 秦艽
B. 木瓜
C. 防己
D. 独活
E. 威灵仙
46. 白豆蔻与肉豆蔻都具有的功效是
A. 芳香化湿
B. 涩肠止泻
C. 理气安胎
D. 疏肝理气

- E.温中行气
- 47.既能祛风湿,又能强筋骨,还能利水消肿的药物是
- A.薏苡仁
B.威灵仙
C.五加皮
D.车前子
E.桑白皮
- 48.既能行气除满,又可平喘的药物是
- A.陈皮
B.杏仁
C.麻黄
D.厚朴
E.枳实
- 49.用治寒热虚实各种水肿,为利水消肿要药的是
- A.猪苓
B.茯苓
C.泽泻
D.滑石
E.车前子
- 50.既能利水通淋,又能通经下乳的药物是
- A.车前子
B.木通
C.麦芽
D.肉桂
E.泽泻
- 51.使用注意中,有毒,用量不宜过大,也不宜久服,肾功能不全者及孕妇忌服的药物是
- A.滑石
B.通草
C.木通
D.泽泻
E.石韦
- 52.既能化湿,又能解暑的药物是
- A.藿香、佩兰
B.苍术、厚朴
C.砂仁、豆蔻
D.橘皮、青皮
E.茯苓、玉竹
- 53.既能治蛔虫、蛲虫证,又善疗小儿疳疾的药物是
- A.使君子
B.苦楝皮
C.鸡内金
D.贯众
E.槟榔
- 54.蒲黄入汤剂的用法是
- A.先煎
B.后下
C.局服
D.布包煎
E.久煎
- 55.醋制延胡索的目的是
- A.增强活血作用
B.增强行气作用
C.加强止痛之功
D.减低苦味
E.降低毒性
- 56.善于治疗乳痈,人称“乳痈良药,通淋妙品”的药物是
- A.金银花
B.连翘
C.夏枯草
D.蚤休
E.蒲公英
- 57.善于治疗梅毒或因梅毒服用汞剂而致肢体拘挛的药物是
- A.鱼腥草
B.土茯苓
C.败酱草
D.蒲公英
E.地肤子
- 58.下列不具有润肠通便作用的药物是
- A.桃仁
B.柏子仁

- C.杏仁
D.酸枣仁
E.火麻仁
- 59.鹿茸的功效是
A.补肾阴,益精血,强筋骨
B.补肾阳,益精血,强筋骨
C.补肾阴,祛风湿,强筋骨
D.补肾阳,强筋骨,祛风湿
E.补肾阴,强筋骨,止胎动
- 60.能够敛肺,涩肠,敛汗,止遗的药物是
A.乌梅
B.浮小麦
C.麻黄根
D.金樱子
E.五味子
- 61.慢性阻塞性肺疾病最终结局是
A.慢性肺源性心脏病
B.自发性气胸
C.慢性呼吸衰竭
D.低氧血症
E.肺气肿
- 62.COPD 急性加重期的重要治疗措施是
A.止咳、祛痰
B.解痉、平喘
C.控制感染
D.避免及减少各种诱因
E.抗过敏
- 63.医院内获得性肺炎,最常见的致病菌是
A.真菌
B.肺炎链球菌
C.厌氧菌
D.葡萄球菌
E.革兰阴性杆菌
- 64.慢性肺心病最多见的并发症是
A.肺性脑病
B.心律失常
C.酸碱失衡
D.消化道出血
E.肾衰竭
- 65.下列病因中,与心衰发生无关的是
A.外邪侵袭
B.劳欲所伤
C.情志所伤
D.先天不足
E.饮食不节
- 66.急性肺水肿典型 X 线表现是
A.肺门舞蹈征
B.两肺纹理增粗
C.肺门蝴蝶形阴影
D.肺透亮度增加
E.以上都不是
- 67.风心病心衰用洋地黄和利尿剂治疗,出现恶心,食欲缺乏,心电图为室性早搏二联律。下列哪一种情况最可能
A.心衰加重
B.低钾
C.风湿活跃
D.洋地黄中毒
E.洋地黄剂量不足
- 68.慢性心功能不全的临床表现主要是由于
A.肺充血、肺水肿所致
B.左心室舒张末期压力增高所致
C.体循环静脉压力增高所致
D.肺动脉压力增高所致
E.心排出量下降,周围器官供血不足所致
- 69.哪种心脏瓣膜病最易引起晕厥
A.主动脉瓣关闭不全
B.主动脉瓣狭窄
C.二尖瓣狭窄
D.二尖瓣关闭不全
E.肺动脉瓣狭窄
- 70.风心病二尖瓣狭窄患者随右心衰竭的加重,哪项临床表现将减轻
A.肝大压痛

- B. 心率增快
C. 胃肠道淤血症状
D. 心尖区舒张期隆隆样杂音
E. 急性肺水肿发作
71. 关于十二指肠溃疡的治疗最重要的是
- A. 中枢镇静
B. 保护黏膜
C. 少食多餐
D. 早期手术
E. 抑制胃酸和根除幽门螺杆菌
72. 高血压急症的首选降压药是
- A. 硝普钠
B. 硝酸甘油
C. 呋塞米
D. 硝苯地平
E. 贝那普利
73. 急性胰腺炎性休克的主要病因是
- A. 感染
B. 用哌替啶
C. 心肌损害
D. 神经源性
E. 有效血容量不足
74. 上消化道出血最常见的病因是
- A. 消化性溃疡
B. 胆道疾病
C. 急性糜烂性胃炎
D. 贲门黏膜撕裂症
E. 肝硬化食管静脉曲张破裂
75. 心室颤动的首选治疗措施是
- A. 利多卡因
B. 普鲁卡因胺
C. 同步直流电击除颤
D. 非同步直流电击除颤
E. 以上都不是
76. 急性心肌梗死早期(24小时), 死亡主要是由于
- A. 心力衰竭
B. 心脏破裂

- C. 心源性休克
D. 乳头肌断裂
E. 心律失常
77. 治疗原发性免疫性血小板减少症的有效方法是
- A. 叶酸, 睾丸酮, 维生素 K
B. 睾丸酮, 免疫抑制剂, 脾切除
C. 铁剂, 叶酸, 睾丸酮
D. 肾上腺皮质激素, 免疫抑制剂, 睾丸酮
E. 肾上腺皮质激素, 免疫抑制剂, 脾切除
78. 哪项血液学改变符合再障的诊断
- A. 网织红细胞绝对数正常
B. 凝血酶时间延长
C. 凝血时间延长
D. 中性粒细胞碱性磷酸酶计分增加
E. 骨髓涂片可见幼红细胞, 有巨幼红细胞样变
79. 内分泌疾病功能减退的治疗先用哪种方法
- A. 病因治疗
B. 对症治疗
C. 支持治疗
D. 替代治疗
E. 放疗及化疗
80. 病人甲状腺摄¹³¹I 率增高, 且高峰前移, 提示其疾病为
- A. 地方性甲状腺肿
B. 单纯性甲状腺肿
C. 亚急性甲状腺炎
D. 毒性弥漫性甲状腺炎
E. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
81. Graves 病的独特临床表现是
- A. 多食而消瘦
B. 脉压增大
C. 弥漫性甲状腺肿大
D. 胫前黏液性水肿
E. 心率增快与代谢率升高

82. 淡漠型甲亢的特点是
- T₃、T₄ 明显增高
 - 高代谢症候群明显
 - 甲状腺弥漫性肿大
 - 常有突眼
 - 多见于老年人, 消瘦明显
83. 哪项是糖尿病病人失明的主要原因
- 视网膜剥离
 - 白内障
 - 青光眼
 - 视网膜微血管瘤
 - 视网膜出血
84. 临床用于甲亢治疗疗效判断指标的是
- 基础代谢率
 - 甲状腺摄¹³¹I率
 - 突眼程度
 - T₃、T₄
 - 甲状腺肿大程度
85. 类风湿关节炎首选缓解病情的药物是
- 生物制剂
 - 甲氨蝶呤
 - 来氟米特
 - 抗疟药
 - 金制剂
86. 下列哪项与系统性红斑狼疮诊断有关
- 肌痛
 - 脱发
 - 腹痛、恶心
 - 肝功能异常
 - 梅毒血清学试验假阳性
87. 哪项是诊断癫痫的主要依据
- 神经系统检查
 - 询问病史
 - 脑电图检查
 - CT 扫描
 - 脑脊液检查
88. 脑血栓形成患者出现尿失禁是病变损害了
- 额叶
 - 胼胝体前 4/5
 - 扣带回
 - 旁中央小叶
 - 颞叶基底面
89. 颅内压增高最容易麻痹的脑神经是
- 视神经
 - 动眼神经
 - 面神经
 - 展神经
 - 三叉神经
90. 急性白血病的贫血是
- 巨幼红细胞性贫血
 - 正细胞正色素性贫血
 - 小细胞低色素性贫血
 - 大细胞低色素性贫血
 - 血红蛋白与红细胞成比例减少
91. 民事责任以财产责任为主, 而财产责任以什么为主要形式
- 赔偿责任
 - 行政责任
 - 刑事责任
 - 道德责任
 - 民事责任
92. 医师的处方权取得是
- 大学毕业后即取得
 - 医师资格考试合格后取得
 - 实习一年后即取得
 - 到医疗单位工作即取得
 - 按照注册医师的执业地点取得
93. 刑事责任只能由犯罪行为人承担, 具有
- 强制性
 - 不可转移性
 - 义务性
 - 讨论性
 - 假设性

94.某美容整形医院在为患者李某实施隆胸手术后造成患者双侧乳房大小不等,医院除应赔偿患者直接经济损失外,还应

- A.帮李某施行修复手术
- B.赔礼道歉
- C.支付违约金
- D.支付李某精神损害赔偿
- E.恢复李某名誉

95.某医药公司销售假药造成部分患者病情延误,医药公司应当承担相应的

- A.刑事责任
- B.行政责任
- C.民事责任
- D.社会责任
- E.以上均不对

96.受理执业医师注册申请的卫生行政部门,对应当准予注册的,准予注册期限是自收到申请之日起

- A.7日内
- B.10日内
- C.15日内
- D.30日内
- E.60日内

97.以下情形中不予医师执业注册的是

- A.受过刑事处罚的
- B.受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年的

- C.不具有完全民事行为能力的
- D.受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E.受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起至申请注册之日止不满3年的

98.被注销注册、收回医师执业证书的当事人有异议的,依法申请复议或者起诉的期限是自收到注销注册通知之日起

- A.7日内
- B.10日内
- C.15日内
- D.20日内
- E.30日内

99.保护患者的隐私权是医师在执业活动中必须

- A.重视的权利
- B.履行的法定义务
- C.告之患者的义务
- D.关注的社会责任
- E.审方配药的内容

100.按照《中华人民共和国传染病防治法》,属于乙类传染病分类,但依法采取甲类传染病的预防、控制措施的是

- A.肺结核
- B.艾滋病
- C.猩红热
- D.淋病
- E.感染高致病性禽流感

A2型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

101.患者薛某。思虑劳倦过度,证见倦怠乏力,食少神疲,面色萎黄,心悸怔忡,健忘失眠,舌质淡,苔薄白,脉沉细缓。治宜选用的方剂是

- A.归脾汤

- B.生脉散
- C.四物汤
- D.炙甘草汤
- E.地黄饮子

102.患者,男,56岁。因情急恼怒而突

发头痛而胀,继则昏厥仆倒,呕血,不省人事,肢体强痉,舌红苔黄,脉弦。其病机是

- A.气逆
- B.气郁
- C.气脱
- D.气陷
- E.气结

103.患者,女,50岁。近期常感腰痛,且有小便不畅症状。尿常规检查,见红细胞1~2个/HP。B超检查示:肾盂结石。最佳选药是

- A.连翘
- B.车前子
- C.泽泻
- D.金钱草
- E.木通

104.患者,男,64岁。近一月来寒热持续不解,恶寒较甚,发热无汗,身楚倦怠,咳嗽,咯痰无力,舌淡苔白,脉浮无力。治疗宜首选的方剂是

- A.新加香薷饮
- B.葱白七味饮
- C.参苏饮
- D.再造散
- E.加减葶藶汤

105.一孕妇有疲乏倦怠、嗜睡懒言、四肢乏力、胎动不安之症,治疗宜首选的药物是

- A.桑寄生
- B.续断
- C.杜仲
- D.紫苏
- E.白术

106.患者脘腹满闷,时轻时重,喜温喜按,纳呆便溏,神疲乏力,舌质淡,苔薄白,脉细弱。其辨证为

- A.肝胃不和
- B.脾胃虚弱
- C.胃阴不足
- D.饮食内停

E.湿热阻胃

107.患者,男,67岁。患高血压病15年,常有头晕头痛、失眠出现,近1个月来,又感耳鸣耳聋、目昏,且渐渐加重,舌暗红有裂纹,苔黄略燥,脉弦有力。宜选用生地、白芍等配伍的药物是

- A.酸枣仁、柏子仁
- B.当归、川芎
- C.胆南星、竹沥
- D.磁石、朱砂
- E.龙胆草、栀子

108.患者,女,63岁。慢性咳喘30年,近2年加重,常伴心悸怔忡,气不足以息。2天前因受风寒引发咳逆痰多,喘息不得卧,一身面目浮肿,舌暗胖,苔白腻略黄。治疗宜选用的药物是

- A.葶苈子
- B.麻黄
- C.地龙
- D.旋覆花
- E.杏仁

109.患者,女,40岁。近日来见脘腹冷痛,喜温喜按,恶心欲吐,大便溏泻,舌淡苔白,舌体胖大,边有齿痕,脉象沉细。最佳选药是

- A.附子
- B.肉桂
- C.干姜
- D.吴茱萸
- E.小茴香

110.患者,女,36岁。发热、胸痛5天,咳吐腥臭脓血痰,舌红苔腻,宜选用的药组是

- A.桔梗、薏苡仁、鱼腥草
- B.紫菀、款冬花、百部
- C.桑叶、杏仁、枇杷叶
- D.麻黄、杏仁、石膏
- E.白果、川贝、杏仁

111.患者,男性,61岁。食管癌手术,留

置胃管。术后4天患者咳嗽,痰略带黄色,体温38.5℃。气急,右下肺闻及较多细湿啰音。X线胸片示右下肺下大片炎性病变。其最可能的病原体是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.绿脓杆菌
- C.军团病菌
- D.流感嗜血杆菌
- E.肠道革兰阴性杆菌

112.患者,男,65岁。慢性阻塞性肺病史10年。近1周咳嗽加重,痰多,为黏稠脓痰。3天来语言混乱,烦躁不安,1天前开始昏睡。血pH 7.30,PaCO₂ 10.26 kPa,PaO₂ 7.8 kPa。治疗宜用

- A.地西洋
- B.尼可刹米
- C.碳酸氢钠
- D.盐酸哌替啶
- E.吸氧浓度为50%

113.患者,男性,16岁。学生,2周来感乏力,咽痛,咳嗽,咳少量黏痰,自觉发热,食欲减退。服磺胺6天无明显疗效。X线胸片示左下肺多形态性浸润影,呈节段性分布。最佳治疗药物是

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.庆大霉素
- D.异烟肼+链霉素
- E.诺氟沙星

114.患者,女,70岁。血压210/96 mmHg,伴气促及下肢水肿,心率110次/分。选用哪种降压药物效果最好

- A.卡托普利
- B.美托洛尔
- C.硝苯地平
- D.氢氟噻嗪
- E.哌唑嗪

115.患者,男,18岁。多饮、多食、多尿5年,曾有酮症酸中毒史,现在空腹血糖12.0 mmol/L。

其最佳治疗方案是饮食疗法加

- A.运动疗法
- B.磺脲类降糖药
- C.胰岛素
- D.二甲双胍
- E.噻唑烷二酮

116.患者,男性,45岁。急剧持续胸痛,血CPK明显增高,心率120次/分,律齐。哪种药物长期应用可改善预后

- A.利多卡因
- B.美托洛尔
- C.维拉帕米
- D.异山梨酯
- E.双嘧达莫

117.患者,女,24岁。低热、腹胀4个月,伴体重减轻,停经。体查:全腹膨隆,未扪及包块,有移动性浊音。腹腔积液检查:比重1.018,蛋白质37 g/L,白细胞580×10⁶/L,单核占0.80。其最可能的疾病是

- A.肝炎后肝硬化(失代偿期)
- B.肝硬化并自发性腹膜炎
- C.原发性肝癌并腹膜转移
- D.结核性腹膜炎
- E.卵巢肿瘤

118.患者,男,53岁。肝硬化5年,近2年便秘,1个月前钡剂灌肠检查正常,钡剂造影示食管静脉曲张,5天前起排新鲜血便。其血便最可能的原因是

- A.痔
- B.直肠息肉
- C.早期结肠癌
- D.慢性溃疡性结肠炎
- E.慢性乙状结肠炎、直肠炎

119.患者,男,38岁。间歇性上腹痛2年,嗝气,食欲差,受凉后加剧。近2天来疼痛加剧,突然呕血500 mL,为暗红色状块,继而排稀黑便200 mL。出血后腹痛缓解。其最可能的出血原因是

- A.胃癌

- B.消化性溃疡
 - C.慢性胃炎
 - D.急性胃黏膜病变
 - E.食管静脉曲张破裂
- 120.患者有冠心病史 10 余年,体羸少气,心悸怔忡,虚烦不眠,舌体瘦小,舌质淡

- 红,苔光脉代。治宜选用
- A.归脾汤
 - B.大补阴丸
 - C.人参养荣汤
 - D.炙甘草汤
 - E.十全大补汤

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A.推动作用
- B.温煦作用
- C.防御作用
- D.固摄作用
- E.气化作用

121.“味归形,形归气”是指气的

122.“宗气……贯心脉而行呼吸”是指气的

(123~124 题共用备选答案)

- A.上午
- B.下午
- C.傍晚
- D.前半夜
- E.后半夜

123.称“阴中之阴”的脏是

124.称“阴中之阳”的脏是

(125~126 题共用备选答案)

- A.徐发
- B.继发
- C.合病
- D.并病
- E.复发

125.一经病证未罢又见另一经病证者称为

126.两经或三经证候同时出现者称为

(127~128 题共用备选答案)

- A.戴眼、反折、瘈疝

B.耳聋、百节皆纵,目眦绝系

C.面黑齿长而垢,腹胀闭

D.腹胀闭不得息,善噫善呕

E.口目动作,善惊妄言,色黄

127.太阳之经络气血衰竭,可见

128.少阴之经络气血衰竭,可见

(129~130 题共用备选答案)

A.热因热用

B.寒因寒用

C.塞因塞用

D.通因通用

E.以上都不适用

129.真虚假实,治宜

130.真寒假热,治宜

(131~132 题共用备选答案)

A.疏散风热,清利头目

B.疏散风热,息风止痉

C.疏散风热,解毒透疹

D.疏散风热,清肝明目

E.疏散风热,疏肝解郁

131.柴胡具有的功效是

132.桑叶具有的功效是

(133~134 题共用备选答案)

A.外感风热,麻疹初起,肝经风热,目赤多泪,破伤风证

B.外感风热,麻疹初起,热毒疮肿

C.外感风热,麻疹初起,湿热泻痢,热病烦渴

D.少阳证,肝气郁结,气虚下陷

E.外感风热,肝经风热,肝阳上亢,头晕头痛

133.葛根最适宜治疗的病证是

134.牛蒡子最适宜治疗的病证是

(135~138 题共用备选答案)

A.清热泻火,除烦止渴

B.清热泻火,滋阴润燥

C.清热生津,止呕除烦

D.清热生津,消肿排脓

E.泻火除烦,凉血利湿

135.栀子的功效是

136.石膏的功效是

137.天花粉的功效是

138.知母的功效是

(139~140 题共用备选答案)

A.羌活

B.独活

C.木瓜

D.防己

E.五加皮

139.善治湿痹、筋脉拘挛、吐泻转筋的药物是

140.风湿痹证,肝肾不足两者所致的腰腿疼痛均可应用的药物是

(141~142 题共用备选答案)

A.支气管哮喘

B.COPD

C.支气管扩张症

D.原发性肺泡通气不足

E.慢性高原病

141.慢性肺心病最常见的病因是

142.大咯血的常见病因是

(143~144 题共用备选答案)

A.高侧壁心肌梗死

B.前壁心肌梗死

C.前侧壁心肌梗死

D.内膜下心肌梗死

E.下壁心肌梗死

143.室速及室颤多见于

144.无病理 Q 波出现

(145~146 题共用备选答案)

A.滋水涵木

B.扶土抑木

C.培土生金

D.清金制木

E.补火生土

145.一贯煎和杞菊地黄丸两方的治病机理均涉及

146.一贯煎和痛泻要方两方的治病机理均涉及

(147~148 题共用备选答案)

A.脾肿大

B.腹水

C.腹壁静脉曲张

D.出血倾向及贫血

E.痔静脉曲张

147.肝硬化代偿功能减退的最突出的体征是

148.属于肝硬化肝功能减退的临床表现是

(149~150 题共用备选答案)

A.玉女煎

B.肾气丸

C.一贯煎

D.地黄饮子

E.六味地黄丸

149.方药配伍意在“益火之源,以消阴翳”的方剂是

150.方药配伍意在“壮水之主,以制阳光”的方剂是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	B	C	B	B	B	B	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	D	D	D	B	C	E	C	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	D	C	D	B	B	B	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	D	A	E	A	C	D	C	E	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	D	A	D	E	C	D	B	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	A	A	D	C	E	B	D	B	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	C	E	C	D	C	C	E	B	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	A	E	A	D	E	E	D	D	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	E	A	D	B	E	B	D	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	E	B	D	A	D	C	C	B	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	A	D	C	E	B	D	A	C	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	B	B	A	C	B	D	A	B	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	A	D	E	D	C	A	C	C	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	D	C	B	E	A	D	B	C	E
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	C	B	D	A	B	B	D	B	E

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.病人表情淡漠,神识痴呆,喃喃自语,哭笑无常属于
A.癲病
B.狂病
C.脏燥
D.痫病
E.惊风
- 2.肺气壅滞多表现为
A.但卧不得坐,坐则昏眩
B.坐而喜俯
C.蜷卧缩足,喜加衣被
D.坐而仰首
E.神倦俯卧
- 3.手足蠕动,多见于
A.热极生风
B.血虚生风
C.肝阳化风
D.外感风邪
E.阴虚动风
- 4.舌绛苔黄腻的临床意义是
A.气营两燔
B.湿热兼痰饮
C.胃肠燥热
D.营热兼痰饮
E.胃阳虚
- 5.热毒炽盛,内入营血,营阴受灼,津液耗损,气血壅滞的舌象为
A.舌色紫红或绛紫而干枯少津
B.舌色淡紫而湿润
C.舌色淡红中泛现青紫
D.舌有紫色斑点
E.全舌青紫
- 6.手足软弱无力、行动不灵而无痛者为
A.中风后遗症
B.痫证
C.痹证
D.痿证
E.瘫痪
- 7.肝经风热者易出现
A.眼胞赤烂
B.目眦红赤
C.全目赤肿
D.白睛淡黄
E.目窠微肿
- 8.咽喉色鲜红娇嫩、肿痛不甚者的原因为
A.肺胃积热
B.痰湿停滞
C.寒凝咽喉
D.阴虚火旺
E.胃中有热
- 9.脾在五轮学说中为
A.水轮
B.风轮
C.气轮
D.血轮
E.肉轮
- 10.小儿指纹色紫黑的主病为
A.热证
B.外感表证
C.风证
D.虚证

- E. 血络闭郁
11. 阴囊肿大而透明者为
- A. 狐疝
B. 水疝
C. 阴缩
D. 阴茄
E. 寒疝
12. 小儿囟门高突, 多因
- A. 温病火邪上攻
B. 脾胃虚寒
C. 肾气不足
D. 吐泻伤津
E. 气血不足
13. 青少年白发, 且伴有失眠健忘的临床意义是
- A. 肾虚
B. 劳神伤血
C. 肝阴亏虚
D. 脾肾阳虚
E. 阳明热盛
14. 痰白而清稀, 或有灰黑点者, 属
- A. 湿痰
B. 寒痰
C. 热痰
D. 燥痰
E. 风痰
15. 阳明经证与腑证的鉴别要点是
- A. 有无发热
B. 有无汗出
C. 有无神志改变
D. 有无燥屎内结
E. 有无舌苔黄燥
16. 气血不足, 舌体脉络不充时, 多见的舌象表现是
- A. 瘦舌
B. 点、刺舌
C. 老舌
D. 嫩舌
E. 胖舌
17. 阳热有余, 蒸腾胃中腐浊邪气上升可形成
- A. 白腻苔
B. 积粉苔
C. 黄腻苔
D. 腐苔
E. 黏腻苔
18. 暖气、呃逆、呕吐的病机是
- A. 肺气上逆
B. 肝气上逆
C. 胃气上逆
D. 肝郁气滞
E. 脾失健运
19. 言语轻迟低微, 欲言不能复言者, 称为
- A. 谵语
B. 郑声
C. 独语
D. 错语
E. 夺气
20. 常见饭后嗜睡, 其原因多为
- A. 湿邪困脾
B. 心肾阳虚
C. 胃火亢盛
D. 脾气虚弱
E. 邪闭心神
21. 太阳经头痛的特点为
- A. 两侧太阳穴附近痛甚
B. 前额部连及眉棱骨痛
C. 巅顶痛
D. 后头痛连项背
E. 头痛连齿
22. 小便余沥不尽多属
- A. 膀胱湿热
B. 肾不纳气
C. 肾气不固
D. 肾精不足
E. 小肠实热
23. 带下量多色白、清稀如涕者, 多属
- A. 脾虚湿注
B. 湿热下注
C. 肝经郁热
D. 冲任亏虚

- E.肝肾阴虚
- 24.湿温潮热的特点是
- A.热势较高,日晡为甚
- B.身热不扬,午后热甚
- C.午后低热
- D.夏季长期微热
- E.骨蒸劳热
- 25.脏气衰败,脉气不相顺接时多见的脉象是
- A.弦脉
- B.结脉
- C.濡脉
- D.促脉
- E.紧脉
- 26.气、血、痰、食等有形实邪停滞时的脉象是
- A.促脉
- B.紧脉
- C.代脉
- D.伏脉
- E.濡脉
- 27.缓脉的主病为
- A.水饮
- B.痰证
- C.湿证
- D.食积
- E.气滞
- 28.患者突起胃脘疼痛,呕吐清涎,面色苍白,舌苔白润,脉沉紧,其临床意义是
- A.表实寒证
- B.表实热证
- C.里虚寒证
- D.里虚热证
- E.里实寒证
- 29.少阴病的主要病理特征为
- A.心气不足
- B.阴血不足
- C.心肾虚衰
- D.脾肾阳虚
- E.肺肾两虚
- 30.由逍遥散变化为黑逍遥散,属于
- A.药味加减的变化
- B.药量增减的变化
- C.剂型更换的变化
- D.药味加减和药量增减变化的联合运用
- E.药量增减和剂型更换变化的联合运用
- 31.由四逆汤化裁为通脉四逆汤属于
- A.药味加减的变化
- B.药量增减的变化
- C.剂型更换的变化
- D.药味加减与药量增减变化的联合运用
- E.药味加减与剂型更换变化的联合运用
- 32.下列各项中属于“反佐”范畴的是
- A.寒因寒用,热因热用
- B.寒者热之,热者寒之
- C.壮水之主,以制阳光
- D.形不足者,温之以气
- E.热药冷服,寒药热服
- 33.因药性峻猛,为了使其缓和发挥药效,因此作成丸剂的是
- A.抵挡丸
- B.肾气丸
- C.四生丸
- D.金锁固精丸
- E.朱砂安神丸
- 34.较多使用反佐药的方剂是
- A.补益剂和泻下剂
- B.清热剂和温里剂
- C.祛风剂和治燥剂
- D.涌吐剂和开窍剂
- E.解表剂和和解剂
- 35.固涩剂可用于
- A.阳明肠热的下利
- B.热甚迫津的汗多
- C.湿热下注的带下
- D.阴虚血热的崩漏
- E.火扰精室的遗精
- 36.具有清利三焦湿热功用的方剂是

- A. 五苓散
B. 猪苓汤
C. 八正散
D. 连朴饮
E. 黄连解毒汤
37. 理中丸的功用是
A. 温中补虚, 降逆止呕
B. 温中散寒, 补气健脾
C. 温中补虚, 和里缓急
D. 温经散寒, 养血通脉
E. 温中散寒, 降逆止呕
38. 一贯煎的功用是
A. 滋补肝肾
B. 滋阴疏肝
C. 滋养肺胃
D. 滋阴降火
E. 温补肝肾
39. 地黄饮子的功用不涉及
A. 化痰开窍
B. 镇肝息风
C. 滋阴温阳
D. 补肾
E. 协交心肾
40. 完带汤的功用是
A. 健脾养血, 收涩止带
B. 补中健脾, 祛湿止带
C. 健脾补肾, 收涩止带
D. 健脾燥湿, 清热止带
E. 温养冲任, 固经止带
41. 具有温肾益精, 润肠通便功用的方剂是
A. 增液汤
B. 黄龙汤
C. 麻子仁丸
D. 济川煎
E. 肾气丸
42. 小建中汤的主治为
A. 中焦虚寒, 自利不渴, 腹痛呕吐, 不欲饮食
B. 虚劳里急, 腹中时痛, 喜得温按, 舌淡苔白, 脉弦细而缓
C. 阳弱血虚, 外受寒邪, 手足厥寒, 舌淡苔白, 脉细欲绝
D. 中阳虚衰, 阴寒内盛, 心胸中大寒痛, 呕而不能食
E. 胃中虚冷, 食谷欲呕, 胸膈满闷, 或脘腹疼痛
43. 治疗痈疡肿毒阳证的代表方剂是
A. 犀黄丸
B. 阳和汤
C. 小金丹
D. 仙方活命饮
E. 透脓散
44. 猪苓汤中配伍阿胶的用意是
A. 滋阴补血
B. 补血止血
C. 滋阴润燥
D. 润肺止咳
E. 养血益气
45. 独活寄生汤的组成中不含
A. 秦艽、防风、细辛
B. 杜仲、牛膝、肉桂
C. 人参、茯苓、甘草
D. 地黄、芍药、川芎
E. 羌活、白术、续断
46. 复元活血汤的君药是
A. 栀子、蒲黄
B. 青黛、栀子
C. 柴胡、当归
D. 大黄、栀子
E. 大黄、柴胡
47. 组成中含有苦寒清热药的方剂是
A. 羚角钩藤汤
B. 天麻钩藤饮
C. 阿胶鸡子黄汤
D. 大定风珠
E. 紫雪
48. 辛凉解表剂中有时配伍少量辛温解表药, 其目的在于
A. 发散风寒
B. 助透表邪外出
C. 解肌发汗

- D. 监制方中寒凉,以防凉遏
E. 通络止痛
49. 止血剂组方中较少伍用
- A. 理气药
B. 养血药
C. 活血药
D. 清热药
E. 益气药
50. 固涩剂组方中,最常与固涩药配用的是
- A. 清热药
B. 温里药
C. 泻下药
D. 利湿药
E. 补益药
51. 人参败毒散中的君药是
- A. 羌活、独活
B. 前胡、柴胡
C. 人参、茯苓
D. 桔梗、枳壳
E. 川芎
52. 半夏泻心汤所治心下痞是由何因所致
- A. 太阳病误下
B. 少阳病误下
C. 阳明病下之过早
D. 阳明病应下失下
E. 太阳病大下后,复发汗
53. 清燥救肺汤中的君药是
- A. 人参、麦冬
B. 石膏、桑叶
C. 枇杷叶、杏仁
D. 胡麻仁、阿胶
E. 甘草、人参
54. 可用于肠热下利的方剂有
- A. 葛根芩连汤、黄连解毒汤、升麻葛根汤、大承气汤
B. 黄连解毒汤、升麻葛根汤、大承气汤、半夏泻心汤
C. 升麻葛根汤、大承气汤、半夏泻心汤、大柴胡汤
D. 大承气汤、半夏泻心汤、大柴胡汤、蒿芩清胆汤
E. 半夏泻心汤、大柴胡汤、蒿芩清胆汤、芍药汤
55. 归脾汤与天王补心丹主治证的主要不同点为
- A. 食少便溏与舌疮尿赤
B. 心悸失眠与心烦不寐
C. 脾虚与心虚
D. 气血不足与阴虚火旺
E. 心脾两虚与心肾两虚
56. 旋覆代赭汤与橘皮竹茹汤两方中含有的相同药味是
- A. 半夏、茯苓、生姜、大枣
B. 半夏、茯苓、生姜、甘草
C. 半夏、人参、甘草、大枣
D. 人参、甘草、大枣、生姜
E. 半夏、黄芩、甘草、生姜
57. 制方中蕴含“清金泻木”原理的方剂是
- A. 左金丸
B. 苇茎汤
C. 补肺阿胶汤
D. 泻白散
E. 一贯煎
58. 制方不涉及“金水相生”原理的方剂是
- A. 麦味地黄丸
B. 百合固金汤
C. 养阴清肺汤
D. 月华丸
E. 一贯煎
59. 含有茯苓、细辛、干姜、五味子药物组成的方剂是
- A. 温胆汤
B. 大陷胸汤
C. 贝母瓜蒌散
D. 小陷胸汤
E. 半夏泻心汤
60. 急性喉炎的病人常出现
- A. 刺激性干咳

- B.夜间咳
C.犬吠样咳嗽
D.咯血丝痰
E.咳大量脓痰
- 61.急性心包炎早期具有诊断价值的体征是
A.奇脉
B.血压下降,脉压减小
C.深大呼吸
D.心包摩擦音
E.水冲脉
- 62.毛细血管搏动征最常见于
A.肺动脉瓣狭窄
B.主动脉瓣狭窄
C.主动脉瓣关闭不全
D.肺动脉瓣关闭不全
E.二尖瓣狭窄
- 63.以下意识障碍中哪种表现是最轻浅的
A.浅昏迷
B.意识模糊
C.嗜睡
D.谵妄
E.深昏迷
- 64.下列各项中,不属于腹部体表标志的是
A.麦氏点
B.耻骨联合
C.脐
D.髂嵴
E.腹直肌联合上
- 65.镜面舌可见于
A.麻疹
B.猩红热
C.恶性贫血
D.胃溃疡
E.伤寒
- 66.杵状指不常见于哪种情况
A.肺脓肿
B.感染性心内膜炎
C.溃疡性结肠炎
D.肺癌
E.发绀型心脏病
- 67.吸气性呼吸困难主要见于
A.慢性支气管炎
B.支气管哮喘
C.阻塞性肺气肿
D.气管异物
E.肺炎
- 68.肺上界变宽常见于
A.肺萎缩
B.肺气肿
C.肺尖结核
D.肺纤维化
E.胸腔积液
- 69.一侧瞳孔直接对光反射消失,间接对光反射存在,病变在
A.同侧动眼神经
B.对侧动眼神经
C.同侧视神经
D.对侧视神经
E.视交叉
- 70.下列哪项属于脑膜刺激征
A.Brudzinski 征
B.Gordon 征
C.Babinski 征
D.Gonda 征
E.Lastgue 征
- 71.口唇发绀,吸气时出现“三凹征”,应考虑为
A.气管阻塞
B.慢性支气管炎
C.支气管哮喘
D.慢性阻塞性肺气肿
E.支气管扩张
- 72.右侧鼻唇沟变浅,口角下垂,额纹变浅,右侧眼裂变大,不能鼓颊、露齿,应考虑为
A.同侧面神经麻痹
B.对侧面神经麻痹
C.同侧皮质延髓束损害
D.对侧皮质延髓束损害

- E.同侧三叉神经麻痹
- 73.急性心肌梗死患者常有发热,其主要机制是
- A.变态反应
B.代谢障碍
C.体温调节中枢失常
D.神经功能障碍
E.以上都不是
- 74.风心病二尖瓣狭窄患者,随右心功能不全的加重,临床表现将减轻的是
- A.肝大压痛
B.心率增快
C.急性肺水肿
D.心尖区舒张期隆隆样杂音
E.胃肠道淤血症状
- 75.X线发现心影呈梨形增大,是由于
- A.右室、左室增大
B.左室、左房增大
C.右室、左房增大,肺动脉干突出
D.右室、右房增大
E.左室增大,主动脉弓突出
- 76.下列除哪项外,均属急腹症
- A.消化性溃疡病
B.胃肠平滑肌痉挛
C.胃肠穿孔
D.肠梗阻
E.实质脏器破裂
- 77.前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是
- A. V_1 、 V_2 、 V_3
B. V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_5
C. V_3 、 V_4 、 V_5
D. V_5 、I、aVL
E. II、III、aVF
- 78.尿中出现白细胞管型见于
- A.急性肾小球肾炎
B.肾病综合征
C.肾盂肾炎
D.肾动脉硬化症
E.多发性骨髓瘤
- 79.缺铁性贫血,经铁剂治疗后1周,首

- 先出现的治疗反应是
- A.红细胞数升高
B.血细胞比容增加
C.血小板增加
D.网织红细胞增加
E.红细胞平均容积(MCV)恢复正常
- 80.下列关于急性胰腺炎酶学检查的叙述,正确的是
- A.血清淀粉酶多在发病1~2小时开始增高
B.尿淀粉酶多在发病3~4小时开始增高
C.胰腺广泛坏死时,尿淀粉酶可不增高
D.尿淀粉酶的增高多早于血清淀粉酶
E.尿、血清淀粉酶常同时增高
- 81.下列哪种疾病可引起淋巴细胞增多
- A.百日咳
B.猩红热
C.钩虫病
D.疟疾
E.败血症
- 82.恶性肿瘤转移之淋巴结特点正确的是
- A.表面光滑无粘连
B.质地坚硬或有橡皮样感
C.柔软
D.有压痛
E.肿大到一定程度即可缩小、消退
- 83.下列哪种疾病可引起淋巴细胞减少
- A.再生障碍性贫血
B.传染性单核细胞增多症
C.接触放射线及应用肾上腺皮质激素后
D.结核病
E.某些病毒感染如流行性腮腺炎等
- 84.胃癌的龛影特点是
- A.龛影凸向胃壁之外,周围黏膜呈放射状集中
B.龛影凸向胃腔之内,其周围黏膜中断
C.局部胃壁软、蠕动活跃
D.三者都是

- E.三者都不是
- 85.双侧呼吸运动减弱见于
- A.肺脓肿
B.肺结核
C.肺气肿
D.大叶性肺炎
E.气胸
- 86.尿中出现红细胞管型见于
- A.肾病综合征
B.慢性肾炎
C.急性肾盂肾炎
D.肾动脉硬化症
E.急性肾炎
- 87.关于溶血性贫血,下列哪项是错误的
- A.网织红细胞增多
B.周围血中可有幼红细胞出现
C.骨髓增生活跃,粒红比值增高
D.尿中胆红素阴性
E.尿中尿胆原增多
- 88.嗜酸性粒细胞增多见于
- A.寄生虫病
B.副伤寒
C.感染早期
D.应用肾上腺皮质激素后
E.X线照射后
- 89.鉴别再生障碍性贫血与急性白血病最主要的检查是
- A.血小板计数
B.网织红细胞计数
C.周围血中找幼红细胞
D.周围血中找幼粒细胞
E.骨髓检查
- 90.下列哪一项不是蜘蛛痣的特点
- A.妊娠期妇女及健康人不出现
B.如按压中心红斑,则其周围毛细血管退色,移去压力后即复原
C.通常出现于上腔静脉分布的区域
D.常见于急、慢性肝炎或肝硬化
E.与肝对体内雌激素灭活能力减弱有关
- 91.对医术与医德之间关系的理解有误

的是

- A.“医乃仁术”
B.有能力做的就应该去做
C.“大医精诚”
D.临床医学决策同时也是伦理决策
E.前沿医学技术应用于临床必须有医德参与
- 92.生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,引起了医德的一系列变化,但应除外
- A.医德根本宗旨的变化
B.医德意识的变化
C.医德理论的变化
D.促进了生命伦理学的诞生
E.医德规范的变化
- 93.最有利于医务人员进行创新,从而体现出自身正效应的市场经济固有属性的是
- A.自主性
B.平等性
C.开放性
D.竞争性
E.可控性
- 94.市场经济对医学实践的作用决定了医学服务
- A.与市场机制相容
B.应该市场化
C.不能引入市场机制
D.必须有控制地引入市场机制
E.完全符合市场机制
- 95.“医学五戒十要”出自
- A.陈实功
B.孙思邈
C.李时珍
D.华佗
E.张仲景
- 96.世界上最早的关于人体试验的国际性医德文献是
- A.1803年的《医学伦理学》
B.1946年的《纽伦堡法典》
C.1948年的《日内瓦宣言》
D.1964年的《赫尔辛基宣言》

E.1981年的《人体生物医学研究的国际标准》

97.医学人道主义经历的三个时期不包括

- A.古代朴素的医学人道主义
- B.现代革命人道主义
- C.近代医学人道主义
- D.现代医学人道主义
- E.当代医学人道主义

98.对医学伦理学不伤害原则的准确理解是对病人

- A.避免责任伤害
- B.避免技术伤害
- C.避免躯体伤害
- D.避免心理伤害
- E.以上都是

A2型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

101.某男,35岁。舌左侧长1个黄豆大小的溃疡已1周,局部灼痛难耐,心烦,失眠多梦,溲赤便干,舌红苔黄干,脉数。临床诊断最可能是

- A.肝火上炎证
- B.肝胆湿热证
- C.心火亢盛证
- D.胃火亢盛证
- E.心阴虚证

102.患者咳逆阵作,痰中带血,时时汗出,胸胁胀痛,口苦咽干,尿黄便秘,舌红苔薄黄,脉弦数。其诊断是

- A.肺癆,阴虚火旺
- B.咯血,肝火犯肺
- C.咳嗽,肝火犯肺
- D.肺癆,成痈期
- E.咳嗽,痰热郁肺

103.某女,45岁。2天前食后受凉,腹泻

99.对病人自主与医生做主之间关系的正确理解是

- A.病人自主与医生做主是对立的
- B.病人自主与医生做主不是对立的
- C.强调病人自主,也充分看到医生做主的存在价值
- D.强调医生决定,兼顾病人自主
- E.强调病人自主,目的在于减轻医生的责任

100.医生必须保守病人的秘密,但应考虑除外

- A.病人的生理缺陷
- B.病人的过失行为
- C.病人的某些心理
- D.病人的某些怪癖
- E.病人的不良预后

不止,日行六七次,水样便,腹微痛,纳呆恶心,小便短少,舌苔白厚腻,脉缓。临床诊断最可能是

- A.寒湿内盛证
- B.胃寒证
- C.脾胃虚弱证
- D.外感寒湿证
- E.以上都不是

104.某男,66岁。咳喘无力,痰清稀,纳呆,腹胀,气短乏力,舌淡,脉弱。临床诊断最可能是

- A.肺气虚证
- B.脾气虚证
- C.脾肺气虚证
- D.肺肾气虚证
- E.脾肾气虚证

105.患者,女,24岁。已婚。闭经7个月,形体肥胖,胸胁满闷,呕恶痰多,面浮肿,

舌淡苔白腻,脉沉滑。其证候是

- A.肝肾不足
- B.气血虚弱
- C.痰湿阻滞
- D.肝血不足
- E.肺肾阴虚

106.患者心烦不得卧,口燥咽干,舌尖红,脉细数。其诊断是

- A.太阴病证
- B.厥阴病证
- C.少阳病证
- D.少阴热化证
- E.少阴寒化证

107.患者,男,40岁。身热不扬,汗出不畅,午后热甚,头身困重,小溲黄浊,舌苔黄腻,脉濡数。其发热属于

- A.阳明经热
- B.阴虚潮热
- C.湿温潮热
- D.阳明潮热
- E.气虚发热

108.患儿,8岁。平素口燥咽干,溲赤便干,近日受风,发热,微恶寒,头痛,鼻塞流浊涕,舌红苔薄白,脉浮数。临床诊断最可能是

- A.里实热证
- B.外感风热证
- C.表里俱热证
- D.表热里寒证
- E.以上都不是

109.某男,43岁。入冬以后,肢体关节游走酸痛,沉重,苔薄白,脉弦缓。临床诊断最可能是

- A.表湿证
- B.里湿证
- C.风湿证
- D.寒湿证
- E.湿热证

110.脘腹痞胀,食少难消,大便溏薄,舌苔腻,脉虚弱,治宜选用

- A.枳术丸

B.枳实消痞丸

C.枳实导滞丸

D.木香槟榔丸

E.保和丸

111.身热多汗,心胸烦闷,气逆欲呕,体倦口干,舌红少苔,脉象虚数者,治宜选用

A.竹叶石膏汤

B.清营汤

C.白虎汤

D.银翘散

E.犀角地黄汤

112.蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

A.散结除痞,降逆止呕

B.燥湿化痰,和胃降逆

C.散肝舒脾,降逆止呕

D.下气宽中,除痰消痞

E.温中散寒,散结除痞

113.肺肾阴虚,咳痰带血,咽喉燥痛,手足心热,骨蒸盗汗,舌红少苔,脉细数者,治宜选用

A.咳血方

B.清燥救肺汤

C.百合固金汤

D.养阴清肺汤

E.六味地黄汤

114.九味羌活汤证的病因病机是

A.阳气不足,感冒风寒,营涩卫郁

B.风寒外束,卫阳不得外达,营气涩而不畅

C.风邪在表,卫强营弱,营卫不和

D.风寒湿邪,困束肌表,内有蕴热

E.风寒湿邪郁久化热

115.不适宜用吴茱萸汤治疗的病证是

A.胃中虚冷,症见食谷欲呕者

B.肝寒上逆,症见头痛、干呕、吐涎沫者

C.脾胃阳虚,阴寒上乘,症见胸满而痛,甚至胸痛彻背者

D.肾阳不足,寒气内甚,症见吐利、手足逆冷者

E.肝寒犯胃,症见脘腹冷痛、呕吐酸

水者

116. 主治外感风邪头痛的方剂是

- A. 镇肝息风汤
- B. 川芎茶调散
- C. 玉真散
- D. 消风散
- E. 桂枝汤

117. 骨蒸潮热, 盗汗遗精, 咳嗽咯血, 心烦易怒, 足膝痛热, 舌红少苔, 尺脉数而有力, 治宜选用

- A. 清骨散
- B. 百合固金汤
- C. 大补阴丸
- D. 六味地黄丸
- E. 咳血方

118. 归脾汤中配伍茯苓的意义在于

- A. 健脾渗湿
- B. 渗湿止泻
- C. 利水消肿
- D. 宁心安神
- E. 涤痰除饮

119. 产后血虚受寒, 恶露不尽, 少腹冷痛, 治宜选用

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 失笑散
- C. 生化汤
- D. 当归补血汤
- E. 温经汤

120. 胸胁疼痛, 痛如针刺, 痛处不移, 舌边有瘀点, 脉弦涩, 治宜选用

- A. 血府逐瘀汤
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 丹参饮
- D. 一贯煎
- E. 越鞠丸

121. 患者, 男性, 29 岁。因眩晕发作来急诊。超声心动图示室间隔明显增厚, 流出道部分向左室内突出。下列体检记录最可能错误的是

- A. 心界轻度增大
- B. 可闻 S₄

C. 心尖 3/6 级收缩期杂音

D. 胸骨左缘 3~4 肋间较粗糙的喷射性杂音

E. A2 亢进

122. 患者, 男, 18 岁。2 天来发热 T 38℃ 左右, 开始上腹部疼痛伴恶心, 未吐, 6 小时后转至右下腹痛且逐渐加重, 排便 1~2 次/日, 稍溏, 无黏液, 查体阑尾点有压痛, 无反跳痛, 无肌紧张。腰大肌征阳性。临床诊断最可能是

- A. 急性胃炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性肠炎
- D. 泌尿系结石
- E. 阑尾炎穿孔

123. 患者, 男, 40 岁。低热、腰酸、夜尿增多 7 年。血压 16/12 kPa (120/90 mmHg), 尿蛋白(+), 红细胞 1~3/HP, 白细胞(+), 白细胞管型 1~2/HP, 1 小时尿细胞排泄率白细胞 > 40 万/h, 红细胞 6 万/h, 尿素氮 60 mmol/L, 内生肌酐清除率 110 mmol/L, 诊断应考虑

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性膀胱炎
- E. 慢性肾功能衰竭

124. 女性, 18 岁。因上腹部胀痛 1 天就诊。一天前大量进食油腻食物并饮酒后上腹部胀痛不已, 伴恶心, 呕吐后腹痛减轻, 不发热。查体: 上腹部轻压痛, 墨菲征(-), 肝脾未及。临床诊断最可能是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肾炎
- D. 急性胃炎
- E. 慢性胃炎

125. 男性, 59 岁。近两日来出现头晕, 胸闷, 心脏 X 线表现为左心室肥厚、增大, 主动脉增宽、延长、迂曲, 有肺淤血和肺水肿征象, 考虑最可能的诊断是

A. 慢性肺源性心脏病

- B.高血压心脏病
- C.风湿性心脏病
- D.心包积液
- E.以上都不是

126.患者,男性,38岁。半年来上腹部规律性疼痛就诊。患者平素饮食不规律,午后两三点及夜间上腹部疼痛发作,向后背放射。遇暖及进食后能缓解,伴反酸、嗝气。查体:上腹部偏右轻压痛,肝脾未及。临床诊断最可能是

- A.慢性胃炎
- B.十二指肠溃疡
- C.慢性胆囊炎
- D.慢性胰腺炎
- E.慢性肾炎

127.患者,男性,57岁。因急性下壁心肌梗死入院。检查:血压90/60 mmHg,心率42次/分,律齐,最可能的心律失常是

- A.心房颤动
- B.房性期前收缩
- C.室性心动过速
- D.三度房室传导阻滞
- E.完全右束支传导阻滞

128.患者胸骨下部显著前突,左、右胸廓塌陷,肋骨与肋软骨交界处变厚增大,上下

相连呈串珠状。其诊断是

- A.肺结核
- B.佝偻病
- C.肺气肿
- D.支气管哮喘
- E.肺纤维化

129.男性,74岁。咳嗽、胸痛近2个月,昨日痰中带血,X线胸片显示:左肺门肿块影约3 cm大小,边缘有分叶征,伴左上叶肺不张。考虑下列哪种病变

- A.肺结核
- B.肺炎
- C.肺癌
- D.结节病
- E.肺脓肿

130.女性,76岁。近3天来觉腹痛腹胀,伴呕吐,无排便,排气。体检:右下腹压痛,肠鸣音亢进。血压130/90 mmHg。首先考虑采用哪种检查方法

- A.立位腹透或立位腹平片
- B.卧位腹透或卧位腹平片
- C.B超检查
- D.腹部CT
- E.磁共振检查

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132题共用备选答案)

- A.脾胃火盛
- B.肺热壅盛
- C.心火亢盛
- D.肝胆火热
- E.肾水将涸

131.舌边生芒刺的临床意义是

132.舌中生芒刺的临床意义是

(133~134题共用备选答案)

- A.邪气在骨髓
- B.邪气深入脏腑
- C.邪气入络
- D.邪气入经
- E.邪气在皮毛

133.小儿食指络脉显于气关为

134.小儿食指络脉显于命关为

(135~136题共用备选答案)

- A.痰气郁结

- B.痰火扰心
C.肝风挟痰
D.肝风内动
E.肝阳上亢
- 135.痢病的病机为
136.狂证的病机为
(137~138 题共用备选答案)
A.洪数脉
B.浮数脉
C.滑数脉
D.濡数脉
E.弦数脉
- 137.肝郁化火多见
138.食积内热多见
(139~142 题共用备选答案)
A.燥湿和胃
B.清热祛湿
C.温阳化湿
D.祛湿化浊
E.利水渗湿
- 139.实脾散的功用是
140.五苓散的功用是
141.平胃散的功用是
142.三仁汤的功用是
(143~144 题共用备选答案)
A.小活络丹
B.补阳还五汤
C.当归四逆汤
D.黄芪桂枝五物汤
E.阳和汤
- 143.具有温经养血,散寒通脉功用的方剂是
144.具有益气活血,散瘀通络功用的方剂是
(145~146 题共用备选答案)
A.心界呈靴形
B.心尖部矛盾运动
C.心浊音界向两侧扩大,坐位呈“烧瓶样”
D.心界呈梨形
E.心界不大
- 145.主动脉瓣关闭不全时
146.风湿性心脏病二尖瓣狭窄时
(147~148 题共用备选答案)
A.水样便
B.柏油便
C.黏液脓血便
D.绿色稀便
E.米泔样便
- 147.细菌性痢疾病人的粪便是
148.上消化道出血的粪便是
(149~150 题共用备选答案)
A.发热伴胸腹部玫瑰疹
B.发热伴盗汗、消瘦、乏力
C.发热伴右上肢痛、黄疸
D.发热伴腰痛、尿频
E.发热伴头痛、喷射性呕吐、颈项强直
- 149.急性胆囊炎出现
150.肺结核出现

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	E	D	A	D	C	D	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	B	B	D	D	D	C	E	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	A	B	D	A	C	E	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	A	B	D	C	B	B	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	B	D	C	E	E	B	B	A	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	B	A	D	D	E	E	C	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	C	C	A	C	C	D	B	C	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	A	E	C	C	A	A	C	D	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	B	C	B	C	E	C	A	E	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	A	D	D	A	B	B	E	C	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	B	A	C	C	D	C	C	C	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	B	C	D	C	B	C	D	C	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	B	A	D	B	B	D	B	C	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	A	D	B	C	B	E	C	C	E
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	C	B	A	D	C	B	C	B

第三单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.感冒总的治疗原则

- A.辛温解表
- B.辛凉解表
- C.解表达邪
- D.祛湿解表
- E.益气解表

2.咳嗽首辨

- A.虚实
- B.外感、内伤
- C.寒热
- D.阴阳
- E.表里

3.哮病与哪些脏腑有关

- A.肝、脾、肾
- B.心、肺、肾
- C.心、肺、脾
- D.肺、脾、胃
- E.肺、脾、肾

4.下列哪项是肺痈形成的过程

- A.初期、成痈期、溃脓期、恢复期
- B.成痈期、溃脓期、恢复期
- C.初期、成痈期、溃脓期
- D.初期、溃脓期、恢复期
- E.初期、成脓期、溃脓期、恢复期

5.哮证发作的病理关键是

- A.宿痰内伏于肺
- B.外邪侵袭,触动伏痰
- C.痰气相击,气道被阻
- D.邪袭于肺,肺气不利

E.肺脏虚弱,气失所主

6.下列除哪一项外均为喘证的特征

- A.呼吸困难
- B.张口抬肩
- C.喉中哮鸣有声
- D.鼻翼扇动
- E.不能平卧

7.实喘和虚喘的鉴别,下列何项是错误的

- A.呼吸深长有余与短促难续
- B.呼出为快与深吸为快
- C.气粗声高与气怯声低
- D.病势急骤与徐缓
- E.痰多与痰少

8.肺痈之溃脓期的主要病理是

- A.风邪伤表,内壅于肺
- B.热毒壅肺,热壅血瘀
- C.热毒炽盛,血败肉腐
- D.阴伤气耗,邪去正虚
- E.邪气入里,正邪相争

9.肺癆后期的病位主要是在

- A.肺、脾
- B.脾、肾
- C.肺、肾
- D.肺、脾、肾
- E.心、肝、肺、肾

10.心悸之心阳不振证的主症特点是

- A.心悸不宁,善惊易恐
- B.心悸气短,倦怠乏力

- C.心悸不安,面白肢冷
D.心悸气急,胸闷痞满
E.心悸时作,胸闷烦躁
- 11.治疗心悸之痰火扰心证,宜首选的方剂是
- A.安神定志丸
B.归脾汤
C.天王补心丹合朱砂安神丸
D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
E.黄连温胆汤
- 12.胸痹气滞心胸证的治法是
- A.疏肝理气,活血通络
B.活血化瘀,通脉止痛
C.通阳泄浊,豁痰宣痹
D.辛温散寒,宣通心阳
E.益气养阴,活血通脉
- 13.心血瘀阻型胸痹的主症,下列哪项是错误的
- A.痛有定处
B.疼痛如刺如绞
C.可因暴怒而加重
D.心胸疼痛剧烈
E.遇阴雨天易发或加重
- 14.治疗不寐之痰热扰心证,宜选用的方剂是
- A.黄连阿胶汤
B.导痰汤
C.半夏秫米汤
D.朱砂安神丸
E.黄连温胆汤
- 15.下列哪项不是引起不寐的原因
- A.胃中不和,痰热内扰
B.思虑劳倦,内伤心脾
C.心虚胆怯,心神不安
D.阴虚火旺,肝阳扰动
E.气郁痰结,阻闭神明
- 16.内伤头痛的诊断要点,下列哪项是错误的
- A.痛势较缓
B.起病较缓
C.痛无休止
D.多表现为隐痛、空痛、昏痛
E.劳累痛甚
- 17.厥阴经头痛的部位是
- A.头后部及两侧
B.枕部及项部
C.前额部及眉棱处
D.头两侧及耳部
E.巅顶或连于目系
- 18.下列哪项概括了眩晕发生的病机
- A.痰、热、风、湿
B.风、火、痰、瘀
C.火、气、血、虚
D.风、痰、气、血
E.风、火、血、虚
- 19.中风病机与下列哪些因素无关
- A.肝火、肝风、心火
B.风寒、风热、风湿
C.风痰、湿痰、痰热
D.气逆、血瘀
E.阴虚、气虚、血虚
- 20.下列哪项不是狂证的治法
- A.镇心祛痰
B.清肝泻火
C.滋阴降火
D.养心健脾
E.安神定志
- 21.风痰闭阻之痫病的治法是
- A.涤痰息风,开窍定痫
B.清肝泻火,化痰开窍
C.涤痰开窍,化痰通络
D.息风开窍,化痰定志
E.化痰通络,镇心安神
- 22.脾肾两虚型痴呆的治法是
- A.补肾健脾,益气生精
B.健脾化浊,豁痰开窍
C.活血化瘀,开窍醒脑
D.补肾益髓,填精养神

- E. 益气养血,清心宣窍
23. 胃痛的病理特点是
- A. 肝胃不和,胃气郁滞
B. 胃气上逆,失于和降
C. 胃气郁滞,失于和降
D. 肝郁化火,胃气郁滞
E. 脾胃不和,气机郁滞
24. 痞满与鼓胀的相同症状是
- A. 外有胀大之形
B. 按之无痛
C. 触之无形
D. 胀满之苦
E. 心下痞塞
25. 呕吐实证,因邪气犯胃,浊气上逆所致者,其治法是
- A. 和胃理气,降逆止呕
B. 理气疏肝,和胃降逆
C. 祛邪化浊,和胃降逆
D. 和胃降逆,消食导滞
E. 理气化痰,和胃降逆
26. 噎膈的产生除与食管、胃有关外,还与哪些脏腑有关
- A. 心、脾、肾
B. 肝、脾、肾
C. 肝、脾、肺
D. 肺、脾、肾
E. 心、肝、肺
27. 呃逆的临床特征描述不正确的是
- A. 喉间呃呃连声
B. 声短而频,不能自制
C. 气逆上冲
D. 腕中不适
E. 起病多较缓
28. 下列何者为寒邪内阻型腹痛的疼痛特点
- A. 腹部胀痛,攻窜不定
B. 腹痛绵绵,时作时止
C. 腹部胀满,疼痛拒按
D. 腹痛急暴,得温痛减
E. 饥则痛甚,得食稍减
29. 治疗泄泻初起不宜
- A. 分利
B. 消导
C. 疏解
D. 清化
E. 固涩
30. 下列哪项不是痢疾的主要病理变化
- A. 脾虚湿盛
B. 湿热壅滞肠中
C. 肠道传导失司
D. 气血壅滞肠中
E. 寒湿滞留肠中
31. 便秘的病理关键是
- A. 热盛伤津,肠道津枯
B. 大肠传导功能失常
C. 气机阻滞,胃肠障碍
D. 气血亏虚,大肠无力
E. 阴寒内生,胃肠凝滞
32. 胁痛的病理特点是
- A. 肝胃不和,胃气郁滞
B. 肝气郁结,胃失和降
C. 肝胆湿热,络脉不和
D. 饮停胁下,肝肺失司
E. 肝失疏泄,络脉不和
33. 下列哪项不属于阳黄与阴黄的鉴别要点
- A. 小便黄与不黄
B. 病程较长与较短
C. 黄疸鲜明与晦暗
D. 热证与寒证
E. 发病急与缓
34. 下列除哪项外均为积聚的发病原因
- A. 情志失调
B. 感受寒湿
C. 饮食所伤
D. 它病转移
E. 外感湿热
35. 鼓胀的病位在

- A.肺、脾、肾
B.心、脾、肾
C.肝、脾、肾
D.心、肝、肾
E.心、肺、肾
- 36.正疟的临床特征是
A.但寒不热,休作有时
B.但热不寒,休作无时
C.寒热往来,休作无时
D.寒战壮热,休作有时
E.寒战壮热,休作无时
- 37.水肿的治疗原则是
A.发汗、利尿、泻下逐水
B.温肾、健脾、养心
C.发汗、利尿、消肿
D.健脾、舒肝、温肾
E.发汗、利尿、舒肝
- 38.下列哪项不是淋证的病因病机
A.多食肥甘,湿热内蕴
B.暴怒气急,肝气郁滞
C.久病体弱,脾肾两虚
D.劳累过度,损伤脾肾
E.外感六淫,肺失通调
- 39.下列哪一条不是关于癃闭的论述
A.辨证首先应分清虚实
B.治疗应据“腑以通为用”的原则
C.治疗还应审因论治,不可滥用
D.有尿痛,每日排尿量多为正常
E.可引起死亡
- 40.关格的主要临床表现为
A.大便不通
B.大便不通,呕吐
C.小便不通,呕吐
D.小便不通
E.腹部胀大
- 41.郁证之气郁化火证的最佳选用方剂是
A.知柏地黄丸
B.清金化痰汤
C.丹栀逍遥散
D.泻心汤
E.龙胆泻肝汤
- 42.冷秘首选方剂是
A.麻子仁丸
B.增液汤
C.六磨汤
D.良附丸
E.温脾汤
- 43.痰饮的形成与肺脾肾三脏失司有重要关系,其中首当其要的是
A.肺
B.脾
C.肾
D.肺肾
E.脾肾
- 44.下列哪项不是消渴常见的病因
A.素体阴虚
B.饮食不节
C.情志失调
D.感受热毒
E.劳欲过度
- 45.战汗的病机特点为
A.正气欲脱,阳不敛阴
B.湿热内蕴,津液外泄
C.营卫不和,卫外失司
D.正邪相争,正气拒邪
E.肺气不足,表卫不固
- 46.下列哪一项不是外感发热与内伤发热的鉴别要点
A.发病急缓
B.病程长短
C.发热高低
D.发热初期是否伴有头身痛、恶寒、鼻塞等
E.发热是在上午还是午后
- 47.虚劳的主要病机是
A.气血阴阳亏损
B.阴虚火旺

- C.脏腑功能失调,气血阴精亏虚
D.脏腑亏损,气血阴阳不足
E.浊毒内盛
- 48.治疗癌病热毒炽盛证的代表方是
A.越鞠丸合化积丸
B.血府逐瘀汤
C.犀角地黄汤河犀黄丸
D.十全大补丸
E.生脉地黄汤
- 49.厥证的基本病理为
A.气虚下陷,清阳不升
B.气机逆乱,气血运行失常
C.痰随气升,上蒙清窍
D.失血过多,气随血脱
E.肝气郁结,肝气上逆
- 50.下列除哪项外是导致痹证的常见病因
A.正气不足
B.久居潮湿,涉水冒雨
C.感受风热与湿邪相并
D.急躁易怒,情志不调
E.素体阳盛或阴虚有热
- 51.痹证痛痹的主症特点是
A.肢体关节疼痛,游走不定
B.肢体关节疼痛,遇寒加重
C.肢体关节疼痛,重浊酸楚
D.肢体关节疼痛,灼热红肿
E.肢体关节疼痛,僵硬变形
- 52.痿证与痹证的主要鉴别点,哪项最为重要
A.肌肉是否瘦削枯萎
B.关节有无肿大变形
C.肢体关节是否屈伸不利
D.肌肉筋骨关节有无疼痛
E.肢体能否随意运动
- 53.颤证的病理性质总属本虚标实,本虚以何者为主
A.气阴两虚
B.气虚
C.阳虚
D.阴津精血亏虚
E.气血不足
- 54.腰痛辨证,首先应分辨
A.在经在络
B.在腑在脏
C.在气在血
D.表里寒热虚实
E.阴证阳证
- 55.手太阳经、足太阳经的交接部位在
A.目内眦旁
B.目外眦旁
C.鼻翼旁
D.口角旁
E.颧骨旁
- 56.隔姜灸的作用是
A.清热解毒杀虫
B.温肾壮阳
C.扶阳固脱
D.防病保健
E.解表散寒温中
- 57.尺泽穴位于
A.肱二头肌腱桡侧缘
B.肱二头肌腱尺侧缘
C.肱二头肌腱桡侧缘的肘横纹中
D.肱二头肌腱尺侧缘的肘横纹中
E.肱二头肌腱尺侧缘向外0.5寸处
- 58.治疗心悸应首选
A.合谷
B.尺泽
C.内关
D.太冲
E.劳宫
- 59.八会穴中的脏会是
A.中腕
B.期门
C.章门
D.京门
E.梁门

60. 针灸治疗肥胖症的处方是
- 肾俞、膀胱俞、中极、三阴交
 - 肾俞、天枢、大横、丰隆、三阴交
 - 丰隆、天枢、三阴交、丰隆、曲池
 - 曲池、天枢、阴陵泉、丰隆、太冲
 - 曲池、大横、丰隆、阴陵泉、太冲
61. 下列哪组穴是俞募配穴
- 肺俞——大杼
 - 胃俞——中脘
 - 大肠俞——关元俞
 - 脾俞——大横
 - 肾俞——命门
62. 昆仑穴的定位是
- 在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷处
 - 在踝区,内踝尖与跟腱之间的凹陷处
 - 在踝区,内踝下方的凹陷处
 - 在踝区,外踝下方的凹陷处
 - 在踝区,内踝与胫骨前肌腱之间的凹陷处
63. 根据骨度分寸,悬钟穴距外踝尖的距离是
- 2 寸
 - 3 寸
 - 4 寸
 - 5 寸
 - 7 寸
64. 化脓灸所属的灸法是
- 直接灸
 - 间接灸
 - 悬起灸
 - 实按灸
 - 天灸
65. 治疗瘀血停胃型胃痛,除主穴外,应选取的配穴是
- 内庭、胃俞
 - 期门、太冲
 - 胃俞、脾俞
 - 膈俞、三阴交
 - 脾俞、关元
66. 手、足三阳经在头部的分布规律是
- 阳明在前,太阳在侧,少阳在后
 - 太阳在前,少阳在侧,阳明在后
 - 少阳在前,阳明在侧,太阳在后
 - 阳明在前,少阳在侧,太阳在后
 - 太阳在前,阳明在侧,少阳在后
67. 十二经脉中,阳经与阳经交接部位在
- 胸腹部
 - 头面部
 - 腹部
 - 四肢部
 - 以上都不是
68. 十二经筋的循行走向
- 均从四肢末端走向头身
 - 主要行于体表
 - 不入内脏
 - 结聚于关节、骨骼部
 - 以上均是
69. 上肢内侧面,经脉正确分布顺序是(指从前到后)
- 肺经、心包经、心经
 - 心包经、心经、肺经
 - 肺经、大肠经、小肠经
 - 大肠经、小肠经、心经
 - 肺经、心经、心包经
70. 少阳经头痛一般表现在
- 顶部
 - 前额
 - 颞部
 - 侧头部
 - 后枕部
71. 治疗因感受寒邪而致的呕吐、腹痛、腹泻常选用
- 隔姜灸
 - 隔蒜灸
 - 隔盐灸
 - 隔附子饼灸
 - 瘢痕灸
72. 具有回阳救逆固脱作用,常用来治疗

中风脱证的是

- A. 隔姜灸
- B. 隔蒜灸
- C. 隔盐灸
- D. 隔附子饼灸
- E. 瘢痕灸

73. 在下列的腧穴中, 哪一组不全是五输穴

- A. 少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽
- B. 厉兑、内庭、陷谷、解溪、足三里
- C. 少泽、前谷、后溪、养老、少海
- D. 大敦、行间、太冲、中封、曲泉
- E. 至阴、足通谷、束骨、昆仑、委中

74. 八脉交会穴中, 主治心、胸、胃部疾患的是

- A. 通任脉、阴跷脉的腧穴
- B. 通冲脉、阴维脉的腧穴
- C. 通带脉、阳跷脉的腧穴
- D. 通督脉、阳跷脉的腧穴
- E. 通冲脉、带脉的腧穴

75. 下列特定穴中, 只具有 6 个的是

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 下合穴
- D. 俞穴
- E. 八脉交会穴

76. 下列穴位中, 属于四总穴中, 治疗面部疾病的是

- A. 合谷
- B. 温溜
- C. 承山
- D. 委中
- E. 丰隆

77. 膀胱的下合穴是

- A. 飞扬
- B. 承山
- C. 跗阳
- D. 委阳
- E. 委中

78. 手少阴心经的合穴是

- A. 少海
- B. 小海
- C. 天井
- D. 阳谷
- E. 肘尖

79. 善于治疗呃逆的穴是

- A. 扶突
- B. 支正
- C. 攒竹
- D. 太渊
- E. 血海

80. 善于治疗缺乳的穴位是

- A. 行间
- B. 经渠
- C. 下廉
- D. 商丘
- E. 少泽

81. 治疗腰部扭伤, 痛在腰部正中, 舌质淡红, 脉弦, 宜选取的腧穴是

- A. 阿是穴、委中、太冲
- B. 阿是穴、委中、阳陵泉
- C. 阿是穴、委中、太溪
- D. 阿是穴、委中、手三里
- E. 阿是穴、委中、后溪

82. 治疗虚火牙痛, 除主穴外, 应加的腧穴是

- A. 外关、风池
- B. 太溪、行间
- C. 风池、外关
- D. 太冲、曲池
- E. 太冲、阳溪

83. 手、足三阳经在四肢的排列自前向后依次是

- A. 阳明、少阳、太阳
- B. 少阳、太阳、阳明
- C. 太阳、阳明、少阳
- D. 少阳、阳明、太阳
- E. 太阳、少阳、阳明

84. 下肢外侧面, 经脉正确分布顺序是(从前向后排列)

- A. 胆经、胃经、肾经
- B. 胃经、胆经、膀胱经
- C. 胃经、膀胱经、肾经
- D. 胃经、膀胱经、胆经
- E. 膀胱经、胆经、胃经

85. 五输穴中, 所入为

- A. 井
- B. 荥
- C. 输
- D. 经
- E. 合

86. 开阖补泻手法中的泻法是

- A. 迅速按揉针孔
- B. 摇大针孔而按
- C. 摇大针孔而不按
- D. 缓慢按揉针孔
- E. 缓慢出针按揉针孔

87. 下列的特定穴中, 哪种穴是治疗急性病症的首选

- A. 八脉交会穴
- B. 八会穴
- C. 络穴
- D. 郄穴

E. 原穴

88. 八会穴中筋会穴是

- A. 肺俞
- B. 太渊
- C. 绝骨
- D. 阳陵泉
- E. 大杼

89. 阳经郄穴主要用于治疗

- A. 脏病
- B. 经脉病
- C. 腑病
- D. 痛证
- E. 血证

90. 下列穴位中治疗噩梦多, 应首选

- A. 足窍阴
- B. 厉兑
- C. 至阴
- D. 隐白
- E. 大敦

91. 下列各穴中, 脾经的合穴是

- A. 足三里
- B. 章门
- C. 脾俞
- D. 委中
- E. 阴陵泉

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

92. 患者钱某, 女性, 38 岁。大便干结, 如羊屎状, 形体消瘦, 头晕耳鸣, 心烦少眠, 潮热盗汗, 舌红少苔, 脉细数。治宜选用

- A. 荆防败毒散
- B. 藿香正气散
- C. 玉屏风散
- D. 增液汤

E. 参苏饮

93. 患者李某, 男, 42 岁。咳嗽 1 个月, 迁延不愈, 喉痒, 咯痰不畅, 仍伴鼻塞, 流清涕, 此时选用何方

- A. 荆防败毒散
- B. 三拗汤
- C. 三子养亲汤

D.清金化痰汤

E.三拗汤合止咳嗽

94.患者,男,21岁。反复发作气急痰鸣10年余,半小时前因外出感寒后,又出现喉中痰鸣如吼,喘而气粗息涌,咳痰色黄,黏浊稠厚,咯吐不利,口苦,口渴喜饮,汗出,身热,舌苔黄腻,质红,脉滑数。其诊断是

A.哮喘发作期寒包热哮证

B.喘证表寒肺热证

C.哮喘发作期热哮证

D.哮喘发作期风痰哮证

E.喘证痰热郁肺证

95.男性,42岁。肺痈后期见脓痰渐少,午后潮热,五心烦热,口燥咽干,盗汗自汗,气短乏力;形体消瘦,舌瘦红,脉虚数。治宜选用

A.桔梗杏仁煎

B.养阴清肺汤

C.清燥救肺汤

D.百合固金汤

E.《千金》苇茎汤

96.患者,女性,30岁。干咳,咳声短促,痰中有时带血,色鲜红,午后手足心热,皮肤干灼,口干咽燥,胸部隐隐闷痛。舌边尖红,苔薄,脉细数。应诊为何型肺癆

A.阴虚火旺

B.气阴两虚

C.肺阴亏损

D.肺肾同病

E.阴阳两虚

97.青年女性李某,平素体健,三日前突受惊吓,现心悸易惊,坐卧不宁,少寐多梦,舌苔薄白,脉弦。治疗宜选

A.朱砂安神丸

B.归脾汤

C.天王补心丹

D.安神定志丸加琥珀、磁石、朱砂

E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤

98.患者,女性,62岁。胸痛发作3小

时,现以胸闷痛为主,气短喘促,痰黏,形体肥胖,舌胖大有齿痕,苔白厚腻,脉滑数,治疗首选下列何方

A.瓜蒌薤白半夏汤

B.小陷胸汤

C.瓜蒌薤白白酒汤

D.丹参饮

E.苏合香丸

99.患者,女性,58岁。有“冠心病病史半年,昨日与邻居发生口角后即自觉心痛阵作,痛无定处,脘腹胀闷,暖气较舒,苔白,脉细弦。治疗主方宜选

A.甘麦大枣汤

B.丹栀逍遥丸

C.当归四逆散

D.柴胡疏肝散

E.栝蒌薤白半夏汤

100.患者,女,17岁。半年来因学习紧张,思想压力较大,晚上经常难以入眠,或多梦易醒,伴心悸健忘,四肢倦怠,饮食乏味,面色少华,舌质淡,脉细弱。其证候是

A.心胆气虚

B.心脾两虚

C.阴虚火旺

D.忧郁伤神

E.痰气郁结

101.王某,女,66岁。平日劳累易出现心胸刺痛,胸部闷窒,动则加剧,伴有短气乏力,汗出心悸,舌体胖大,伴有齿痕,舌质暗,有瘀斑,苔薄白,脉细无力。治宜

A.回阳救逆,益气固脱

B.温补心阳,散寒通脉

C.益气活血,通脉止痛

D.活血化瘀,通脉止痛

E.益气养阴,活血通脉

102.患者腹痛绵绵,时作时止,喜温喜按,形寒肢冷,神疲乏力,气短懒言,胃纳不佳,面色无华,大便溏薄,舌质淡,苔薄白,脉沉细。其诊断是

- A.腹痛——寒邪内阻证
- B.腹痛——中脏虚寒证
- C.胃痛——寒邪客胃证
- D.胃痛——脾胃虚寒证
- E.腹痛——饮食积滞证

103.患者刘某,男,50岁。胃脘疼痛反复发作20年,近2天因饮食生冷后胃脘疼痛加剧,疼痛隐隐,进食后缓解,喜抚按和温熨,治疗最佳方剂为

- A.大建中汤
- B.养胃汤
- C.化肝煎
- D.黄芪建中汤
- E.香砂六君子汤

104.郭某,女,30岁。呕吐反复发作2年。每因饮食不慎即发呕吐,或劳倦之后,困惫乏力,眩晕作呕,口干不欲饮,喜暖恶寒,面色白,甚则四肢不温,大便秘结,舌质淡,脉象濡弱。其治法应是

- A.滋阴养胃,降逆止呕
- B.舒肝和胃,降逆止呕
- C.消食化滞,和胃降逆
- D.温化痰饮,和胃降逆
- E.温中健脾,和胃降逆

105.呃逆患者,呃声低弱无力,气不得续,面色苍白,手足不温,食少困倦,舌淡苔白,脉沉细弱。其治法宜

- A.温中祛寒,降逆止呃
- B.清热和胃,降逆止呃
- C.疏肝理气,降逆止呃
- D.温补脾胃,和中降逆
- E.益气养阴,和胃止呃

106.刘某,2天前出现腹痛泄泻,经治无效。现泄泻清稀,甚者如水样,腹痛肠鸣,脘闷纳少,苔薄白或白腻,脉濡数。应诊断为

- A.湿热泄泻
- B.寒湿泄泻
- C.食滞泄泻
- D.脾虚泄泻

E.肾虚泄泻

107.姜某,男,30岁。患者三天前出现腹痛,里急后重,下痢赤白黏冻,肛门灼热,小便赤涩,苔黄腻,脉滑数。其治法为

- A.清热和中,化湿止泻
- B.消食导滞,调和脾胃
- C.清热除湿,调气行血
- D.清热除湿,凉血解毒
- E.清热除湿,健脾和中

108.患者,男,29岁。平素身体壮实,3天前出现纳食不佳,厌食油腻,神疲乏力,发热口渴,随后身目俱黄,黄色鲜明,腹部胀满,口苦,恶心欲吐,大便秘结,小便短少黄赤,舌质红苔黄腻,脉弦数。治疗选用的方剂是

- A.茵陈蒿汤
- B.茵陈五苓散
- C.茵陈术附汤
- D.甘露消毒丹
- E.黄连解毒汤

109.患者,女,62岁。身肿1个月,以腰以下为甚,脘腹胀闷,纳呆便溏,面色萎黄,神倦,肢冷畏寒,尿少,舌淡苔白腻,脉沉弱。应辨证为

- A.脾阳虚衰
- B.水湿浸渍
- C.脾气虚不能运化水湿
- D.肾气虚衰
- E.脾肾两虚

110.患者,男,26岁。初起恶寒发热,咽痛,眼睑浮肿,小便不利,经治疗后,表虽解,但肿势未退,身重困倦,胸闷,纳呆、泛恶,苔白腻,脉沉缓。最佳选方是

- A.越婢加术汤
- B.猪苓汤
- C.五皮饮合胃苓汤
- D.苓桂术甘汤
- E.防己黄芪汤

111.唐某,男,70岁。患“哮喘”病30余

年,冬季为重,平素身倦乏力,气息短促,动则汗出,舌质淡,脉细无力。治疗主穴中,除了肺俞、肾俞、足三里、定喘,还应该

- A.大椎、风门、膻中
- B.大椎、风门、关元
- C.太渊、尺泽、合谷
- D.太渊、尺泽、膻中
- E.膏肓、太渊、太溪

112.王某,女,26岁。突然皮肤奇痒,抓后出现片块状风团,此起彼伏,消退后不留痕迹。口干,便结,舌红,脉滑。针灸治疗,应该选取主穴为

- A.肺俞、尺泽、太渊、曲池
- B.胃俞、合谷、天枢、足三里
- C.肺俞、脾俞、血海、三阴交
- D.曲池、合谷、血海、膈俞
- E.以上都不是

113.患者,女,63岁。突然出现右半身活动不利,舌强语謇,兼见面红目赤,眩晕头痛,烦躁,舌红苔黄,脉弦而有力,针灸治疗除主穴外,应加用

- A.丰隆、合谷
- B.曲池、内庭
- C.太冲、太溪
- D.足三里、气海
- E.太溪、风池

114.患者,男,30岁。体质素弱,近半年来,呕吐时作时止,食欲不佳,倦怠乏力,舌苔薄白,脉弱。治疗应选用下列哪组穴位

- A.内关、足三里、中脘、丰隆、阴陵泉
- B.内关、足三里、中脘、合谷、内庭
- C.内关、足三里、中脘、梁门、天枢
- D.内关、足三里、中脘、太冲、阳陵泉
- E.内关、足三里、中脘、脾俞、胃俞

115.患者,女,60岁。多饮、多食、多尿数年,现以善饥烦渴、口干舌燥为主,治疗应配用的腧穴是

- A.太渊、金津
- B.少府、廉泉

- C.复溜、太冲
- D.内庭、廉泉
- E.曲池、合谷

116.肋部皮肤始发灼热疼痛,继则出现簇集粟粒大小丘状疱疹,呈带状排列,疱壁紧张,口苦,心烦,脉弦数。治疗本病除局部阿是穴、夹脊穴外,宜选取的腧穴是

- A.神门、大陵
- B.合谷、列缺
- C.血海、膈俞
- D.血海、内庭
- E.行间、阳陵泉

117.王某,男,因恼怒后两胁胀痛,胸闷不舒,呕恶不欲食,口苦,舌红,脉弦。针灸取穴,应加

- A.期门、太冲
- B.支沟、阳陵泉
- C.膈俞、三阴交
- D.肝俞、肾俞
- E.大包、足三里

118.赵某,女,25岁。昨日起突发头痛,以巅顶部为重,伴恶寒发热,食欲不振,舌淡苔白,脉浮。针灸取穴为

- A.上星、头维、合谷、阿是穴
- B.率谷、太阳、侠溪、阿是穴
- C.后顶、天柱、昆仑、阿是穴
- D.百会、通天、行间、阿是穴
- E.外关、合谷、前顶、四神聪

119.李某,女,肢体关节走窜疼痛,痛无定处,时兼寒热。针灸取穴为

- A.局部穴、膈俞、血海
- B.局部穴、肾俞、关元
- C.局部穴、足三里、商丘
- D.局部穴、大椎、曲池
- E.局部穴、风池、合谷

120.王某,男,30岁。两个月前突发双下肢肌肉弛缓无力,不能站立行走,肌肉日渐消瘦,兼身重脘痞,小便混浊,舌苔黄厚腻,脉濡数。针灸取穴应为

- A.足阳明胃经为主,配尺泽、肺俞、大椎
B.足太阴脾经为主,配尺泽、肺俞、大椎
C.足阳明胃经为主,配阴陵泉、内庭
D.足阳明胃经为主,配肝俞、肾俞、悬钟、阳陵泉
E.足厥阴肝经为主,配足三里、梁丘、解溪、髀关

121.李某,男,45岁。5年来,胃脘部经常反复发作性疼痛。表现为隐隐作痛,喜温喜按,纳差神疲,大便溏,苔白,脉弱。针灸取穴为

- A.中脘、内关、足三里、太冲、合谷
B.中脘、内关、足三里、梁门、建里
C.中脘、足三里、内关、膈俞、公孙、三阴交
D.中脘、足三里、内关、脾俞、胃俞、关元
E.中脘、足三里、内关、脾俞、胃俞、内庭

122.吴某,女,23岁。经医院诊断为痛经虚证。针灸治疗,主穴应该选取

- A.肾俞、大赫、命门、关元

- B.肾俞、肝俞、太溪、太冲
C.中极、地机、次髎、归来
D.中极、地机、太冲、三阴交
E.足三里、三阴交、关元

123.治疗牙痛的主穴是

- A.合谷、地仓、上关
B.合谷、颊车、上关
C.太冲、地仓、下关
D.合谷、颊车、下关
E.外关、颊车、下关

124.患者,女,72岁。1小时前,突然昏仆,不省人事,半身不遂,目合口张,遗尿,汗出,四肢厥冷,脉细弱。治疗应首选的腧穴是

- A.背俞穴,灸法
B.任脉经穴,灸法
C.督脉经穴,灸法
D.足阳明经穴,灸法
E.足厥阴经穴,毫针泻法

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(125~126题共用备选答案)

- A.补气运脾汤加减
B.理中丸加减
C.良附丸加减
D.丁香散加减
E.启膈散加减

125.噎膈,气虚阳微证,可选用

126.呃逆,脾胃阳虚证,可选用

(127~128题共用备选答案)

- A.加味四君子汤
B.天王补心丹
C.四物汤加味

D.沙参麦冬汤

E.归脾汤

127.心阴虚之虚劳治宜

128.肝血虚之虚劳治宜

(129~130题共用备选答案)

A.气血阴阳失调

B.气血阴阳亏虚,脏腑功能失调

C.气血阴阳亏虚,脏腑虚损

D.阴阳失调,营卫不和

E.脏腑功能失调

129.内伤发热的基本病机为

130.汗证的基本病机为

(131~132 题共用备选答案)

- A.气虚不固
- B.湿热内蕴
- C.正气欲脱,阳不敛阴
- D.阴虚内热
- E.正气拒邪

131.盗汗病机为

132.自汗病机为

(133~134 题共用备选答案)

- A.口干舌燥
- B.消谷善饥
- C.疲乏无力
- D.多尿而频
- E.烦渴引饮

133.消渴病,肺热津伤证最突出的症状是

134.消渴病,胃热炽盛证最突出的症状是

(135~136 题共用备选答案)

- A.麦门冬汤
- B.补中益气汤
- C.泻白散合黛蛤散
- D.益胃汤
- E.加味清胃散合泻心汤

135.治疗胃痞胃阴不足证,应首选

136.治疗呕吐胃阴不足证,应首选

(137~140 题共用备选答案)

- A.疏肝解郁,清肝泻火
- B.甘润缓急,养心安神
- C.滋养心肾
- D.健脾养心,益气补血
- E.疏肝解郁,理气畅中

137.郁证肝气郁结型治法宜

138.郁证心肾阴虚型治法宜

139.郁证气郁化火型治法宜

140.郁证心神失养型治法宜

(141~142 题共用备选答案)

- A.除湿通络,祛风散寒
- B.散寒通络,祛风除湿
- C.祛湿通络,散寒温经

D.清热通络,祛风除湿

E.化痰祛瘀,搜风通络

141.着痹的主要治法

142.痛痹的主要治法

(143~144 题共用备选答案)

- A.独活寄生汤
- B.虎潜丸
- C.肾着汤
- D.右归丸
- E.左归丸

143.肝肾亏损痿证,可选用

144.痹证日久,气血亏虚、肝肾不足,可

选用

(145~146 题共用备选答案)

- A.督脉
- B.任脉
- C.冲脉
- D.带脉
- E.阳维脉

145.被称之为“阴脉之海”的经脉是

146.具有涵蓄十二经气血作用的经脉是

(147~148 题共用备选答案)

- A.十二经脉
- B.十五络脉
- C.十二经别
- D.十二经筋
- E.十二皮部

147.经络系统中,具有保持人体正常运动功能的是

148.经络系统中,从十二正经离入出合的别行部分是

(149~150 题共用备选答案)

- A.阳跷脉郄穴
- B.足少阳胆经郄穴
- C.阴维脉郄穴
- D.手阳明大肠经郄穴
- E.足厥阴肝经郄穴

149.跗阳是

150.筑宾是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	E	A	B	C	E	C	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	E	E	E	C	E	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	A	C	D	C	B	E	D	E	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	A	E	C	D	A	E	D	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	E	B	D	D	E	D	C	B	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	D	D	D	A	E	C	C	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	A	B	A	D	D	B	E	A	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	C	C	B	C	A	E	A	C	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	B	A	B	E	C	D	D	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	D	E	C	A	C	D	A	D	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	B	D	E	D	B	C	A	A	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	D	C	E	D	E	A	D	A	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	E	D	B	A	B	B	C	B	D
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	A	E	B	D	A	E	C	A	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	B	A	B	C	D	C	A	C

第四单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 湿邪所致外科疾病好发部位
 - A. 上部
 - B. 下部
 - C. 中部
 - D. 上肢
 - E. 背部
2. 临床常见痒症的病因是
 - A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚
 - B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
 - C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚
 - D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
 - E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜
3. 疮疡化脓时,临床常见的疼痛性质是
 - A. 阵发痛
 - B. 持续痛
 - C. 烧灼痛
 - D. 胀裂痛
 - E. 跳啄痛
4. 阴证的疼痛表现是
 - A. 疼痛剧烈、拒按
 - B. 疼痛游走不定
 - C. 痛势甚速
 - D. 隐痛或不痛
 - E. 时有时无
5. 肿疡毒势方盛,正气已虚,不能托毒外出者,内治方药宜选用
 - A. 透脓散
 - B. 仙方活命饮
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 托里消毒散
 - E. 清肝解郁汤
6. 附骨疽患者多见于
 - A. 婴儿
 - B. 儿童
 - C. 少年
 - D. 青年
 - E. 老年
7. 太乙膏的功效是
 - A. 清热消肿,散瘀化痰
 - B. 活血祛腐,解毒止痛
 - C. 消肿止痛,提脓祛腐
 - D. 消肿清火,解毒生肌
 - E. 温经和阳,祛风散寒
8. 颜面部疔疮容易走黄的原因是
 - A. 火毒炽盛
 - B. 头面为诸阳之首
 - C. 火邪炎上
 - D. 容易挤压
 - E. 风邪上受
9. 治疗疔初期的代表方剂是
 - A. 仙方活命饮
 - B. 五味消毒饮
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 普济消毒饮
 - E. 防风通圣散
10. 疔疮走黄的主要病理是
 - A. 正虚
 - B. 邪实

- C.阴伤
D.腑实
E.表虚
- 11.有头疽初起症状多见
A.粟粒样脓头
B.蜂窝状脓头
C.肿硬如钉钉之状
D.漫肿无头
E.光软无头
- 12.头面部丹毒治疗应首选
A.银翘散
B.黄连解毒汤
C.普济消毒饮
D.仙方活命饮
E.五味消毒饮
- 13.“胀裂样”疼痛见于下列哪种疾病
A.蜈蚣疔
B.眉心疔
C.蛇眼疔
D.烂疔
E.红丝疔
- 14.乳房部疾病症见经前胀痛者为
A.内吹乳痈
B.乳疔
C.乳腺增生病
D.乳岩
E.乳癆
- 15.蜈蚣疔好发于
A.儿童头部
B.儿童项后
C.儿童背部
D.儿童臀部
E.产妇头部
- 16.癰疽局部疼痛明显,伴恶寒发热、头痛口干、脉浮数,其证属
A.肝郁气滞
B.风热痰凝
C.血瘀化热
D.痰瘀内结
E.气滞痰凝
- 17.筋瘤的“筋”是指
A.肌腱
B.浅表静脉
C.筋膜
D.腱膜
E.经络
- 18.进行期白疔、红皮病型白疔外用药可
选用
A.青黛膏或黄连膏
B.硫黄软膏或硼酸软膏
C.风油膏或雄黄膏
D.百部酊
E.三黄洗剂
- 19.蛇头疔最常用的验脓法
A.穿刺法
B.应指法
C.B超
D.透光法
E.点压法
- 20.内痔的主要症状是
A.便血,疼痛
B.便血,有分泌物
C.便血,脱出
D.便血,肛门痒
E.便血,异物感
- 21.血栓外痔形成的原因是
A.静脉曲张造成
B.反复炎症使血液瘀滞而成
C.腹压增加使肛门部痔下静脉破裂,血瘀皮下而成
D.腹压增加使肛门部动脉破裂,血瘀皮下而成
E.以上均非
- 22.脾经湿热引起的前阴病时,宜选用以下何方
A.三仁汤
B.龙胆泻肝汤
C.八正散

- D. 萆薢分清饮
E. 补中益气汤
23. 海绵状血管瘤的显著特点是
- A. 皮色鲜红
B. 压缩性大
C. 青筋累累
D. 边界不清
E. 质地坚硬
24. 细菌性痢疾的传播途径是
- A. 呼吸道
B. 消化道
C. 虫媒传播
D. 血液
E. 接触传播
25. 股肿早期的治法为
- A. 活血化瘀, 清热利湿
B. 清热利湿, 理气活血
C. 温阳利水, 活血化瘀
D. 凉血清热, 活血通络
E. 化痰软坚, 利水消肿
26. 深Ⅱ度烧伤的临床表现是
- A. 局部红肿, 有疼痛和烧灼感, 皮肤温度增高
B. 水疱较饱满, 有剧痛和感觉过敏, 皮温增高
C. 水疱饱满, 感觉迟钝, 皮温低
D. 水疱较小或偏扁薄, 感觉较迟钝, 皮温稍低
E. 创面无水疱, 感觉消失, 皮温低
27. 毒蛇咬伤早期结扎的最佳部位是
- A. 伤口肿胀处
B. 伤口近心端 5 cm
C. 伤口近心端 2 cm
D. 伤口近心端, 超出肿胀范围 5~10 cm
E. 根据部位情况酌情处理
28. 破伤风后肌肉强直性痉挛最早出现于
- A. 四肢
B. 躯干
C. 头面
D. 手足
E. 颈项
29. 我国第一部论述梅毒的专著是
- A. 《岭南卫生方》
B. 《备急千金药方》
C. 《韩氏医通》
D. 《霉疮秘录》
E. 《外科理例》
30. 附睾尾部实质性肿大, 表面不光滑, 结节状, 质地硬韧, 界限不清者, 为
- A. 子痰
B. 子痈
C. 肾岩
D. 附睾恶性肿瘤
E. 附睾良性肿瘤
31. 下列哪项不是月经后期虚寒证的主症
- A. 经期延后, 量少色淡、质清稀
B. 小腹空痛, 心悸失眠
C. 腰酸无力
D. 小便清长, 大便稀溏
E. 脉沉迟或细弱无力
32. 治疗月经先后无定期肾虚证应首选的方剂是
- A. 右归丸
B. 固阴煎
C. 定经汤
D. 知柏地黄汤
E. 补肾地黄丸
33. 带下病的主要发病机理是
- A. 外感湿邪, 损及任、带, 约固无力
B. 肾气不足, 封藏失职, 阴液滑脱而下
C. 湿邪影响任、带, 任脉不固, 带脉失约
D. 脾虚生湿, 流注下焦, 伤及任、带
E. 肝经湿热, 流注下焦, 伤及任、带
34. 治疗崩漏虚热证, 应首选的方剂是
- A. 保阴煎
B. 固本止崩汤

- C.清热固经汤
D.清热调血汤
E.上下相资汤
- 35.完带汤适用于带下病的哪种证候
A.脾虚
B.肾阴虚
C.肾阳虚
D.湿热
E.热毒
- 36.月经过多气虚证的发病机理是
A.气虚下陷
B.气虚血少
C.气虚不能摄血固冲
D.气虚血瘀
E.气虚火衰
- 37.妊娠病中,安胎之法以何为主
A.疏肝解郁
B.滋补肝肾
C.补肾健脾
D.健脾升阳
E.益气养血
- 38.妊娠恶阻的主要发病机制是
A.脾胃虚弱,化源不足
B.肝郁气滞,失于条达
C.痰湿内停,中焦受阻
D.重伤津液,胃阴不足
E.冲气上逆,胃失和降
- 39.养精神玉汤是治疗哪种不孕的首选方剂
A.肝郁不孕
B.痰湿不孕
C.肾阳虚不孕
D.肾阴虚不孕
E.血瘀不孕
- 40.阴痒的临床分型除湿热下注外还有
A.血虚化燥生风
B.肝肾阴虚
C.脾虚生湿
D.心火内扰

- E.肠胃湿热
- 41.妊娠八、九个月时,或腹中痛,痛定仍然如常者,称为
A.试胎
B.弄胎
C.垢胎
D.盛胎
E.滑胎
- 42.治疗产后身痛之肾虚证的代表方剂是
A.归脾汤
B.当归地黄饮
C.黄芪桂枝五物汤
D.养荣壮肾汤
E.当归生姜羊肉汤
- 43.下列各项属于闭经气血两虚证临床表现的是
A.月经停闭,神疲,乏力,胸闷,纳呆
B.月经停闭,头晕,腰酸,心悸
C.月经停闭,神疲,肢倦,头晕眼花
D.月经停闭,少腹胀痛,心悸,耳鸣
E.月经停闭,口干欲饮,潮热盗汗
- 44.妊娠病的治疗原则大多是
A.以治病为主
B.以安胎为主
C.先治病后安胎
D.治病与安胎并举
E.下胎以益母
- 45.下列除哪项以外,其余均是痛经常见证型
A.气滞血瘀
B.寒凝胞中
C.气血虚弱
D.肝肾不足
E.痰饮阻滞
- 46.产后病的治疗应本着哪项原则
A.补气养血为主
B.活血化瘀为主
C.勿拘于产后,也勿忘于产后

- D.疏肝健脾为主
E.滋补肝肾为主
- 47.母乳喂养,增加辅食和断奶最适宜的时间
- A.2~3个月加辅食,8~12个月断奶
B.2~3个月加辅食,12~16个月断奶
C.4~5个月加辅食,12~18个月断奶
D.4~5个月加辅食,16~20个月断奶
E.半岁后加辅食,1岁左右断奶
- 48.前囟关闭的时间为出生后的几个月
- A.2~4
B.4~6
C.6~12
D.12~18
E.18~24
- 49.小儿惊痫多呈现的面色是
- A.白
B.红
C.黄
D.青
E.黑
- 50.按公式推算,正常6岁小儿血压的收缩压是
- A.80 mmHg
B.88 mmHg
C.100 mmHg
D.90 mmHg
E.92 mmHg
- 51.小儿泄泻的好发年龄是
- A.2周岁以下
B.2周岁~3周岁
C.4周岁~6周岁
D.7周岁~9周岁
E.9周岁以上
- 52.病后常易并发心悸、水肿、痹证的是
- A.麻疹
B.风疹
C.水痘
D.猩红热
E.幼儿急疹
- 53.水痘的主要病位在
- A.肺卫
B.肺脾
C.脾肾
D.脾胃
E.肺胃
- 54.手足口病的好发季节是
- A.春秋
B.冬春
C.秋冬
D.春夏
E.夏秋
- 55.干疔的主要治法是
- A.养血柔肝
B.补益气血
C.滋阴生津
D.健脾温阳
E.调脾健运
- 56.百日咳最易发病的年龄是
- A.1岁以下
B.3岁以下
C.2岁以下
D.5岁以下
E.5岁以上
- 57.小儿五脏六腑的形和气都相对的不足,其中尤以哪三脏更为突出
- A.心、肺、肾
B.肝、肺、肾
C.心、肝、肾
D.肺、脾、肾
E.肝、脾、肾
- 58.捏脊疗法通过对督脉与膀胱经捏拿,达到调整脏腑功能的目的,常用于治疗
- A.疳证、婴儿泄泻
B.咳嗽、哮喘
C.五迟、五软
D.汗证、惊风
E.遗尿、尿频

- 59.哮喘急性发作主要原因是
- 肺气不足,感受外邪
 - 脾失健运,停湿生痰
 - 肾阳虚衰,水饮蕴积
 - 肝郁气滞,气机逆乱
 - 感受外邪,引动伏痰
- 60.伤食、积滞、疳证三者因果关系是
- 积滞—伤食—疳证
 - 伤食—积滞—疳证
 - 伤食—疳证—积滞
 - 积滞—疳证—伤食
 - 疳证—伤食—积滞
- 61.小儿纯阳之体的含义是
- 盛阳
 - 纯阳无阴
 - 阳常有余
 - 阴虚阳盛
 - 生长发育迅速
- 62.小儿时期以下列哪两经疾病最为多见
- 肺肝
 - 肝肾
 - 肺脾
 - 脾肾
 - 肺肾
- 63.幼儿期的年龄是
- 1岁
 - 1~2岁
 - 1~3岁
 - 2~4岁
 - 以上都不是
- 64.舌苔花剥,经久不愈,状如“地图”是由于
- 脾胃虚弱
 - 肝肾阴亏
 - 阴伤津亏
 - 胃之气阴不足
 - 心火上炎
- 65.下列哪项不是内伤咳嗽的特点
- 咳声低弱
 - 痰稀色白
 - 发病多急,病程较长
 - 往往兼有不同程度的里证
 - 虚证居多
- 66.3周岁小儿按公式计算,身高和体重应该是
- 身高 85 cm、体重 12 kg
 - 身高 96 cm、体重 14 kg
 - 身高 91 cm、体重 12 kg
 - 身高 100 cm、体重 14 kg
 - 身高 120 cm、体重 26 kg
- 67.水痘的早期诊断依据中,下列哪项是错误的
- 发热当天或 1~2 天出现皮疹
 - 丘疹于 1 天左右变为疱疹
 - 皮疹呈向心性分布
 - 皮疹一齐发出
 - 疹色红润,疱浆清亮
- 68.鹅口疮的主要特征是
- 口腔周围及舌体生白色小疮点
 - 口腔舌上满布白屑,形如雪片
 - 咽喉部有白假膜
 - 牙龈有白色小疮点
 - 口腔内红赤溃烂
- 69.以下哪项不是疳积的临床表现
- 形体略显消瘦
 - 面色萎黄无华
 - 毛发稀黄发结如穗
 - 烦躁激动睡卧不宁
 - 嗜食无度
- 70.丹痧涉及的主要脏腑是
- 心肺
 - 肺胃
 - 脾胃
 - 脾肾
 - 心肝
- 71.小儿汗证的最基本的病理是
- 表虚不固

- B.营卫失调
C.气阴两虚
D.脾胃积热
E.阴阳失调
- 72.治疗时邪感冒的首选方剂是
A.银翘散
B.桑菊饮
C.藿香正气散
D.新加香薷饮
E.银翘散合普济消毒饮
- 73.传染病潜伏期的最重要意义在于
A.有利于传染病的诊断
B.估计病情的预后
C.是检疫工作观察、留验接触者的重要依据
D.预测疫情
E.指导治疗
- 74.HCV 感染的主要传播途径是
A.粪-口途径传播
B.输血
C.集体预防接种
D.母婴垂直传播
E.生活密切接触
- 75.流行性出血热发热期出现的“三痛”是指
A.头痛、胸痛、腹痛
B.头痛、腹痛、关节痛
C.头痛、胸痛、腰痛
D.头痛、腰痛、眼眶痛
E.头痛、腰痛、背痛
- 76.以下选项均为艾滋病的传播途径,而我国目前最主要的传播途径是
A.注射途径
B.性接触途径
C.母婴垂直传播途径
D.人工授精
E.器官移植
- 77.重型肝炎的特征性表现是
A.血清转氨酶明显升高
B.肝脾肿大
C.精神神经症状
D.肝区疼痛明显
E.黄疸明显血
- 78.流脑常见的皮疹是
A.玫瑰色斑丘疹
B.单纯疱疹
C.瘀点、瘀斑
D.脓疱疹
E.坏疽
- 79.乙脑最常见和最早出现的症状是
A.高热
B.头痛
C.呕吐
D.颈项强直
E.意识障碍
- 80.细菌性痢疾急性期的基本病变是
A.全身小血管内皮细胞肿胀,血浆渗出
B.肠黏膜水肿增厚、溃疡形成
C.肠黏膜弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
D.肠壁形成口小底大的烧瓶样溃疡
E.嗜酸性肉芽肿的形成
- 81.霍乱腹泻的原因是
A.细菌内毒素引起的肠细胞分泌功能增加
B.细菌产生的毒素引起的肠蠕动增加
C.肠毒素激活小肠细胞环磷腺苷介质系统,引起小肠过度分泌
D.霍乱弧菌引起小肠黏膜广泛损伤、炎症,肠液分泌、渗出增加
E.弧菌引起肠道自主神经系统失调
- 82.霍乱中型患者每日尿量为
A.<50 mL
B.<100 mL
C.<300 mL
D.<400 mL
E.<500 mL

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

83.某男,65岁。糖尿病10余年,半年来项部近发际处,经常出现红肿块,灼热疼痛,出脓后即愈合,触之突起根浅,服用消炎药,无明显效果,常口渴唇燥,舌红苔薄,脉细数。中医诊断是

- A.有头疔
- B.无头疔
- C.蝼蛄疔
- D.疔病
- E.粉刺

84.患者,男,36岁。项后及上睑皮肤瘙痒已有3年,皮损呈增厚、干燥、席纹状,稍有脱屑,自觉阵发性奇痒,入夜尤甚。其诊断是

- A.白疔
- B.白屑风
- C.牛皮癣
- D.圆癣
- E.紫白癜风

85.一患者60岁。排便时出血,量不多,肛门脱出肿物,如李大小,表面色紫,微带白色,需用手推挤方能还纳,病已10年,近来加重。其诊断是

- A.直肠息肉
- B.直肠脱垂
- C.直肠癌
- D.二期内痔
- E.三期内痔

86.患者,男,40岁。小便频急,茎中热痛。刺痒不适,尿色黄浊,尿末或大便时有白浊滴出,会阴、腰骶、睾丸有明显的胀痛不适,舌红苔黄腻,脉弦滑。诊为慢性前列腺炎,其证候是

- A.肾阳不足
- B.肝肾不足

- C.阴虚火动
- D.湿热壅阻
- E.气滞血瘀

87.患者,女性,32岁。左侧面颊反复起疱疹3年,每于感冒发热、食辣上火时发作。2天前疱疹又起,局部有烧灼、痒痛感,伴口干、咽痛、便秘。检查:左侧面颊一片水肿性红斑上有群集的小水疱,舌质红苔黄,脉滑数。诊断辨证为

- A.热疮阴虚内热证
- B.热疮肺胃热盛证
- C.黄水疮暑湿热蕴证
- D.湿疮湿热浸淫证
- E.面游风肺胃热盛证

88.患者,女。症见月经四五十日一行,量少,色淡红,无血块,头晕眼花,心悸少寐,面色苍白,舌淡红,脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A.八珍汤
- B.归脾汤
- C.参芪四物汤
- D.大补元煎
- E.人参养荣汤

89.患者,女,18岁,未婚。月经尚未初潮,体质虚弱,腰酸腿软,头晕目眩,舌红少苔,脉沉细尺弱。其治法是

- A.补气养血调经
- B.滋阴益气调经
- C.补肾益气,调理冲任
- D.健脾生血调经
- E.补中益气调经

90.月经持续八九日未净,量少色红质稠,咽干口燥,舌红少津,苔少脉细数。方选

- A.清经散
- B.清热固经汤

- C. 清热调血汤
- D. 六味地黄丸
- E. 两地汤

91. 患者,女,24岁,已婚。产后1周,小腹隐隐作痛,喜按,恶露量少、色淡,头晕耳鸣,舌淡红苔薄白,脉虚细。其证候是

- A. 气虚
- B. 肾虚
- C. 血虚
- D. 虚寒
- E. 脾肾两虚

92. 患者,女,24岁,已婚。产后4周恶露过期不止,量多、色淡红、质稀,小腹空坠,面色白,舌淡,脉缓弱。治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 圣愈汤
- D. 人参养营汤
- E. 参附汤

93. 患者,女,妊娠8个月,面浮肢肿,头昏头重如眩晕状,胸闷欲呕,纳差便溏。苔厚腻,脉弦滑。治宜

- A. 育阴潜阳,平肝息风
- B. 健脾利湿,平肝潜阳
- C. 清热涤痰,平肝潜阳
- D. 清热养阴,安神除烦
- E. 疏肝扶脾,理气行滞

94. 患者,女,27岁,已婚。产后5日,高热寒战。小腹疼痛拒按,恶露量多,色如败酱,有臭气,纳呆,便秘。应首先考虑的是

- A. 产后伤食
- B. 产后腹痛
- C. 产后发热
- D. 疟疾
- E. 肠痈

95. 患者,女,27岁,已婚。妊娠5个月,先由脚肿渐及于腿,皮色不变,随按随起。其证候是

- A. 脾虚

- B. 气滞
- C. 肾虚
- D. 湿阻
- E. 血瘀

96. 患者,女,32岁,已婚。孕后腰酸腹痛,胎动下坠,伴阴道少量出血,头晕耳鸣,小便频数,舌淡苔白,脉沉细滑。治疗应首选的方剂是

- A. 加味圣愈汤
- B. 胎元饮
- C. 举元煎
- D. 补肾安胎饮
- E. 寿胎丸

97. 患者孕3个月余,小腹胸胁胀痛,情志抑郁,暖气吐酸,烦躁易怒,苔薄黄,脉弦滑。其治法是

- A. 逍遥散
- B. 四逆散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 胶艾汤
- E. 乌药汤

98. 患儿,6个月。患哮喘病,见面色白,气短懒言,语声低微,倦怠乏力,自汗怕冷,舌质淡苔薄白,脉细无力,证属哮喘缓解期的

- A. 脾气虚
- B. 肺气虚
- C. 肺脾气虚
- D. 脾肾气虚
- E. 肾气不足

99. 患儿,9岁。患丹痧经治疗后,咽部疼痛减轻,开始皮肤有脱屑,但仍有轻度发热,口唇干燥,伴有干咳,纳差,舌红少津。首选方剂是

- A. 增液汤
- B. 泻白散
- C. 地骨皮饮
- D. 沙参麦冬汤
- E. 百合固金汤

100. 男,9岁。高热3天,头痛烦躁,口

渴饮水,食欲不振,双侧腮部漫肿、胀痛、坚硬拒按,咀嚼困难,咽红肿痛,舌红苔黄,脉象滑数。治疗首选方剂是

- A.普济消毒饮
- B.清瘟败毒饮
- C.白虎汤
- D.黄连解毒汤
- E.五味消毒饮

101.患儿,男,10岁。8月5日外出游玩1天,回家后开始发热、出汗,伴恶心呕吐,嗜睡,2分钟前突然四肢抽搐,双目上吊。查:体温39.8℃,舌红苔黄腻,脉象洪数。此病例治法是

- A.疏风清热,息风镇惊
- B.祛暑清热,开窍镇惊
- C.清热解毒,凉血息风
- D.清热化湿,解毒息风
- E.消食导滞,涤痰镇痉

102.患儿,男,1岁半。发热腹泻半天入院,泻下稀薄,水分较多,粪色深黄而臭,微见黏液,腹部时觉疼痛,食欲不振,伴泛恶,口渴,小便短黄,肛门灼热发红,舌苔黄腻,其治法是

- A.消食化积
- B.疏风散寒
- C.清热利湿
- D.健脾益气
- E.补脾温肾

103.患儿,5岁。咳嗽1周。证见咳嗽痰多,痰黄黏稠,难咯,喉间时有痰鸣,发热口渴,尿少色黄,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.清金化痰汤
- B.桑菊饮
- C.沙参麦冬汤
- D.麻杏石甘汤
- E.黄连解毒汤合三拗汤

104.患儿,男,12岁。因发热,伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻2天,于8月2日入院,每日排脓血便10余次。3天前患者从外地到京

旅游。体检:T 40℃,BP125/68 mmHg,中度脱水貌。心肺(-),腹软,肝脾未及。左下腹压痛(+),反跳痛(-)。化验:血WBC 12.9×10⁹/L,淋巴细胞10%,中性粒细胞90%。粪便镜检WBC 100/HP,RBC 7/HP,最可能的诊断是

- A.霍乱
- B.慢性细菌性痢疾
- C.急性细菌性痢疾普通型
- D.中毒性痢疾
- E.急性肠炎

105.患者,男性,36岁。发热20余天,T 39℃左右,伴腹胀、乏力,于8月15日就诊。体检:肝不大,脾肋下可及。血白细胞3.6×10⁹/L,中性粒细胞60%,杆状细胞1%,淋巴细胞39%。为确诊应做的检查为

- A.血培养
- B.ppd试验
- C.便培养
- D.胸片
- E.肥达反应

106.男孩,7岁。发热、头痛伴呕吐1天,于11月10日入院。体检:T 40℃,BP 50/30 mmHg,浅昏迷,皮肤广泛瘀点、瘀斑,融合成大片,面色苍白,四肢发冷。颈抵抗可疑,布氏征(-)。血WBC 22×10⁹/L,中性粒细胞90%,淋巴细胞10%,腰穿脑脊液检查:压力290 mmH₂O,WBC 1080×10⁶/L,多核细胞80%,单核细胞20%,蛋白3.0 g/L,糖3.0 mmol/L,氯化物89 mmol/L。最可能的诊断

- A.隐球菌性脑膜炎
- B.流行性出血热
- C.流行性脑脊髓膜炎普通型
- D.流行性脑脊髓膜炎暴发型
- E.流行性乙型脑炎

107.女,28岁。既往体健。5天前淋雨,2天前突然高热,T 39.6℃,寒战,咳铁锈色痰伴呼吸困难,胸片示右下肺大片密度均匀的实变影。血WBC 13×10⁹/L,中性粒细胞

86%。其居住地报告有传染性非典型肺炎患者出现,本患者最可能的诊断是

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.支原体肺炎
- C.流感病毒肺炎
- D.传染性非典型肺炎
- E.衣原体肺炎

108.男,35岁。发热、头痛、腰痛4天。体温38~39℃。村卫生所给予复方APC退热。近2天体温正常,但症状却加重。尿量

减少。体检发现:眼睑水肿,球结膜水肿伴充血和出血,软腭见针尖样出血点。腋下皮肤见针头帽大小瘀点。肾区叩痛阳性,可能的临床诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.血小板减少性紫癜
- D.普通感冒
- E.流行性出血热

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(109~110题共用备选答案)

- A.来势暴急,初起结喉处红肿绕喉
- B.初起光软无头,红肿疼痛,范围6~9cm
- C.初起疮形如粟粒状脓头,坚硬根深
- D.初起皮肤片状红斑,边界清楚,压之褪色,抬手即复
- E.初起疮形如粟,突起根浅

109.猛疽的特征

110.丹毒的特征

(111~112题共用备选答案)

- A.乳房放射状切口
- B.乳房梭形切口
- C.乳房下缘弧形切口
- D.乳晕部弧形切口
- E.乳晕边缘弧形切口
- 111.乳房脓肿切开引流取
- 112.乳房内深部或乳房后脓肿切开引流取

(113~114题共用备选答案)

- A.患肢疼痛持续不止,足背动脉搏动消失
- B.患肢麻木、发凉,色苍白,足背动脉搏动减弱

- C.患趾紫黑溃烂,舌质红,苔黄腻,脉数
- D.患趾紫暗,遇冷变色,变为苍白、紫暗、潮红等颜色

E.患趾溃烂,色苍白,创面久不愈合,舌淡胖,脉细无力

113.脱疽血脉瘀阻证的主要表现为

114.脱疽湿热毒盛证的主要表现为

(115~116题共用备选答案)

- A.胎漏
- B.胎动不安
- C.堕胎
- D.小产
- E.滑胎

115.妊娠早期,感小腹胀痛,腰酸,阴道有少量出血者,诊断为

116.连续发生堕胎或小产三次以上者,诊断为

(117~118题共用备选答案)

- A.两地汤
- B.逐瘀止血汤
- C.清肝止淋汤
- D.清热固经汤
- E.归脾汤

117.治疗经间期出血脾气虚证,应首选的方剂是

118.治疗经间期出血湿热证,应首选的方剂是

(119~120 题共用备选答案)

- A.补中益气汤
- B.香砂六君子汤
- C.人参养营汤
- D.参苓白术散
- E.健固汤合四神丸

119.治疗经行泄泻肾虚证,应首选的方剂是

120.治疗经行泄泻脾虚证,应首选的方剂是

(121~122 题共用备选答案)

- A.滋阴清热,止血调经
- B.清热凉血,止血调经
- C.温肾固冲,止血调经
- D.滋水益阴,止血调经
- E.益气摄血,养血调经

121.崩漏虚热证的治法是

122.崩漏脾虚证的治法是

(123~124 题共用备选答案)

- A.少腹逐瘀汤
- B.生化汤
- C.清热调血汤
- D.大黄牡丹皮汤
- E.大柴胡汤

123.患者产后高热,小腹剧痛,恶露有臭气,大便秘结,治疗应首选的方剂是

124.患者产后寒热时作,恶露甚少,色紫黯,小腹疼痛拒按,口干不欲饮。治疗应首选的方剂是

(125~126 题共用备选答案)

- A.黄体生成素
- B.卵泡雌激素
- C.雌激素
- D.孕激素
- E.催乳素

125.能够引起排卵后基础体温升高的激

素是

126.能够促进阴道上皮细胞增生和角化,保持阴道弱酸性的激素是

(127~128 题共用备选答案)

- A.人流综合征
- B.子宫穿孔
- C.人流后宫缩不良
- D.人流不全
- E.人流术后感染

127.不属于人工流产并发症的是

128.患者人流术后 10 天,间断阴道出血,近 1 天阴道出血大于月经量,夹有黑血块;B 超示:宫腔内有组织残留。其诊断是

(129~130 题共用备选答案)

- A.心脾肾
- B.心肝肾
- C.脾肾肝
- D.心肝
- E.肺脾

129.急惊风的病位在

130.慢惊风的病位在

(131~132 题共用备选答案)

- A.喷他咪
- B.螺旋霉素
- C.更昔洛韦
- D.氟康唑
- E.乙胺嘧啶+磺胺嘧啶

131.治疗 AIDS 并发的卡氏肺孢子菌肺炎

132.治疗 AIDS 并发的弓形虫脑病首选

(133~134 题共用备选答案)

- A.肾气不足
- B.肝肾不足
- C.心气不足
- D.气血两虚
- E.心肝肾不足

133.小儿五迟中行迟为

134.小儿五迟中语迟为

(135~136 题共用备选答案)

- A.三拗汤

- B.华盖散
C.大青龙汤
D.麻杏石甘汤合苏葶丸
E.小青龙汤合三子养亲汤
135.治疗哮喘之外寒内热的首选方剂是
136.治疗肺炎喘嗽之风寒郁肺证的首选方剂是

(137~138 题共用备选答案)

- A.镜面舌
B.地图舌
C.红绛舌
D.草莓舌
E.霉酱舌

- 137.丹痧的典型舌象是
138.胃之气阴不足的典型舌象是

(139~140 题共用备选答案)

- A.高热、头痛、皮下出血
B.高热、表情淡漠、相对缓脉
C.高热、咳嗽、呼吸困难
D.高热、腹痛、脓血便
E.高热、抽搐、意识障碍

139.人禽流感的临床表现是

140.流脑的临床表现是

(141~142 题共用备选答案)

- A.轻型
B.普通型
C.暴发型休克型
D.暴发型脑膜脑炎型
E.暴发型混合型

下列病例属于流脑的哪一型

141.患者发热、头痛、呕吐、皮肤瘀点、瘀斑、颈项强直,治疗不当,第3天昏迷抽搐、脱水治疗后好转,2周出院

142.患者突起高热,神志不清5小时,面色灰,口唇发绀,皮肤大片出血斑,血压测不到,瞳孔忽大忽小,呼吸节律不齐,病理反射(+)

(143~144 题共用备选答案)

- A.100~150 mL/kg
B.150~200 mL/kg
C.50~120 mL/kg
D.60~80 mL/kg
E.200~250 mL/kg

143.儿童中型霍乱患者24小时补液量为

144.儿童重型霍乱患者24小时补液量为
(145~146 题共用备选答案)

- A.发病日起21天
B.至症状消失后3天,但不少于发病后

7天

- C.隔离至退热
D.症状消失后5天起便培养2次阴性

或症状消失后15天

E.3~4周

145.流行性脑脊髓膜炎隔离时间

146.细菌性痢疾隔离时间

(147~148 题共用备选答案)

- A.病程超过2周
B.病程超过1月
C.病程超过2月
D.病程超过半年
E.病程超过1年

147.慢性肝炎

148.慢性菌痢

(149~150 题共用备选答案)

- A.参苓白术散
B.附子理中汤
C.参附龙牡汤
D.己椒苈黄汤合参附汤
E.参附汤

149.治疗小儿泄泻脾肾阳虚证,应首选的方剂是

150.治疗小儿水肿水凌心肺证,应首选的方剂是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	E	D	D	B	D	B	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	C	A	B	B	A	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	B	B	A	D	D	C	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	C	E	A	C	C	E	D	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	D	C	D	E	C	A	D	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	D	B	E	B	D	D	A	E	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	C	C	D	C	B	D	B	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	E	C	B	D	B	B	C	B	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	E	D	C	E	D	B	D	C	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	B	B	C	B	E	A	C	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	C	A	C	C	D	A	E	A	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	C	A	C	B	E	E	C	E	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	D	B	D	C	C	D	D	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	E	B	C	C	B	D	B	C	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	E	B	E	B	D	D	C	B	D