

2020 年医师定期考核题库-口腔科

888 题（含参考答案）



扫码关注，免费获取更多口腔医考资料

一、单选题1. HSV-2 可引起A. 宫颈癌
肉瘤

C. 原发性肝细胞癌淋巴瘤
E. 白血病

正确答案：A

2. 下列哪项不是中央型颌骨骨髓炎的临床表现A. 感染来源以下颌智齿冠周炎为主
B. 病变多在颌骨体
C. 骨髓炎累及的牙多数松动D. 临床表现以弥漫型较多
E. 病变可累及松质骨与密质骨
正确答案：A

3. 关于胰岛素的药理作用，错误的描述是A. 促进葡萄糖氧化和酵解

B. 促进脂肪合成并抑制其分解C. 促进糖原分解
D. 促进蛋白质合成并抑制其分解E. 促进钾离子进入细胞

正确答案：C

4. ~

5. 下列不属于瓷全冠适应证的是A. 前牙牙髓坏死而变色
B. 前牙切角切缘缺损
C. 错位牙不宜进行正畸治疗
D. 牙冠充填治疗后需美观修复者E. 夜磨牙患者

正确答案：E

6. 患者，男性，40岁，诉左上颌后牙出现咬合痛7天求治。口腔检查：左上第一磨牙近远中向纵折，松动Ⅱ度，叩诊(+)，牙龈稍红肿。拟局麻下拔除，采用的麻醉方法是

A. 上牙槽后神经阻滞麻醉+腭前神经阻滞麻醉
B. 上牙槽后神经阻滞麻醉+眶下神经阻滞麻醉

C. 上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸润麻醉

D. 上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸润麻醉+眶下神经阻滞麻醉
E. 上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸润麻醉+腭前神经阻滞麻醉
正确答案：E

7. 表现为髁突前斜面骨质不规则增厚，密度增高
A. 髁突硬化

B. 髁突前斜面模糊不清
C. 髁突骨质增生

D. 髁突小凹陷缺损
E. 髁突囊样变

正确答案：A

8. 组织发生来自闰管储备细胞的肿瘤是
A. 基底细胞腺瘤

B. 嗜酸性腺瘤

D. 管状腺瘤

E. 乳头状囊腺瘤
正确答案：A

9. 患者，男，1岁2个月，仍未见第一颗乳牙萌出，已排除“无牙畸形”。该发育异常不可能的病因是

A. 佝偻病

B. 甲状腺功能低下
C. 营养缺乏

D. 全身性骨硬化症

E. 肯定与全身因素有关
正确答案：E

10. 患者，男性，74岁，口腔黏膜疼痛不适，无法进食近1周，检查见口腔内颊、舌、软腭、牙龈黏膜均可见大面积糜烂，覆盖有假膜，揭皮试验阳性；腹部及背部均可见散在的小水疱，疱已破留下褐色疱壁；尼氏征阳性。治疗上首选

A. 抗病毒药物
B. 抗生素类药物

C. 抗真菌药物

D. 肾上腺皮质激素
E. 镇痛类药物

正确答案：D

11. 下唇及周围皮肤灼痛瘙痒，局部出现丛集成簇的透明水疱，破溃后干瘪结痂，应诊断为

A. 疱疹性龈口炎
B. 唇疱疹

C. 手-足-口病
D. 鹅口疮

E. 复发性口疮正确答案: B

12. 在下颌隆突处注射麻醉剂可以麻醉的神经是A. 颊神经和下牙槽神经
B. 舌神经和下牙槽神经C. 下牙槽神经
D. 颊神经和舌神经
E. 颊神经. 舌神经和下牙槽神经正确答案: E

13. 烤瓷熔附金属全冠边缘为烤瓷者, 牙体颈缘应预备成A. 羽状
B. 凹槽状
C. 直角斜面形度凹面或直角
E. 以上颈缘预备形均可正确答案: D

14. 比较真核生物与原核生物的 DNA 复制, 它们的相同之处是

A. 引物长度较短
B. 合成方向自 5' -3' c. 冈崎片段长度短
D. 有多个复制起始点
复制的速度较慢(100dNTP / s) 正确答案: B

15. 关于颌骨骨折描述不正确的是

A. 在下颌骨骨折中, 影响骨折段移位的主要因素是咀嚼肌的牵拉作用 B. 单侧髁突颈部骨折可见患侧下颌向外. 后移位, 不能向对颌作侧方运动型骨折是指骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁. 眶部, 经颧额缝向后达翼突
D. 颧骨. 颧弓骨折后可表现为颧面部塌陷. 张口受限. 复视. 瘀斑以及神经症状E. 下颌骨颈部粉碎性骨折可导致舌后缩, 发生窒息
正确答案: C

16. 关于成釉细胞瘤的x 线表现错误的是

A. 可呈单囊或多囊变 B. 呈多房性囊肿样阴影
C. 囊壁边缘不整齐, 呈半月形切迹D. 囊内根尖不规则吸收
E. 呈分房状伴有钙化灶, 正确答案: E

17. 以下关于静脉畸形的叙述错误的是A. 扪之柔软, 可被压缩

B. 表浅肿瘤呈现蓝色或紫色C. 有时可扪到静脉石
D. 扪诊有震颤感, 听诊有吹风样杂音E. 体位移动试验阳性
正确答案: D

18. E. 冠根比为 3:

19. 一患者髁突区开放性骨折, X 线片提示髁突粉碎性骨折, 应选择哪种治疗措施

A. 切开复位内固定
B. 颌间结扎+颅颌固定C. 颌间结扎固定
D. 髁突摘除术
E. 弹性绷带颅颌固定正确答案: D

20. 下牙槽神经阻滞麻醉时发生烦躁不安, 多话思睡, 循环衰竭等现象, 可能是A. 注射点过高

B. 针尖刺入过深C. 针尖刺入过前D. 针尖刺入过后

E. 麻药注射入血管内
正确答案: D

21. 患者, 女性, 24 岁, 左下第三磨牙低位阻生。注射麻药后出现头晕. 胸闷. 面色苍, 脉快而

弱, 恶心. 呼吸困难, 血压下降。并有短暂意识丧失。根据上述症状可诊断为

A. 癔症

B. 肾上腺素反应C. 中毒

D. 晕厥

E. 过敏反应
正确答案: D

22. 腮腺导管的开口, 相对于哪个牙冠的颊黏膜上A. 上颌第二前磨牙

B. 上颌第一前磨牙C. 上颌第一磨牙 D. 上颌第二磨牙 E. 上颌第三磨牙 正确答案:

B

23. 患者, 男性, 40 岁。腮腺区渐进性增大肿块, 界限清楚, 无其他不适。镜下见肿瘤细胞形成导管. 实性片块. 黏液样和软骨样结构。上皮与黏液样组织互相移行, 肿瘤有包膜但不完整, 且肿瘤细胞浸润包膜。上述所见符合

A. 多形性腺瘤

B. 多形性腺瘤恶变

C. 多形性低度恶性腺癌

D. 多形性腺瘤, 有恶变倾向E. 肌上皮瘤

正确答案: A

24. 患者面部鼻梁两侧皮肤呈鲜红色斑。唇红部病变糜烂出血, 病损周围可见白色放射状条纹。镜检上皮呈过度角化, 粒层明显, 角化层可见角质栓塞。基底细胞层液化变性, 基底膜界限不清, 上皮下结缔组织内淋巴细胞浸润, 毛细血管扩张, 管周淋巴细胞浸润明显。其病理诊断为

A. 红斑B. 白斑

C. 慢性盘状红斑狼疮D. 口腔黏膜下纤维化E. 扁平苔藓

正确答案: C

25. 下颌牙齿的血液供应来自A. 舌动脉

B. 下唇动脉C. 面动脉

D. 颞浅动脉E. 上颌动脉
正确答案: E

26. 下列关于白血病的牙龈病损的临床表现, 描述正确的是A. 牙龈肿胀

B. 牙龈有明显的出血倾向

C. 严重时出现口腔黏膜的坏死或牙痛D. 有时伴有发热. 局部淋巴结肿大

E. 以上都是正确答案: E

27. 关于颞下颌关节紊乱病。叙述错误的是

A. 是一组疾病的总称, 多发于 20-30 岁的青壮年

B. 多因素理论被多数学者认同

C. 临床上三大主要症状为: 下颌运动异常. 自发性疼痛. 弹响和杂音D. 本病有自限性, 一般不发生关节强直

E. 以保守治疗为主, 遵循一个合理的合乎逻辑的治疗程序正确答案: C

28. 与结核杆菌耐干燥有关的是A. 胞壁致密

B. 胞壁中脂质多C. 含耐热酶

D. 有芽孢

E. 以上都不是正确答案: B

29. 患者, 男性, 45 岁, 诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。口腔检查: 左下第二前磨牙和第一磨牙残冠, 叩诊(±), 松动(一), 已做过牙髓治疗, 牙龈稍红, 无法再修复, 拟拔除。口内其他牙未见明显异常。X 线片示: 左下第一磨牙远中根尖有阴影, 距离下颌神经

管较近。

左下第二前磨牙和第一磨牙拔除不需麻醉的神经是

A. 下牙槽神经B. 舌神经

C. 咬肌神经D. 颊神经

E. 以上神经均需麻醉正确答案: C

30. 活动义齿模型设计时, 将模型向后倾斜的原因是A. 使义齿从前向后倾斜

B. 制作方便

C. 利用倒凹固位

D. 牙槽嵴丰满, 唇侧倒凹过大

E. 减少义齿前份基托与余留牙间的间隙正确答案: D

31. ~患者, 25 岁, 4 拔牙 3 个月余, 在设计桥体时, 选择下列哪种龈端类型最合理

~A. 鞍式B. 卫生桥C. 球形

D. 改良盖嵴式E. 盖嵴式

正确答案: D

32. 一患者被人用刀划伤面部软组织, 耳前区皮肤有长约 6cm 的纵形创口. 创缘整齐, 有活动出血。

应采取的处理措施是

A. 清创止血，检查是否合并重要的结构损伤，并用无菌敷料覆盖
B. 局部冷敷加压包扎

C. 尽早行清创缝合术
D. 创面用油纱布覆盖
E. 暴露创口全身用抗生素
正确答案：C

33. 牙本质、牙髓、牙骨质和牙周膜均来源于
A. 牙囊
B. 牙乳头
C. 外间充质
D. 间质
E. 都不是
正确答案：C

34. 关于牙龈上皮，以下哪项是错误的
A. 孔隙容积约为 2%-4%
B. 孔隙大小不一
C. 较小空隙是由直接脱矿产生
D. 同时存在脱矿与再矿化
E. 可见于 85%-90%的早期龋中
A. 牙龈由上皮、固有层和黏膜下层组成
B. 口腔龈上皮为牙龈上皮暴露于口腔的部分
C. 龈沟上皮有上皮钉突
D. 覆盖于龈沟壁的上皮称为龈沟上皮
E. 龈谷表面覆盖的是无角化鳞状上皮
正确答案：A

35. 牙本质发育不全
A. 成釉细胞增生突入牙乳头
B. 牙齿发育时牙乳头组织向成釉器突起
C. 釉牙本质界平直
D. 釉基质合成、分泌或矿化障碍
E. 局限性釉质增生
正确答案：C

36. 在菌斑成熟过程中，首先吸附到牙面的是
A. 唾液链球菌
B. 变形链球菌
C. 革兰阳性球菌
D. 革兰阴性杆菌
E. 革兰阴性厌氧菌
正确答案：C

37. 牙周病基础治疗的重点是
A. 龈上洁治术
B. 龈下刮治术
C. 菌斑控制
D. 根面平整
E. 治疗食物嵌塞
正确答案：C

38. 牙槽脓肿多源于
A. 牙周袋
B. 坏死牙髓
C. 接近龈缘
D. 接近龈颊沟
E. 牙龈炎
正确答案：B

39. 患者，男，因牙龈出血半年就诊。
如该患者为 4 岁儿童，全口乳牙松动，首先应警惕下列哪一类疾病的发生
A. 心肌炎
B. 掌跖角化一牙周破坏综合征

C. 糖尿病 D. 艾滋病 E. 急性肾炎

正确答案：B

40. 游离皮片移植的皮片越厚则A. 收缩越大

B. 越容易成活C. 质地越脆

D. 越能耐受摩擦E. 色泽变化越大 正确答案：D

41. /

42. 以下疾病中不具有癌变倾向的是A. 口腔白斑病

B. 口腔红斑病 C. 口腔扁平苔藓D. 盘状红斑狼疮

E. 坏死性黏膜腺周围炎 正确答案：E

43. 患者，女性，36岁，因咽痛服磺胺药后，舌背起疱，破溃后疼痛难忍，进食受限。以往曾有类似病史。检查：舌背黏膜表面可见界限清楚的糜烂面，表面有黄色假膜，渗出较多。

本病例最可能诊断为A. 急性疱疹性龈口炎B. 黏膜血疱

C. 药物过敏性口炎D. 白塞病

E. 接触性口炎 正确答案：C

44. 对放射线中度敏感的肿瘤是A. 恶性黑色素瘤

B. 骨肉瘤

C. 恶性淋巴瘤D. 鳞状细胞癌E. 未分化癌 正确答案：D

45. 患者肿瘤放化疗后出现口腔黏膜充血糜烂，覆盖灰白色假膜，可拭去，伴口角炎，舌背乳头团块状萎缩，味觉丧失，觉得黏膜干燥，灼痛。最可能的诊断是

A. 急性假膜型念珠菌性口炎B. 急性红斑型念珠菌性口炎C. 慢性红斑型念珠菌性口炎D. 慢性肥厚型念珠菌性口炎E. 慢性黏膜皮肤念珠菌病 正确答案：B

46. 涎石病的典型症状是A. 炎症症状

B. 阻塞症状C. 口干症状D. 神经症状E. 全身症状 正确答案：B

47. 价值观形成和发展的关键期是A. 幼儿期

B. 儿童期

C. 青少年期D. 青年期 E. 中年期

正确答案：C

48. 下列哪一种细胞不参与T细胞介导的免疫应答

A. 巨噬细胞

细胞细胞细胞

正确答案：D

49. 基底细胞液化变性常见于A. 白斑
B. 天疱疮 C. 类天疱疮D. 单纯疱疹E. 扁平苔藓

正确答案：E

50. 翼下颌皱襞

- A. 是上颌结节后内方与磨牙后垫后方之间的黏膜皱襞B. 深面有蝶下颌韧带
C. 是麻醉舌神经的标志
D. 是麻醉上牙槽神经的标志E. 是咽后间隙切口的标志 正确答案：A

51. 保证下颌运动协调的关系是A. 双侧颞下颌关节的协调

- B. 颌关系的协调C. 神经协调控制D. 肌肉运动协调
E. 颞下颌关节、颌和神经肌肉结构三者协调一致 正确答案：E

52. 患者，女性，70岁，急性心梗。查血压 83/60mmHg，中心静脉压(20cmH₂O)，应首先采取哪项措施

- A. 应用毛花苷丙B. 应用呋塞米 C. 应用激素
D. 适当补液E. 继续观察 正确答案：D

53. 口腔假丝酵母菌病的发生是由于() 自身免疫性疾病
免疫功能减退两者均是
两者均否

正确答案：B

54. 妊娠胆汁淤积症的产生是由于胆汁从胆囊流出受阻，导致胆盐在体内堆积，初级胆汁酸与次级胆汁酸以钠盐或钾盐的形式存在即为胆盐。下列属于次级结合胆汁酸的是

- A. 牛磺胆酸 B. 鹅脱氧胆酸
c. 甘氨脱氧胆酸D. 石胆酸
E. 甘氨胆酸 正确答案：C

55. 妊娠 40 周新生儿，出生时由口鼻排出部分肺内液体，其余经血管及淋巴管吸收的肺液约占

/

56. 上颌骨骨折后骨折片移位方向一般是A. 向后上

- B. 向后内C. 向后下D. 向后外E. 向内前

正确答案：C

57. 复合性创伤患者出现下列情况。应首先抢救A. 休克
B. 开放性气胸C. 昏迷
D. 四肢开放性伤口E. 肾挫裂伤
正确答案：B

58. 腺周口疮与创伤性溃疡的区别不包括A. 溃疡形状不同
B. 好发部位不同C. 是否有自限性D. 是否有复发性E. 疼痛程度不同
正确答案：E

59. 颧弓骨折必须复位的指征是A. 骨折区疼痛
B. 咀嚼无力
C. 面部轻微凹陷
D. 张口受限和骨折区疼痛E. 患者要求治疗
正确答案：D

60. 口腔扁平苔藓与白斑组织病理学表现的区别不包括A. 颗粒细胞. 棘细胞层厚度
B. 角化层厚度
C. 基底细胞液化变性 D. 上皮细胞内水疱形成
E. 炎细胞浸润部位. 分布及组成
正确答案：D

61. 颞下颌关节急性前脱位的治疗中，哪一项最常用A. 切开复位
B. 全麻下复位C. 颌间复位
D. 口外法手法复位E. 口内法手法复位
正确答案：E

62. 患者，男性，32岁，6天前感冒后出现左下后牙区胀痛，进食. 吞咽时加重。昨日起出现局部自发性跳痛，张口受限，低热，头痛。检查可见：左下颌角区颊部稍肿胀，无压痛，张口度两指。左下第三磨牙近中阻生牙龈红肿充血，挤压可见远中盲袋内少量脓液溢出，颊侧前庭沟丰满. 充血。压痛明显. 叩诊(一)，无松动。咽侧壁稍充血，无压痛。
患者如出现明显张口受限，面部肿胀不明显，仅口外升支后缘稍红肿. 压痛明显，此时应怀疑合并
A. 翼下颌间隙感染B. 咬肌间隙感染 C. 咽旁间隙感染 D. 下颌下间隙感染

E. 颞间隙感染
正确答案：A

63. 面神经颊支
A. 出腮腺前缘行于咬肌筋膜深面B. 一般与腮腺导管平行
C. 损伤时口角歪斜D. 来自颞面干
E. 位于耳屏间切迹与鼻翼上缘的连线
正确答案：B

64. 唇淋巴的叙述中，错误的是
A. 下唇中部的淋巴管，不交叉至对侧
B. 上. 下唇的淋巴管均可注入下颌下淋巴结

C. 下唇外 1/3 的淋巴管可通过颈孔进入下颌骨
D. 上唇的淋巴管有时可注入耳前或颈深上淋巴结
E. 下唇中部的淋巴管主要注入颈下淋巴结
正确答案: A

65. 患者, 女性, 22 岁, 因右上第三磨牙颊向高位阻生, 要求拔除。需要麻醉的神经是同侧的
A. 上牙槽后神经+腭后神经
B. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
C. 上牙槽后神经+腭前神经
D. 上牙槽中神经+腭前神经
E. 上牙槽后神经+鼻腭神经
正确答案: C

66. 以下哪项不是输血的禁忌证
A. 充血性心力衰竭
B. 急性肺水肿
C. 恶性高血压
D. 严重感染
E. 肾衰竭
正确答案: D

67. 受血者配血试验的血标本必须是输血前天之内的天之内的天之内的天之内的
正确答案: B

68. 下述哪种方法不能有效清除牙齿邻面的菌斑
A. 使用牙线
B. 使用牙签
C. 使用牙间隙刷
D. 使用一般牙刷
E. 使用锥形橡皮夹
正确答案: D

69. 临床中下颌骨体部骨折固定时间应该为周
个月个月周
E. 半年
正确答案: D

70.
正确答案: A

71. 患儿, 女, 9 岁半, 左下颌第一恒磨牙殆面龋洞。探(+), 叩(-), 松(-), 治疗过程中不适宜的操作方法是
A. 用金刚砂车针高速切削制备洞形, 减少牙质发生裂纹
B. 龋蚀显示液
C. 挖匙去龋
D. 球钻低速去龋
E. 接近露髓处留下部分软化牙本质
正确答案: A

72. 二期梅毒的诊断标准不包括

- A. 多种皮疹伴全身淋巴结肿大和早期流感症状
B. 有不洁性交史或下疳史，病程两年以内
C. 实验室检查时黏膜损害处能找到梅毒螺旋体
D. 梅毒血清学试验强阳性
E. 梅毒黏膜白斑
正确答案：E

73. 急性腮腺炎最常见的病原菌是
A. 金黄色葡萄球菌
B. 链球菌
C. 文生螺旋体
D. 肺炎球菌
E. 厌氧菌
正确答案：A

74. 下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫的处理方法是
A. 局部热敷
B. 注射维生素

75. 牙本质是

- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间是一层未钙化的牙本质
B. 牙本质钙质小球之间遗留的未钙化间质
C. 在冠部靠近釉质最先形成的牙本质
D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
E. 釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时，部分成牙本质细胞继续形成的牙本质
正确答案：C

76. 临床上分腮腺为浅、深叶的依据是
A. 颈外动脉穿行的平面
B. 下颌后静脉穿行的平面
C. 面神经主干及其分支的平面
D. 咬肌的前缘
E. 下颌支的后缘
正确答案：C

77. 关于关节韧带描述，正确的是

- A. 颞下颌韧带是颞下颌关节的内侧面一对坚强的侧副韧带
B. 颞下颌韧带亦是颞下颌关节的外侧面坚强的侧副韧带
C. 防止下颌过度向前移位的韧带是蝶下颌韧带
D. 下颌主要由茎突下颌韧带悬挂
E. 颞下颌韧带主要防止关节向前方脱位
正确答案：B

78. 表现为典型的关节炎、尿道炎和结膜炎三联症，也常出现口腔溃疡、口腔炎、阴茎头炎、皮疹、宫颈炎等皮肤黏膜病变的疾病是

- A. 手-足-E1 病
B. 口-眼-生殖器三联症
C. 斯-约综合征
D. 莱特尔综合征
E. 梅-罗综合征
正确答案：D

79. 患者，女性，21岁，诉咀嚼无力，牙松动。口腔检查见 CI-S：1，4 颗第一恒磨牙牙周袋深约 6mm。松动 II 度，上前牙呈扇形排列。对于牙周脓肿反复发作且疗效差者，应作

- A. 血糖及尿糖检查 B. 活体组织检查 线片检查
D. 龈沟液检查
E. 细菌学涂片检查 正确答案：A

80. 患者，女性，36岁，因口腔黏膜反复起水疱1年多就诊，起疱与进食无关，水疱可破溃形成溃疡。检查：下唇内侧黏膜有直径5mm的水疱，探针无法伸入水疱周围的黏膜下方，涂片未见Tzanck细胞。
本病的最好发部位是

- A. 颊
B. 唇 C. 牙龈 D. 舌 E. 硬腭
正确答案：C

81. 患者，男性，50岁，口腔多年以来反复出现溃疡，外生殖器也常出现溃疡，近来眼睛也出现不适，经诊断为虹膜睫状体炎，除此以外下肢皮肤可见结节性红斑，手背静脉注射处可见红疹，最可能的诊断是
A. 舍格伦综合征 B. 莱特尔综合征 C. 贝赫切特综合征 D. 梅-罗综合征 综合征
正确答案：C

82. 患者舌、软腭、咽部、颊黏膜等多处可见大而深的溃疡，疼痛剧烈。镜检病变深在，侵及黏膜下层，腺泡组织被炎症破坏，腺管扩张，腺管上皮增生。腺小叶结构消失，下方结缔组织胶原纤维水肿、断裂，毛细血管扩张充血。其病理诊断为
A. 复发性坏死性黏膜腺周围炎 B. 白塞综合征
C. 复发性阿弗他溃疡 D. 天疱疮
E. 韦格纳肉芽肿 正确答案：A

83. 一患者双侧髁突颈部骨折，关于其临床表现的描述不正确的是
A. 下颌升支向上移位，前牙开牙合
B. 下颌不能前伸运动
C. 严重的肿痛和功能障碍 D. 侧方运动不受限
E. 合并不同程度的脑震荡 正确答案：D

84. 患者，男性，62岁。自觉牙龈出血、牙齿松动半年余。检查：CI-S：3，多个牙松动度在I-II度之间，牙龈红肿、探易出血，牙周袋深3-5mm。
如果该患者有人工心脏瓣膜，则最佳的治疗方法是

- A. 直接作牙周基础治疗即可
B. 在接受牙周治疗的当天应服用抗生素
C. 在接受牙周治疗后的第2天应服用抗生素
D. 只服用抗生素即可 E. 只使用氯己定含漱 正确答案：B

85. /

86. 下面关于急性多发性龈脓肿的发病特点错误的是

- A. 多发于春、秋两季
- B. 多数病例起病急骤
- C. 大多有前驱症状
- D. 主要发生于青壮年女性
- E. 患病前多有全口性的慢性牙龈炎症

正确答案：D

87. 下面关于急性龈乳头炎的治疗哪一项不正确

- A. 全身应用抗生素
- B. 去除局部刺激因素
- C. 局部使用抗菌消炎药物冲洗
- D. 急性炎症过后，彻底去除病因，如邻面龋、不良修复体等
- E. 去除邻面的菌斑、牙石，以缓解急性炎症

正确答案：A

88. 观察儿童第三磨牙牙胚情况宜采用

- A. 下颌横断殆片
- B. 口内根尖片
- C. 上下颌第三磨牙口外投照片
- D. 牙合翼片
- E. 下颌前部殆片

正确答案：C

89. 患者，男性，28岁，右颈上部淋巴结结核，下列何种药物对此患者治疗无效

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 利福平
- D. 异烟肼
- E. 乙胺丁醇

正确答案：A

90. 以下关于静脉畸形的叙述错误的是

- A. 扪之柔软，可被压缩
- B. 表浅肿瘤呈现蓝色或紫色
- C. 有时可扪到静脉石
- D. 扪诊有震颤感，听诊有吹风样杂音
- E. 体位移动试验阳性

正确答案：D

91. 在医学心理学的主要理论学派中，“第三势力”是指

- A. 心理生理学
- B. 精神分析理论
- C. 认知学派理论
- D. 人本主义学派
- E. 行为学派

正确答案：D

92. 医患关系的性质是

- A. 医患关系是一般的契约关系
- B. 医患关系是纯粹的信托关系
- C. 医患关系是在信托关系基础上的契约关系
- D. 医患关系是信托关系就不是契约关系
- E. 医患关系是契约关系就不是信托关系

正确答案：C

93. 关于牙本质的形成，正确的是

- A. 其矿化形态是层板状钙化
- B. 先形成牙釉质，后形成牙本质
- C. 其矿化是由牙乳头细胞完成的
- D. 牙本质基质主要是III型胶原
- E. 在成牙本质细胞层和矿化牙本质之间总有一层有机基质

正确答案：E

94. 牙周炎始发期上皮下结缔组织内的炎细胞浸润主要为淋巴细胞
淋巴细胞

C. 浆细胞

D. 中性粒细胞 E. 巨噬细胞 正确答案：D

95. 关于牙本质小管，不正确的叙述是 A. 近牙髓一端较粗，越近表面越细

B. 行程中可有许多侧支可存在于球间牙本质内

C. 在近髓侧和近表面每单位面积内小管数目之比为 4:

96. 角化囊肿的内容物是哪种性质的 A. 白色凝乳状物质

B. 灰白色或淡黄色角化物质 C. 豆腐渣样物质

D. 无色透明黏稠液体

E. 淡黄色含胆固醇结晶液体 正确答案：B

97. Mongolism 是指综合征

B. 掌跖角化一牙周破坏综合征 C. 白细胞功能异常

D. 艾滋病

E. 坏死性溃疡性牙周炎 正确答案：A

98. 从事母婴保健工作的人员，违反母婴保健法的规定有下列行为，情节严重的，依法取消执业资格

A. 胎儿性别鉴定的

B. 实施终止妊娠手术的 C. 产前检查的

D. 医学技术鉴定的 E. 婚前医学检查的 正确答案：A

99. 医患双方当事人对患者死因有异议的，应当尸检。当地不具备尸体冻存条件的，尸检的期限是

A. 在患者死亡后 24 小时内进行

B. 在患者死亡后 12 小时内进行

C. 在患者死亡后 36 小时内进行

D. 在患者死亡后 48 小时内进行

E. 在患者死亡后 60 小时内进行 正确答案：D

100. 患者，女性，32 岁，主诉：左下后牙颊侧牙龈长一个肿物 4 个月，并慢慢增大，影响进食，如果临床诊断为牙龈瘤，关于该患者的治疗原则，下列哪一项说法错误

A. 必须手术彻底，否则容易复发 B. 主要治疗方法为手术切除

C. 多次复发时，需拔除波及的患牙

D. 手术时需切除瘤体组织，尽可能保留骨膜 E. 手术切口在瘤体底部周围正常的组织上 正确答案：D

101. 牙周间隙变窄或消失的 x 线影像是

- A. 牙牙合向脱位
- C. 牙根折裂
- E. 致密性骨炎
- B. 牙嵌人性脱位
- D. 牙折

正确答案：B

102. 关于舌癌描述错误的是

- A. 多数为鳞癌
 - B. 是最常见的口腔癌
 - C. 舌后 1/3 癌肿属口咽癌范畴
 - D. 主要以血道转移为主
 - E. 生长快，浸润性较强
- 正确答案：D

103. 下列关于AIDS 的说法不正确的是

- A. 常伴发 Kaposi 肉瘤主要侵犯CD4+T 细胞
 - C. 易发机会感染
 - D. 疫苗预防有效
 - E. 此患者 OT 试验常为强阳性
- 正确答案：E

104. 牙列缺损会引起的不良影响是

- A. 咀嚼功能减退
- B. 发音功能障碍
- C. 美观差
- D. 颞下颌关节紊乱病
- E. 以上均是

正确答案：E

105. 患者，男性，65 岁。右上第一和第二磨牙仅剩残根不松动，拔除该两残根时应麻醉的神经是

- A. 眶下神经+腭后神经
- B. 上牙槽前神经+上牙槽后神经+腭前神经
- C. 上牙槽后神经+上牙槽中神经+鼻腭神经
- D. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
- E. 上牙槽后神经+腭前神经

正确答案：D

106. 面神经颅外段及分支不包括

- A. 颞支
 - B. 颧支
 - C. 颊支
 - D. 下颌缘支
 - E. 上颌缘支
- 正确答案：E

107. 唇淋巴的叙述中，错误的是

- A. 下唇中部的淋巴管，不交叉至对侧
- B. 上、下唇的淋巴管均可注入下颌下淋巴结
- C. 下唇外 1/3 的淋巴管可通过颈孔进入下颌骨
- D. 上唇的淋巴管有时可注入耳前或颈深上淋巴结
- E. 下唇中部的淋巴管主要注入颈下淋巴结

正确答案：A

108. 使用龈下刮治器时，刀刃与牙面应成

- ° 角左右

- ° 角左右
- ° 角左右
- ° 角左右
- ° 角左右

正确答案：C

109. 关于牙周炎治疗的基本目标。下列哪项错误
A. 消除炎症
B. 消除牙周炎所导致的不适. 出血. 疼痛等症状

- C. 使牙周破坏停止
 - D. 使松动牙重新变牢
 - E. 促使牙周组织修复再生
- 正确答案：D

110. 患者，男性，28岁，风湿性心瓣膜病3年，曾经诊断为“二尖瓣狭窄并关闭不全”。半月来发热，37-38℃，心衰症状加重。查体：端坐位，贫血貌，皮肤无瘀点，颈静脉怒张，心界扩大，心尖部舒张期隆隆样杂音，主动脉瓣区舒张期叹气样杂音，脾大，下肢不肿。该患者的初步诊断是

- A. 风湿性心肌炎
 - B. 贫血性心脏病
 - C. 风心病，心力衰竭
 - D. 先天性主动脉瓣病变
 - E. 风湿性瓣膜病合并亚急性感染性心内膜炎
- 正确答案：E

111. 患儿，3个月，一侧上唇部分裂开，但未裂至鼻底，其唇裂的分类应为度

- B. II度
 - C. 隐性唇裂
 - D. III度
 - E. 混合型唇裂
- 正确答案：B

112. 患者，男性，24岁，主诉晨起时枕头上有血迹，牙龈有自发-陛出血. 疼痛及腐败性口臭2天。

确诊之前，不需做下列哪一项口腔检查或辅助检查

- A. 牙龈的色. 形. 质的变化
- B. 量体温
- C. 测血压
- D. 唇颊黏膜

E. 血常规

正确答案：C

113. 关于牙龈瘤和牙龈癌的鉴别诊断，关键依据是

- A. 多见于唇. 颊侧的牙龈乳头
- B. 伴有牙槽骨吸收及牙周膜间隙增宽
- C. 牙龈表面溃疡，易出血
- D. 组织病理学确诊

E. 累及的牙齿可能松动或移位
正确答案：D

114. 单颌固定不具备的优点是
A. 可行使张闭口运动
B. 对进食、语言功能影响较小
C. 便于保持口腔卫生
D. 固定坚实可靠
E. 具有一定功能活动，有利于改善局部血液循环
正确答案：D

115. 舌下腺囊肿的内容物的特点是
A. 白色凝乳状物质
B. 灰白色角化物质
C. 无色透明黏稠液体
D. 豆腐渣样物质
E. 淡黄色含胆固醇结晶液体
正确答案：C

116. 下列关于三叉神经痛定义正确的是
A. 指在三叉神经分布区域内出现阵发性电击样剧烈疼痛，历时数秒至数分钟，间歇期有轻微症状
B. 指在三叉神经分布区域内出现阵发性电击样剧烈疼痛，持续时间较长，间歇期无症状
C. 指在三叉神经分布区域内出现阵发性剧烈跳痛，历时数秒至数分钟，间歇期有症状
D. 指在三叉神经分布区域内出现阵发性电击样剧烈疼痛，持续时间较长，间歇期有轻微症状
E. 指在三叉神经分布区域内出现阵发性电击样剧烈疼痛，历时数秒至数分钟，间歇期无症状
正确答案：E

117. 关于周围性面瘫临床表现不正确的是
A. 一侧面部表情肌完全瘫痪
B. 一侧眼裂以下表情肌瘫痪
C. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍
D. 一侧面瘫+味觉丧失
E. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍+听觉改变
正确答案：B

118. 患儿，女性，7岁，根尖周脓肿伴左下颌下淋巴结肿大。根尖周脓肿切开引流后好转。但下颌下区肿痛加重，局部皮肤发红并出现波动感。此下颌下区感染来源最大可能是
A. 牙源性
B. 腺源性
C. 创伤性
D. 血源性
E. 医源性
正确答案：A

119. 以下口腔黏膜病中通常不会出现上皮萎缩的是
A. 红斑病
B. 白斑病
C. 扁平苔藓
D. 口腔黏膜下纤维化
E. 以上都可以出现
正确答案：B

120. 在哪一种咬合类型下，发生牙尖折裂的概率最大
A. 前牙保护牙合
B. 尖牙保护牙合
C. 部分组牙功能牙合
D. 组牙功能牙合

E. 都一样
正确答案：B

121. 患者，女性，45 岁，右下颌磨牙区膨胀 1 年，X 线见不规则透射区并含大小不等的不透光区。镜下肿瘤由片状或岛状多边形上皮细胞组成，细胞间桥清晰。肿瘤细胞及细胞核有多形性，但核分裂罕见。肿瘤组织内见嗜酸性均质状物质，刚果红染色阳性。最可能的病理诊断是
A. 牙源性钙化囊肿 B. 成釉细胞瘤
C. 牙源性钙化上皮瘤 D. 牙源性角化囊肿 E. 牙源性鳞状细胞瘤
正确答案：C

122. 某患者前牙唇侧龈乳头增大表面呈颗粒结节样改变，该患者有癫痫病史，长期服用苯妥英钠。镜下观：纤维结缔组织增生，粗大的胶原束类似瘢痕组织结构，炎症不明显。该疾病可诊断为
A. 慢性龈炎 B. 慢性牙周炎 C. 龈增生
D. 浆细胞龈炎
E. 急性坏死性溃疡性龈炎
正确答案：C

123. 患者，女，12 岁，主诉：戴矫治器半年后，经常刷牙时牙龈出血。临床检查：前牙

唇侧牙龈充血肿胀明显，龈乳头呈球状突起。探易出血。最合适的诊断为
A. 单纯性龈炎 B. 慢性龈缘炎 C. 青春期龈炎
D. 急性坏死性溃疡性龈炎 E. 急性龈乳头炎
正确答案：C

124. 患者，女，10 岁，左上颌中切牙及侧切牙受外伤，未发现硬组织折断，叩(+)，松(一)，诊断为牙齿震荡。不合理的处置方法是
A. 消除咬合创伤
B. 减少或避免不良刺激 C. 服用抗菌药
D. 釉质若出现裂纹，可用复合树脂修复 E. 定期追踪复查
正确答案：D

125. 真核基因表达受多级调控。其中最普遍、最有效的是
A. 基因结构的活化
B. 转录起始的调节
C. 转录后的加工及转运翻译
E. 翻译后加工修饰
正确答案：B

126. 患者，男性，45 岁，因上吐下泻住某医院，每天静脉途径给庆大霉素 24 万 U，共 9 天。近 5 天来无尿，眼结膜水肿，腹水，下肢水肿。实验室检查：BUN42mmol/L。血清肌酐 L，血清钾 L。最好的治疗方法是

%碳酸氢钠溶液静注

%葡萄糖酸钙溶液静注

C. 离子交换树脂及山梨醇保留灌肠D. 大剂量呋塞米静注

E. 透析疗法
正确答案：E

127. 患者，女性，26岁，主诉：近半年来全口牙龈逐渐肿大，刷牙易出血，有自发性出血史

若诊断为妊娠期龈炎，临床检查最可能的发现是

A. 牙龈鲜红，表面呈分叶状，无疼痛B. 牙龈疼痛，出血，有恶臭

C. 牙龈出血及牙齿松动 D. 化脓，恶臭和牙龈疼痛
正确答案：A

128. 下列局部麻醉药中表面麻醉作用最强的是

%盐酸丁卡因

%盐酸可卡因布比卡因

盐酸达克罗宁

%利多卡因
正确答案：A

129. 灭菌的含义是指

A. 杀死物体上所有微生物的方法B. 杀死病原微生物的方法

C. 物体中无活菌存在

D. 抑制微生物生长繁殖的方法 E. 防止细菌进入人体的操作技术
正确答案：A

130. 下列关于颞下颌关节内强直的临床表现错误的是

A. 关节内强直主要症状是进行性开口困难或完全不能开口B. 单侧关节内强直，面部两侧不对称，颈部偏向健侧

C. 关节内强直侧，髁突活动减弱或消失

D. 下颌角前切迹明显凹陷，下颌角显著向下突出

E. 双侧关节内强直易出现小颌畸形面容，在幼儿易引起阻塞性睡眠呼吸暂停综合征
正确答案：B

131. 全口义齿初戴，义齿唇颊侧边缘应是A. 越厚越好，固位力强

B. 越薄越好，舒适轻巧C. 让开唇颊系带处

D. 半圆形略越过唇颊沟E. 圆形离开唇颊沟

正确答案：C

132. 患者，女性，29岁，因工作压力大，出现恐惧、紧张、忧虑、不安和心慌等症状，诊断为焦虑症。应首选

A. 巴比妥钠B. 吗啡

C. 水合氯醛D. 氯丙嗪 E. 地西洋

正确答案：E

133. 患者，男性，38 岁，右下颌角及升支处无痛性. 渐进性颌骨膨大 8 年，X 线见多囊性骨损害，有受累牙的根吸收。镜下见病变由孤立的上皮岛组成上皮岛的中心部细胞呈星形，排列疏松，其周边部围绕一层柱状细胞，核远离基底膜呈栅栏状排列。最可能的病理诊断是

A. 滤泡型成釉细胞瘤 B. 丛状型成釉细胞瘤

C. 牙源性腺样瘤

D. 牙源性钙化上皮瘤 E. 牙源性鳞状细胞瘤 正确答案：A

134. 两段式两次法种植术第 1 次和第 2 次手术间隔时间为个月
个月

~3 个月

~6 个月

~9 个月

正确答案：D

135. ~. 患者，女性，56 岁，右耳前发现核桃大小肿物近 1 年，有疼痛，渐进性长大史偶发疼痛，向耳颞部放射，触肿物扁平，质硬，动度差，与周围组织似有粘连，界限不十分清楚。最有可能的诊断是

~A. 腮腺混合瘤

B. 腮腺黏液表皮样癌 C. 腮腺区结核

D. 腮腺腺样囊性癌 E. 慢性阻塞性腮腺炎 正确答案：D

136. 婴幼儿急性化脓性颌骨骨髓炎常发生于 A. 出生后 1 周内

B. 出生后 2~3 周内 C. 出生后半个月内 D. 出生后 1 年内

E. 出生后 3 年内 正确答案：B

137. 黏液表皮样癌中黏液细胞不足 10%，肿瘤主要由中间细胞或表皮样细胞实质性团块组成。病理诊断应为

A. 高分化黏液表皮样癌 B. 中分化黏液表皮样癌 C. 低分化黏液表皮样癌 D. 黏液表皮样瘤

E. 中度恶性黏液表皮样癌 正确答案：C

138. 牙有自发性阵发性剧痛，间隔几小时，温度刺激，夜间疼痛加重，探有深龋，未穿髓，无叩痛（）

急性浆液性牙髓炎 急性化脓性牙髓炎 急性牙髓充血

慢性闭锁性牙髓炎 慢性溃疡性牙髓炎 正确答案：A

139. 牙有自发性阵发性剧痛，间隔几小时，温度刺激，夜间疼痛加重，探有深龋，未穿髓，无叩痛（）

急性浆液性牙髓炎 急性化脓性牙髓炎 急性牙髓充血

慢性闭锁性牙髓炎 慢性溃疡性牙髓炎 本题得分：1 分 正确答案：A

140. 可用于鉴别扁平苔藓和慢性盘状红斑狼疮的病理特点是A. 上皮表面过度角化，可发生糜烂或溃疡
B. 基底细胞发生液化变性，基底膜不清晰

C. 患者的自身循环抗体始终为阳性

D. 可见角质栓塞，血管周围有类纤维蛋白沉积E. 上皮下裂隙形成

正确答案：D

141. ART 充填效果，正确的是

A. 充填 3 年后，充填效果高于银汞合金B. 儿童与成年人修复效果有显著差异 C.

医生与护士操作修复效果有显著差异D. 牙合面充填保留率低于其他面

E. 单面洞的保留率低于复面洞
正确答案：D

142. 下列哪项不属于铸造金属全冠的适应证A. 后牙邻接关系不良

B. 固定义齿的固位体C. 后牙牙冠短小

D. 后牙牙本质过敏严重，伴牙体缺损

E. 后牙牙体严重缺损，无足够固位形与抗力形
正确答案：E

143. 患者，男性，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天伴全身发热。检查：体温℃，上唇肿胀明显，可见多个脓头。

此患者局部处理的正确方法为

A. 挤出脓头 B. 切开引流 C. 红外线理疗D. 药物湿敷 E. 局部热敷
正确答案：D

144. 表皮样/皮样囊肿在口内最好发于A. 颊

B. 舌 C. 口底D. 腭 E. 牙龈

正确答案：C

145. 关于口腔黏膜恶性黑色素瘤，以下哪项是错误的A. 较皮肤恶性黑色素瘤少见

B. 侵袭性强，破坏基底膜

C. 发病年龄较皮肤恶性黑色素瘤大D. 主要见于腭部和牙龈

可作为鉴别诊断的标记物
正确答案：B

146. 患者，男性，50 岁，左上中切牙有深楔状缺损。可探及露髓孔，探无感觉，X 线检查发现根尖有大面积阴影，在进行根管治疗时，有关开髓部位的选择哪一种说法是正确的A. 由于楔状缺损部位已经通髓腔，可从楔状缺损处制备进入髓腔的洞形

B. 由于切牙的舌面窝髓壁薄，可以从舌面窝向牙颈部方向钻入

C. 由于切牙的髓腔形态与切牙的外形基本一致，可以从切端开始向牙根方向钻入D. 只要能进入髓腔的任何一部位都可以

E. 以上都不是
正确答案：B

147. 颞下颌关节成形术后开口练习应于何时开始A. 一般术后 7-10 天

B. 一般术后 1 个月C. 一般术后半年 D. 一般术后 3 个月E. 即刻

正确答案：A

148. 常见的使牙龈增生的药物是A. 苯妥英钠
B. 硝苯地平C. 环孢素 D. 维拉帕米E. 以上全是

正确答案：E

149. 单颌固定不具备的优点是A. 可行使张闭口运动
B. 对进食. 语言功能影响较小C. 便于保持口腔卫生
D. 固定坚实可靠
E. 具有一定功能活动, 有利于改善局部血液循环
正确答案：D

150. ~患者右上第一磨牙严重龋坏。拔除后送检物为囊壁样组织, 镜下囊壁内衬复层扁平上皮, 厚薄不均, 有不规则上皮钉突形成: 囊壁内主要为淋巴细胞. 浆细胞, 也混有中性粒细胞浸润, 部分囊壁区域可见针形裂隙。上述描述为
~A. 慢性牙周炎B. 根尖周囊肿C. 牙槽脓肿
D. 根尖周肉芽肿 E. 慢性根尖周脓肿
正确答案：B

151. 下列哪一项不是牙根敏感的原因A. 牙龈退缩
B. 牙颈部牙骨质薄
C. 牙骨质中有神经分布D. 牙颈部缺乏牙骨质 E. 牙周刮治破坏牙骨质
正确答案：C

152. 上颌骨肿物, X 线见单囊性透射区, 界清。镜下见瘤细胞呈梭形或星状, 排列疏松, 并见少量散在的牙源性上皮。病理应诊断为
A. 牙源性纤维瘤B. 牙源性黏液瘤C. 牙源性腺样瘤D. 腺牙源性囊肿
E. 牙源性囊肿黏液化生
本题得分：1 分
正确答案：B

153. 医疗机构内被传染病病原体污染的场所. 物品A. 进行消毒处理
B. 立即进行卫生处理. 就近火化C. 进行卫生处理后按照规定深埋
D. 在疾病预防控制机构的指导下, 进行严格的消毒E. 须依法实施消毒和无害化处置
正确答案：E

154. 25 岁, 初孕妇。末次月经 2012 年 3 月 10 日。于 2012 年 10 月 13 日就诊, 检查宫底在脐上 2 横指, 枕右前位, 胎心率正常。现在应是
A. 妊娠满 30 周, 宫底高度符合正常情况
B. 妊娠满 30 周, 宫底高度低于正常
C. 妊娠满 31 周, 宫底高度符合正常情况
D. 妊娠满 31 周, 宫底高度低于正常
E. 妊娠满 32 周, 宫底高度低于正常
本题得分：1 分

正确答案：D

155. 下列哪一项不是牙龈瘤的临床表现
- A. 男性好发
 - B. 多见于唇颊侧的牙龈乳头
 - C. 一般累及单个牙
 - D. 肿块可有蒂如息肉状，也可无蒂
 - E. 长时间存在的肿块可发生牙槽骨的破坏
- 本题得分：1 分
正确答案：A

156. 患儿，男，8岁，额部多发性疖肿，不慎碰伤额部，致使局部红肿扩大，弛张性高热。4天后臀部皮下又发现一肿块，疼痛、压痛明显，且有波动感。诊断应考虑为
- A. 菌血症
 - B. 败血症
 - C. 毒血症
 - D. 脓毒血症
 - E. 冷脓肿
- 本题得分：1 分
正确答案：D

157. 下列疾患不会造成舌乳头萎缩的是
- A. 扁平苔藓
 - B. 地图舌
 - C. 盘状红斑狼疮
 - D. 口腔念珠菌感染
 - E. 维生素缺乏
- 本题得分：1 分
正确答案：D

158. 患者，男性，28岁，右颈上部淋巴结结核，下列何种药物对此患者治疗无效
- A. 青霉素
 - B. 链霉素
 - C. 利福平
 - D. 异烟肼
 - E. 乙胺丁醇
- 本题得分：1 分
正确答案：A

159. 上后牙 3/4 冠邻沟的方向
- A. 与颊面牙合 2/3 平行
 - B. 与颊面龈 1/3 平行
 - C. 与轴壁平行
 - D. 与舌侧壁平行
 - E. 与颊面验 1/3 平行
- 本题得分：1 分
正确答案：D

160. 牙周膜中上皮剩余的组织学来源于
- A. 口腔上皮
 - B. 牙板上皮
 - C. 造釉器上皮
 - D. 上皮根鞘
 - E. 缩余釉上皮
- 正确答案：D

161. 婴幼儿急性化脓性颌骨骨髓炎常发生于
- A. 出生后 1 周内
 - B. 出生后 2~3 周内
 - C. 出生后半个月内
 - D. 出生后 1 年内
 - E. 出生后 3 年内

正确答案：B

162. 突然发生大范围快速的龋蚀，很快发生牙髓感染，下颌乳前牙也受到龋蚀的

侵及的是A. 奶瓶龋
B. 少年龋 C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋
正确答案：C

163. 主要发生于上颌乳切牙唇面，且较快发展成广泛性龋，少见于下颌乳前牙A.
奶瓶龋
B. 少年龋 C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋
正确答案：A

164. B. 中 1/

165. 患者，女性，36岁，因口腔黏膜反复起水疱1年多就诊，起疱与进食无关，水疱可破溃形成溃疡。检查：下唇内侧黏膜有直径5mm的水疱，探针无法伸入水疱周围的黏膜下方，涂片未见Tzanck细胞。
该患者的诊断最可能是

A. 疱型扁平苔藓 B. 天疱疮
C. 黏液囊肿 D. 单纯疱疹 E. 类天疱疮 正确答案：E

166. 表现为髁突密质骨板下有较大的低密度影，周围有硬化边缘

A. 髁突硬化
B. 髁突前斜面模糊不清 C. 髁突骨质增生
D. 髁突小凹陷缺损 E. 髁突囊样变
正确答案：E

167. 一种与 I-III 感染密切相关的口腔病损：口腔黏膜的上皮钉突肥厚并伸长，棘层明显增生，表面为厚薄不均的不全角化，呈粗糙的皱褶或绒毛状，靠近表层1/3的棘细胞层常可见肿大的气球样细胞，可为单个或成簇状排列，细胞质浅染，一部分细胞空泡变性或在胞核周围呈现环状透明区。据此可诊断为
A. 口腔念珠菌病 B. 口腔毛状白斑 C. 口腔卡波西肉瘤 牙龈炎
牙周炎

正确答案：B

168. 临床上分腮腺为浅、深叶的依据是A. 颈外动脉穿经的平面
B. 下颌后静脉穿行的平面
C. 面神经主干及其分支的平面 D. 咬肌的前缘
E. 下颌支的后缘 正确答案：C

169. 下列哪项不是牙拔除术后并发症A. 拔牙术后出血

B. 拔牙术后感染 C. 面颊部肿胀反应D. 干槽症

E. 神经损伤
正确答案：E

170. 患者，男，因牙齿松动半年就诊。无全身疾病，未接受过牙科治疗，如诊断为广泛型侵袭性牙周炎，年龄通常在
岁左右岁以下岁以上岁以下。岁以下
正确答案：D

171. 白塞病又称为

A. 口干一眼干一关节炎综合征B. 贝赫切特综合征
C. 斯一约综合征D. 梅一罗综合征E. 哈钦森综合征
正确答案：B

172. 颌面外伤清创时只能清除的组织是A. 坏死组织
B. 污染组织 C. 不整齐组织D. 多余组织
E. 可能坏死的组织
正确答案：A

173. 釉牙本质界弧形的凹面A. 朝向牙本质
B. 与釉质生长线平行

C. 朝向釉质
D. 与施雷格板平行E. 与釉板长轴平行
正确答案：C

174. 在生理情况下牙骨质A. 只增生而不吸收
B. 受压侧增生
C. 只吸收而不增生D. 不断地改建
E. 不断地重塑
正确答案：A

175. 关节盘的分区不包括A. 后带
B. 前带 C. 中间带D. 侧带 E. 双板区
正确答案：D

176. 患者，男，20天，出生时萌出下颌中切牙两颗，III度松动，并影响患儿吮吸母乳。下面说法不正确的是

A. 乳牙早萌B. 新生儿牙
C. 拔除这两颗牙D. 改变喂养方式
E. 若引起创伤性溃疡，涂以甲紫
正确答案：B

177. 下列不是慢性龈缘炎自觉症状的是

A. 刷牙或咬硬物时牙龈出血B. 牙龈局部发痒
C. 牙龈经常出现自发性出血D. 牙龈肿胀感
E. 口腔异味
正确答案：C

178. 能抑制脂肪动员的激素是A. 肾上腺素
B. 胰岛素

D. 生长素
E. 胰高血糖素
正确答案：B

179. 某患者发生以颞下间隙为中心的多间隙感染，需建立贯通式引流，引流管可能通过的间隙为

~A. 颞深间隙. 颞下间隙. 翼下颌间隙. 下颌下间隙
B. 颞浅间隙. 颞下间隙. 翼下颌间隙. 下颌下间隙
C. 颞浅间隙. 颞下间隙. 咬肌间隙. 下颌下间隙
D. 颞浅间隙. 颞下间隙. 咬肌间隙. 下颌下间隙
E. 颞深间隙. 颊间隙. 翼下颌间隙. 下颌下间隙
正确答案：A

180. 以下哪一项检查不适合腮腺肿瘤超

B. 造影
C. 穿刺检查
E. 切取组织活检
正确答案：E

181. 最适合用于口腔内及面颈部植皮的皮片是A. 刃厚皮片

B. 中厚皮片
C. 带脂肪的全厚皮片
D. 全厚皮片
E. 以上均可
正确答案：B

182. 因开胸手术. 洋地黄中毒或心肌梗死导致的室性心律失常，可选用A. 利多卡因

B. 奎尼丁 C. 普萘洛尔
D. 维拉帕米
E. 腺苷
正确答案：A

183. 患者，女性，56岁，右耳前发现核桃大小肿物近1年，有疼痛，渐进性长大史偶发疼痛，向耳颞部放射，触肿物扁平，质硬，动度差，与周围组织似有粘连，界限不十分清楚。最有可能的诊断是

~A. 腮腺混合瘤
B. 腮腺黏液表皮样癌
C. 腮腺区结核
D. 腮腺腺样囊性癌
E. 慢性阻塞性腮腺炎
正确答案：D

184. 患儿，男，6岁，双侧腮腺反复肿大2年，临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。关于儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现，下列说法错误的是

A. 多数主导管无改变
B. 副腺体末梢导管扩张
C. 临床痊愈后仍可有末梢导管扩张
D. 主导管可有扩张
E. 病变可累及下颌下腺
正确答案：E

185. 颞下颌关节的组成部分，不包括A. 髁突

- B. 颞骨关节面C. 关节囊
D. 喙突
E. 关节韧带
正确答案：D

186. II度根分歧病变最适宜采取的术式是A. 翻瓣术
B. 牙龈切除术C. 牙冠延长术
D. 引导组织再生术E. 结缔组织移植术
正确答案：D

187. 患儿，3岁半，因牙列不齐前来就诊，这一年龄阶段正常牙合的特征有
A. 牙排列紧密无间隙，切缘，拾面有显著磨耗
B. 牙排列紧密无间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
C. 牙排列不紧密前牙有间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
D. 牙排列不紧密，前牙有间隙，下颌第二乳磨牙移至上颌第二乳磨牙的牙前方E.
牙排列由紧密到牙间隙逐渐形成
正确答案：B

188. 嵌体修复乳牙窝洞的优点，不正确的是A. 很好地恢复牙的解剖形态
B. 牙体制备时去除的牙质较充填法少C. 修复体保持率高
D. 恢复理想的牙间接触点E. 修复后继发龋少
正确答案：B

189. 氟化物涂布牙齿在不同年龄涂布重点不同，正确的是岁时氟化物应用有效抑制下颌乳前牙龋
岁左右儿童涂布药物对乳磨牙有保护作用岁儿童涂布药物增强第一恒磨牙抗酸性
岁时涂布药物对控制上颌乳前牙有积极作用岁儿童涂布药物增强第二恒磨牙抗酸性
正确答案：B

190. 患者，男性，22岁，因刷牙出血，牙齿松动半年就诊。无全身疾病。牙周龈上、龈下洁治后，临床检查见左下颌第一磨牙颊侧中央仍有7mm深牙周袋，探诊出血。
如右下后牙咬合不适半个月。检查：探针可进入6根分叉区，且探诊后出血。诊断为根分叉病变。该病变程度的判断，主要依据是
A. 牙松动度B. 叩诊
C. 探诊和X线片
D. 扪诊E. 视诊
正确答案：C

191. 凡有创伤史者。遇有下列情况均应疑有腹内脏器损伤，除外A. 伤后有明显腹膜刺激征
B. 伤后早期出现休克征象征

- D. 有气腹表现
- E. 腹部出现移动性浊音

正确答案：D

192. 新生儿溶血病如需要换血疗法的
- A. 由患儿家属申请并签字同意
 - B. 由经治医师申请并经患儿家属签字同意
 - C. 由经治医师申请并经主治医师批准
 - D. 由主治医师申请并经患儿监护人同意
 - E. 由主治医师申请并经患儿家属签字同意
- 正确答案：B

193. 小儿生长发育最迅速的时期是
- A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 学龄期
 - E. 青春期
- 正确答案：A

194. 关于牙周炎预后的影响因素。下列哪项不正确
- A. 牙齿松动情况
 - B. 牙槽骨吸收程度
 - C. 牙周炎类型
 - D. 牙龈退缩程度
 - E. 患者依从性
- 正确答案：D

195. 骨折线从梨状孔下方. 牙槽突上方两侧水平延伸至上颌翼突逢型骨折
- II型骨折
 - III型骨折
 - D. 牙槽突骨折

E. 纵形骨折 正确答案：A

196. 一个 3 岁的男孩，在常规检查口腔情况时，发现所有乳牙均已萌出，并且已建立咬合关系，临床检查发现下列 4 种情况，哪一种是不符合这一年龄段牙合关系的特点
- A. 切缘和牙合面没有明显的磨耗
 - B. 牙齿排列较紧密
 - C. 上下颌的乳磨牙有裕接触
 - D. 下颌第二乳磨牙在上颌第二乳磨牙的近中达一个牙尖
 - E. 下颌第二乳磨牙与上颌第二乳磨牙的远中面平齐
- 正确答案：D

197. 乳牙龋病充填后疼痛的因素可能性不大的是
- A. 制备洞形时机械切削. 振动. 压力. 温度等刺激牙髓
 - B. 意外穿髓未发觉
 - C. 龋蚀穿髓未及时处理
 - D. 牙髓已坏死
 - E. 充填体过高
- 正确答案：C

198. 下列哪个临床症状最符合腺样囊性癌
- A. 肿瘤易沿神经扩散，常具有疼痛，面瘫等神经症状
 - B. 男女比例约为 6:1
 - C. 有消长史
 - D. 与吸烟明显相关
 - E. 表面光滑，边界清楚
- 正确答案：A

199.)对本行政区域内的甲类传染病疫区，省级人民政府可
A. 实施隔离措施
B. 停工. 停业. 停课

C. 宣布为疫区
D. 实施封锁

E. 出入疫区的人员. 物资和交通工具实施卫生检疫
正确答案： D

200. 一个 7 岁的女孩，口内检查发现下颌后部牙槽骨上有两个形态似磨牙的牙齿存在。为鉴别是否有恒磨牙，下列哪种说法是正确的

A. 恒牙的牙颈嵴突出，与牙根分界清楚
B. 恒牙牙冠颜色偏白

C. 下颌第二乳磨牙的近中颊尖. 远中颊尖及远中尖的大小基本相等
D. 下颌第一恒磨牙的外形呈斜方形

E. 以上都不是
正确答案： C

201. 下列关于G 蛋白的叙述，错误的是与 α β γ 三聚体结合是没有活性的形式
B.

由 α . β . γ 三种亚基组成

C. α 亚基可催化GTP 水解为 GDP

D. α β GTP 为活性形式

E. 位于线粒体内膜
正确答案： E

202. 已妨碍进食的体积较大的妊娠期龈瘤的手术切除可选在
A. 妊娠期的 1-3 个月

B. 妊娠期的 4-6 个月

C. 临近分娩时

D. 妊娠期的 7-9 个月

E. 以上都不对
正确答案： B

203. 临床上涎石病最常见于

A. 腮腺导管

B. 下颌下腺腺体
C. 下颌下腺导管

D. 腮腺腺体与导管交界处

E. 下颌下腺腺体与导管交界处
正确答案： E

204. 局部麻醉术后麻木症状仍未恢复的可能原因是
A. 注射区有血肿

B. 注射区有感染

C. 注射区有神经损伤
D. 注射针折断

E. 注射区有水肿
正确答案： C

205. 下列哪项不是中央型颌骨骨髓炎的临床表现
A. 感染来源以下颌智齿冠周炎为主

B. 病变多在颌骨体

C. 骨髓炎累及的牙多数松动
D. 临床表现以弥漫型较多

E. 病变可累及松质骨与密质骨
正确答案： A

206. 倾斜基牙固定桥取得共同就位道的方法. 错误的是
A. 正畸

B. 备牙

- C. 改变固位体设计D. 双套冠
E. 拔除倾斜牙正确答案: E

207. 哪一神经分布于上颌切牙、侧切牙和尖牙的腭侧牙龈及黏骨膜A. 上牙槽前神经
B. 上牙槽中神经C. 上牙槽后神经D. 鼻腭神经
E. 腭前神经正确答案: D

208. 一患者髁突区开放性骨折, X 线片提示髁突粉碎性骨折, 应选择哪种治疗措施
A. 切开复位内固定
B. 颌间结扎+颅颌固定C. 颌间结扎固定
D. 髁突摘除术
E. 弹性绷带颅颌固定正确答案: D

209. 患者, 女性, 67 岁, 右腮腺肿块 4 年, 逐渐增大, 近半年来生长加快。镜下观察可见典型的多形性腺瘤结构, 瘤细胞伴有明显的异型性并呈浸润性生长, 部分区域见坏死。最可能的诊断是
A. 腺样囊性癌 B. 黏液表皮样癌
C. 恶性多形性腺瘤
D. 低度恶性多形性腺癌E. 唾液腺导管癌
正确答案: C

210. 可进一步分化为成牙本质细胞的结构是A. 牙囊
B. 成釉器C. 牙板 D. 牙乳头
E. 前庭板
正确答案: D

211. 牙体脱钙切片下不能观察到的是A. 继发性牙本质
B. 髓周牙本质C. 骨样牙本质D. 前期牙本质E. 球间牙本质正确答案: E

212. 舌神经与下颌下腺导管的关系是
A. 导管由舌神经外上绕至其内侧, 向舌侧行进B. 两者的交叉部位多位于舌骨舌肌后缘附近 C. 导管由舌神经内下绕至其外侧, 向舌侧行进D. 舌神经由导管外上绕至其内侧, 向舌侧行进E. 舌神经由导管内 F 至其外侧, 向舌侧行进正确答案: D

213. 患者全身多处虹膜样皮损, 伴发热头痛等全身症状, 口腔黏膜可见充血性红斑, 继而形成水疱, 渗出, 糜烂, 溃疡等多形变化。镜检为上皮细胞内和细胞间水肿, 上皮下疱形成。结缔组织水肿, 炎性浸润。病理诊断为
A. 红斑
B. 多形渗出性红斑 C. 慢性盘状红斑狼疮D. 天疱疮
E. 扁平苔藓正确答案: B

214. 女, 56 岁, 近 1-2 年来自觉口内多个牙松动, 咬合无力, 检查: 66 缺失,

75457 松动Ⅱ度。X线片示全口牙槽骨水平型骨吸收达根长 $1/3\sim 1/2$ 。

该患者初步诊断为 A. 青少年后期牙周炎 B. 慢性牙周炎
C. 侵袭性牙周炎
D. 快速进展型牙周炎 E. 成人牙周炎

正确答案：B

215. 临床表现出现张口受限的间隙感染不包括 A. 颞间隙感染
B. 颞下间隙感染 C. 咬肌间隙感染 D. 翼下颌间隙感染 E. 颊间隙感染
正确答案：E

216. 3个月龄婴儿的头围约是

正确答案：B

217. 拔除下颌阻生第三磨牙的意义不包括 A. 预防下颌第二磨牙牙周破坏
B. 预防阻生牙本身及邻牙远中面龋病 C. 预防冠周炎
D. 预防邻牙牙根吸收 E. 治疗牙列拥挤

正确答案：E

218. 用下列哪种消毒剂浸泡的器械使用前需用灭菌蒸馏水冲洗 A. 戊二醛
B. 乙醇 C. 碘伏
D. 甲醛溶液 E. 含氯消毒剂 正确答案：D

219. 目前关节强直的病因一般不包括 A. 火器伤
B. 骨折 C. III度烧伤
D. 肿瘤放疗后 E. 关节肿瘤 正确答案：E

220. 对于无复发史而又长期不愈的边缘呈潜掘状的浅表溃疡，应考虑 A. 创伤性溃疡

C. 恶性肿瘤
E. 深部真菌感染 B. 口腔结核
D. 梅毒

正确答案：B

221. 碳酸锂主要用于治疗A. 躁狂症
B. 精神分裂症C. 抑郁症
D. 焦虑症E. 失眠
正确答案：A

222. 牙列缺损会引起的不良影响是A. 咀嚼功能减退
B. 发音功能障碍C. 美观差
D. 颞下颌关节紊乱病E. 以上均是
正确答案：E

223. 以下不属于口腔白色角化病好发部位的是A. 颊
B. 硬腭C. 唇红D. 口底E. 舌背
正确答案：D

224. 患者的基本医疗权不包括
A. 应该得到基本医疗保健服务的权利B. 生病后得到及时医疗的权利
C. 平等享受医疗服务的权利
D. 能够选择自己应该得到何种医疗的权利
E. 医疗保健不受民族、性别、财产状况影响的权利
正确答案：D

225. 哪一神经分布于上颌切牙、侧切牙和尖牙的腭侧牙龈及黏骨膜A. 上牙槽前神经
B. 上牙槽中神经C. 上牙槽后神经D. 鼻腭神经
E. 腭前神经
正确答案：D

226. 患者，男性，26岁，颈部肿物数年，可活动无明显症状。镜检见囊肿内含物呈浓稠黏液样，囊肿内衬复层扁平上皮，部分区域似复层柱状上皮，纤维囊壁内见大量淋巴样组织。最可能的病理诊断是
A. 甲状舌管囊肿B. 鳃裂囊肿
C. 黏液囊肿 D. 皮样囊肿 E. 表皮样囊肿
正确答案：B

227. 患者，女性，60岁。口腔干燥、无泪、双眼异物感1年余。两侧腮腺区有反复肿胀史，检查发现：唇黏膜发红，舌表面光滑潮红呈“镜面舌”。口内大多数牙有龋坏，两侧腮腺弥漫性肿大。无压痛。挤压腺体导管口唾液溢出很少。为明确诊断而应做的辅助检查不包括

A. 施墨试验
B. 四碘四氯荧光素染色C. 腮腺造影
D. 血脂检测E. 唇腺活检
正确答案：D

228. 对建立正常的咬合关系起重要作用，应尽量保留，避免拔除的牙是A. 尖牙
B. 第一前磨牙C. 第二前磨牙D. 第一磨牙 E. 第二磨牙 正确答案：D

229. 患者，女性，60岁，舌痛1年就诊。检查：舌质红，舌背光滑，舌乳头萎缩。血常规检查：红细胞计数、血红蛋白量以及血细胞比容均低于正常值，MCV及MCHC均高于正常值

治疗该病需补充 A. 维生素 B12. 叶酸B. 硫酸亚铁
C. 维生素C D. 锌
E. 维生素A
正确答案：A

230. 慢性龈缘炎的主要累及病变区是

A. 前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，也可波及全口牙的牙龈B. 前牙区的唇侧牙龈
C. 可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区为重D. 单个的牙间乳头
E. 全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙区 正确答案：A

231. 唇裂的治疗是A. 以手术治疗为主

法和Tennison 法各有优缺点C. 往往需要二期修复鼻、唇畸形D. 多学科序列治疗
E. 以上都是 正确答案：E

232. 以下哪项不是流行性腮腺炎的特点A. 常双侧同时或先后发病

B. 腮腺肿痛、分泌物浑浊C. 可终身免疫

D. 有传染性E. 儿童多发 正确答案：B

233. 医师在执业活动中，按执业规则可以A. 发现患者非正常死亡时，向有关部门报告
B. 经医院批准后，进行实验性临床医疗

C. 使用祖传的特效药为患者治疗

D. 在医院的的服务范围内出具医学证明文件

E. 发现传染病疫情时按规定向当地人民政府报告 正确答案：A

234. 女性，45岁。血性白带2个月，妇检阴道未受肿瘤侵犯，宫颈菜花样，宫体正常大小，宫旁明显增厚，未达盆腔，宫颈活检为鳞癌。其分期是
期期

C. IIa 期

D. IIb 期

E. IIIa 期

正确答案：D

235. 根尖片长焦距平行投照技术的优点是A. 不需附加其他特殊设备，操作简便

线中心线平行于牙长轴，避免影像失真线中心线垂直于牙长轴，避免影像失真

线中心线平行于牙长轴与胶片的分角线，避免影像失真线中心线垂直于牙长轴与

胶片的分角线，避免影像失真 正确答案：C

236.)慢性龈缘炎

- A. 前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，也可波及全口牙的牙龈
 - B. 前牙区的唇侧牙龈
 - C. 可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区为重
 - D. 单个的牙间乳头
 - E. 全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙区
- 正确答案：A

237. 腮腺区肿物术前不宜进行的检查是或 MRI

- B. 细针吸取细胞学检查
- C. 唾液腺造影
- D. 切取活检术

正确答案：D

238. 慢性再生障碍性贫血经治疗已缓解且血红蛋白含量高于多少时可拔牙d1

d

239. 倾斜基牙固定桥取得共同就位道的方法. 错误的是A. 正畸

- B. 备牙
 - C. 改变固位体设计
 - D. 双套冠
 - E. 拔除倾斜牙
- 正确答案：E

240. 磨除基牙牙体组织最少的固定桥是A. 双端固定桥

- B. 单端固定桥
 - C. 半固定桥
 - D. 黏结固定桥
 - E. 固定一可摘联合桥
- 正确答案：D

241. 心理应激概念的核心概念强调A. 心理反应

- B. 生理反应
 - C. 生理刺激物
 - D. 心理刺激物
 - E. 适应和应对“过程”
- 正确答案：E

242. 哪项不是固定桥修复后引起龈炎的原因A. 食物嵌塞

- B. 桥体轴面外形不良
 - C. 牙合力过大
 - D. 多余的黏固剂
 - E. 光洁度差，边缘粗糙
- 正确答案：C

243. 口腔种植学的指导理论是A. 骨结合理论

- B. 纤维结合理论
 - C. 微创理论
 - D. 骨牵张理论
 - E. 骨粘连理论
- 正确答案：A

244. 使用桩核冠修复比使用普通桩冠修复的优点，除了A. 易取得固定桥共同就位

道

B. 固位体边缘密合好

C. 固定桥损坏后易修改D. 固定桥的固位好

E. 牙根应力分布较好 正确答案：E

245. 外伤性牙折伴牙周膜撕裂伤时若要行桩冠修复，根管治疗后应至少观察天
天 周 周 个月

正确答案：C

246. 慢性增生性牙髓炎的叙述，错误的是A. 表面为炎性渗出物和坏死组织

B. 深部为新生的毛细血管. 成纤维细胞

C. 慢性炎症性的牙龈组织过度增生，又称牙髓息肉D. 表面可覆盖上皮

E. 多见于老年 正确答案：E

247. 舌体主要起源于A. 第 2 对鳃弓

B. 第 3 对鳃弓

C. 第 4 对鳃弓D. 第对鳃弓 E. 第对鳃弓 正确答案：D

248. 腮腺床的结构不包括A. 颈内动脉

B. 颈内静脉C. 颈外动脉D. 迷走神经E. 舌咽神经 正确答案：C

249. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制效应是降低， K_m 降低

降低， K_m 不变不变， K_m 增加不变， K_m 降低降低， K_m 增加 正确答案：C

250. 患者，男性，28 岁，疣状新生物 20 天。曾有两个性伴侣，无保护性接触。
查体：包皮. 包皮系带. 冠状沟处直径约 2-3mm 大小丘疹，呈乳头状，触之易出血。

活检：表皮角化不全，棘层增生肥厚，棘层上部细胞胞体较大，胞质淡染，中央有大而圆深染的核，细胞无异形性及排列紊乱。

本例最可能的诊断是A. 阴茎珍珠状丘疹 B. 尖锐湿疣

C. 扁平湿疣

D. 生殖器鳞状细胞癌 E. 生殖器鲍温样丘疹病 正确答案：B

251. 人们对医疗行为进行道德价值判断是通过A. 医德活动

B. 医德教育C. 医德修养D. 医德评价

E. 医德境界 正确答案：D

252. 月经周期为 28 天型有排卵的妇女，于月经周期第 11 天刮宫，镜检子宫内膜应为

A. 增生期中期B. 增生期晚期C. 分泌期早期D. 分泌期中期E. 分泌期晚期 正确答案：B

253. 下列关于白血病的牙龈病损的临床表现，描述正确的是A. 牙龈肿胀

B. 牙龈有明显的出血倾向

- C. 严重时出现口腔黏膜的坏死或牙痛
D. 有时伴有发热. 局部淋巴结肿大
E. 以上都是正确答案: E

254. 患儿, 女, 出生 10 天, 下颌前牙区牙龈肿物。镜下见细胞呈片块状, 排列紧密, 细胞体大, 细胞质丰富, 含嗜酸性颗粒, 核呈圆形, 大小一致。病理诊断应为

- A. 颗粒细胞瘤
B. 颗粒细胞肌母细胞瘤
C. 先天性畸胎瘤
D. 先天性牙龈瘤
E. 婴儿龈囊肿 正确答案: D

255. 者, 男性, 62 岁。自觉牙龈出血. 牙齿松动半年余。检查: CI-S: 3, 多个牙松动度在

I-II 度之间, 牙龈红肿。探易出血, 牙周袋深 3-5mm。

如该患者口腔内有种植体修复, 则种植牙定期洁治的间隔时间最好为

个月个月个月个月个月

正确答案: E

256. 最容易发生囊肿的唾液腺是A. 唇腺

B. 腮腺 C. 舌下腺

D. 下颌下腺E. 腭腺

正确答案: C

257. 唇裂修复术对患儿的白细胞计数的要求是A. 小于 $20 \times 10^9/L$

B. 小于 $15 \times 10^9/L$

C. 小于 $10 \times 10^9/L$

D. 小于 $5 \times 10^9/L$

E. 无要求

正确答案: C

258. 急性腮腺脓肿可发生面瘫的原因是A. 炎症的破坏

B. 面神经炎 C. 炎症的浸润

D. 高热使面神经失去功能E. 肿胀压迫

正确答案: E

259. 一患者被人用刀划伤面部软组织, 耳前区皮肤有长约 6cm 的纵形创口. 创缘整齐, 有活动出血。

应采取的处理措施是

A. 清创止血, 检查是否合并重要的结构损伤, 并用无菌敷料覆盖
B. 局部冷敷加压包扎

C. 尽早行清创缝合术
D. 创面用油纱布覆盖

E. 暴露创口全身用抗生素 正确答案: C

260. 托姆斯颗粒层位于A. 牙本质小管周围
B. 釉牙本质界内侧
C. 牙本质钙质小球之间
D. 根部牙本质透明层的内侧E. 冠部牙本质透明层的内侧
正确答案：D

261. 关于坏死性唾液腺化生特征的描述错误的是A. 假上皮瘤样增生
B. 形成黏液池 C. 腺小叶坏死 D. 火山口样溃疡E. 骨坏死
正确答案：E

262. 额颞部软组织出血的止血方法是A. 压迫面动脉
B. 压迫颞浅动脉C. 压迫耳后动脉D. 压迫上颌动脉
E. 压迫颞深动脉
正确答案：B

263. 下唇及周围皮肤灼痛瘙痒，局部出现丛集成簇的透明水疱，破溃后干瘪结痂，应诊断为
A. 疱疹性龈口炎B. 唇疱疹
C. 手-足-口病D. 鹅口疮
E. 复发性口疮
正确答案：B

264. 环甲膜切开术后插管时间最长为小时
小时小时小时小时
正确答案：E

265. 临床行后牙牙髓治疗时。应注意哪个牙的近中根 95%含有双根管A. 上颌第二前磨牙
B. 上颌第一前磨牙C. 下颌中切牙
D. 下颌第一磨牙E. 下颌第二磨牙
正确答案：D

266. 在菌斑成熟过程中。首先吸附到牙面的是A. 唾液链球菌
B. 变形链球菌
C. 革兰阳性球菌 D. 革兰阴性杆菌 E. 革兰阴性厌氧菌
正确答案：C

267. X 线头颅定位片描绘图中表现上颌对颅底的位置关系是角度
角度角度角度角度
正确答案：A

268. 根尖片长焦距平行投照技术的优点是A. 不需附加其他特殊设备，操作简便
线中心线平行于牙长轴，避免影像失真线中心线垂直于牙长轴，避免影像失真
线中心线平行于牙长轴与胶片的分角线，避免影像失真线中心线垂直于牙长轴与胶片的分角线，避免影像失真
正确答案：C

269. 早期妊娠诊断，错误的是A. 阴道壁和子宫颈呈紫蓝色
B. 黑加征阳性
C. 子宫增大变软呈球形D. 检测尿 HCG 阳性
E. 黄体酮试验阳性正确答案：E

270. 中腭突未能在一侧或两侧与侧腭突融合，则形成的畸形是A. 腭裂
B. 牙槽突裂C. 面斜裂 D. 面横裂
E. 上唇正中裂正确答案：A

271. 患者，男性，42岁，发现腭部包块半年，伴有明显疼痛。肉眼观察肿物与周围组织无明显界限。镜下见瘤细胞包括腔上皮细胞和肌上皮细胞，结构上以瘤细胞排列成筛状结构为主。此外肿瘤细胞可构成管状、实性小条索或团块，并可见瘤细胞小条索浸润神经。上述所见最符合的诊断是
A. 肌上皮癌 B. 腺样囊性癌
C. 多形性低度恶性腺癌D. 恶性混合瘤
E. 上皮肌上皮癌正确答案：B

272. 患者，男性，34岁，左上第三磨牙阻生颊侧移位，要求拔除。行上牙槽后神经阻滞麻醉后左面颊部立即肿胀。发生上述情况时，处理不正确的是
A. 立即冰敷 B. 立即热敷 C. 加压包扎 D. 应用止血药E. 应用抗生素正确答案：B

273. ANUG 好发于哪个年龄段
A. 婴幼儿B. 儿童 C. 青壮年
D. 老年 E. 中老年
正确答案：C

274. 关于急性龈乳头炎的临床表现，哪一项不正确A. 病变局限于个别牙间乳头
B. 牙间乳头发红肿胀
C. 有自发的胀痛和明显的探触痛D. 牙间乳头易出血
线片检查见牙槽骨吸收正确答案：E

275. 口腔扁平苔藓与白斑组织病理学表现的区别不包括A. 颗粒细胞、棘细胞层厚度
B. 角化层厚度
C. 基底细胞液化变性 D. 上皮细胞内水疱形成
E. 炎细胞浸润部位、分布及组成正确答案：D

276. 属于乙类传染病的疾病是A. 麻疹
B. 流行性腮腺炎C. 风疹
D. 急性出血性结膜炎E. 麻风病
正确答案：A

277. 牙本质受到损伤刺激时，牙本质小管内的成牙本质细胞突变性，矿物盐沉积而封闭牙本质小管，这样的牙本质为

A. 前期牙本质

B. 继发牙本质 C. 球间牙本质 D. 透明牙本质 E. 髓周牙本质 正确答案：D

278. 妊娠期龈炎的主要累及病变区是

A. 前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，也可波及全口牙的牙龈 B. 前牙区的唇侧牙龈

C. 可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区为重 D. 单个的牙间乳头

E. 全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙区 正确答案：C

279. 患者，男性，37岁，面部、臀部等皮肤出现青铜色2个月，患者有大量输血史。查体：口腔黏膜可见蓝灰色的色素斑沉着；血生化示血糖L，血清铁含量增高，且肝功能出现异常，该病最可能是

A. 胆红素沉着症 B. 血色素沉着症 C. 药物色素沉着 D. 重金属中毒 E. 黄疸性肝炎 正确答案：B

280. 白塞病又称为

A. 口干一眼干一关节炎综合征 B. 贝赫切特综合征

C. 斯一约综合征 D. 梅一罗综合征 E. 哈钦森综合征 正确答案：B

281. 干热灭菌法消毒时温度和时间是

℃持续 120 分钟

℃持续 120 分钟

℃持续 120 分钟

℃持续 120 分钟

℃持续 90 分钟 正确答案：A

282. 执业医师法适用于 A. 保健机构中的医务人员 B. 医疗机构中工作的人员 C. 乡村医生

D. 计划生育技术服务机构的医师 E. 疾病预防控制机构的医生

正确答案：D

283. 每 100kcal 热量的混合膳食产生的内生水是

正确答案：C

284. 我国颁布的“母婴保健法”规定在新生儿期进行筛查的遗传代谢内分泌疾病是
A. 三体综合征，苯丙酮尿症

B. 先天性甲状腺功能减低症，苯丙酮尿症 C. 先天性甲状腺功能减低症，21-三体综合征
D. 先天性甲状腺功能减低症，半乳糖血症 三体综合征，半乳糖血症

正确答案：B

285. 患者，女性，20岁，上切牙远中移位，间隙增宽，影响美观，求治。检查：上前牙牙周袋深5mm，第一恒磨牙松动Ⅱ度，牙周袋深6mm。X线片显示：上前牙区牙槽骨水平吸收，第一磨牙牙槽骨弧形吸收。诊断为

- A. 青少年后期牙周炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 侵袭性牙周炎
- D. 快速进展型牙周炎
- E. 成人牙周炎

正确答案：C

286. 为了达到目的和手段的一致，必须遵循的原则不包括

- A. 优化原则
- B. 有效性原则
- C. 一致性原则
- D. 社会性原则
- E. 医学原则

正确答案：E

287. 患者，男性，65岁，X线片显示颞下颌关节盘穿孔，骨质破坏。吸收，关节盘不可复前移位。

其临床症状一般不伴有

- A. 关节痛
- B. 张口受限
- C. 开口度过大
- D. 咀嚼痛
- E. 弹响

正确答案：C

288. 患者，男性，40岁，在试戴金属冠时，反映戴上右侧后牙冠时，咬合时下颌有偏移，去除冠后无上述情况发生。临床检查发现：右侧上颌第一磨牙金属冠的颊尖舌斜面有

咬合滑走印迹。导致患者下颌在咬合发生偏移的主要原因是

- A. 患者对冠不适应，使用一段时间，偏移会消失
- B. 冠的颊尖舌斜面上有早接触，从而导致下颌偏移
- C. 患者精神紧张，是一种下意识的动作
- D. 由于冠还处于试戴期，没有磨光和黏固，经磨光和黏固后，下颌偏移能消失
- E. 以上都不是

本题得分：1分 正确答案：B

289. 滤泡囊肿是A. 含牙囊肿
B. 黏液囊肿
C. 牙源性钙化囊肿D. 婴儿龈囊肿
E. 牙旁囊肿
正确答案：A

290. 一患者因车祸伤及颅面部，有一过性昏迷病史。急诊检查发现面中份凹陷，眶周瘀血，咬合错乱，后牙早接触，前牙开牙合。出现呼吸困难时，紧急处理是

- A. 手法复位，用压舌板等吊起下移的上颌骨
B. 颌间栓结
C. 颌间栓结+颅颌固定
D. 手术切开复位. 固定
E. 气管切开
正确答案：A

291. II度根分歧病变最适宜采取的术式是A. 翻瓣术
B. 牙龈切除术
C. 牙冠延长术
D. 引导组织再生术
E. 结缔组织移植术
正确答案：D

292. 好发于小唾液腺和大唾液腺中较小的腺体的肿瘤是A. 腺样囊性癌
B. 黏液表皮样癌
C. 多形性低度恶性腺癌
D. 腺泡细胞癌
E. 沃辛瘤
正确答案：A

293. 腺苷脱氨酶缺乏症是由于腺苷脱氨酶的A. 基因缺陷引起
B. 表达受阻
C. 活性被抑制引起
D. 变性引起
E. 化学修饰引起
正确答案：A

294. 下列哪一项不是牙龈增生的原因A. 感染
B. 内分泌失调
C. 药物性
D. 创伤性
E. 特发性
正确答案：D

295. 匙形刮治器的真 3Z-v 作端是刃部
A. 上 1/

296. 0. 牙龈瘤的诊断哪一项不正确

- A. 常发生于中. 青年人
B. 多见于唇. 颊侧和舌. 腭侧的牙龈乳头
C. 可伴有牙槽骨吸收及牙周膜间隙增宽
D.

肿块呈圆球形或椭圆形，大小不一 E. 累及的牙齿可能松动或移位
正确答案：B

297. 缺陷两端各有一基牙，一侧为可动连接体，一侧为不动连接体的固定桥称为A.
双端固定桥
B. 种植体固定桥C. 半固定桥
D. 复合固定桥E. 黏结固定桥 正确答案：C

298. 无牙颌患者初诊可以暂时不过问的情况是A. 患者的主观要求
B. 患者以往的牙科治疗情况C. 患者的全身健康状况
D. 患者的性格E. 患者的职业 正确答案：E

299. 双侧上颌骨横断骨折或颅颌分离的骨折常用A. 单颌牙弓夹板固定
B. 切开复位，骨间固定 C. 带钩牙弓夹板颌间固定D. 黏片颌间固定
E. 颅颌固定 正确答案：E

300. 舌下腺囊肿的内容物的特点是A. 白色凝乳状物质
B. 灰白色角化物质 C. 无色透明黏稠液体D. 豆腐渣样物质
E. 淡黄色含胆固醇结晶液体 正确答案：C

301. 口腔念珠菌病通常不会发生于A. 长期使用免疫抑制剂
B. 长期使用广谱抗生素C. 患有慢性消耗性疾病D. 长期精神紧张
E. 白色念珠菌本身毒力增强 正确答案：D

302. C. 局部理疗D. 口服镇静剂
E. 不作特殊处理 正确答案：E

303. 颌面部损伤患者处理不及时会立即造成生命危险的主要原因是A. 感染
B. 出血C. 休克D. 窒息
E. 弥散性血管内凝血 正确答案：D

304. 患者，女性，39岁，诉左上颌后牙残冠求拔口腔检查：左上第一磨牙牙冠大面积龋损，已无法修复，牙周检查未见异常。X线片示：腭根有边界清楚的圆形阴影，似与上颌

窦无骨壁相隔。

拔除左上第一磨牙采用的麻醉方法是

- A. 上牙槽后神经阻滞麻醉
- B. 上牙槽后神经阻滞麻醉+左上第一磨牙近中根浸润麻醉C. 上牙槽后神经阻滞麻醉+腭前神经阻滞麻醉
- D. 上牙槽后神经阻滞麻醉+腭前神经阻滞麻醉+左上第一磨牙近中根浸润麻醉
- E. 上牙槽后神经阻滞麻醉+腭前神经阻滞麻醉+左上第一磨牙近中根浸润麻醉+鼻腭神经阻滞麻醉

正确答案：D

305. 腭大孔位于硬腭后缘前约正确答案：A

306. 关于原癌基因的叙述，下列哪项是正确的病毒特有的核苷酸序列
B. 病毒具有的核苷酸序列C. 不需要激活即能表达
D. 参与细胞增殖的关键基因E. 正常人类基因组中不存在正确答案：D

307. 临床表现出现张口受限的间隙感染不包括A. 颞间隙感染
B. 颞下间隙感染 C. 咬肌间隙感染 D. 翼下颌间隙感染E. 颊间隙感染
正确答案：E

308. 医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的

A. 由卫生行政部门给予处分，没收违法所得
B. 由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万元以下的罚款
C. 由卫生行政部门吊销其执业证书D. 依法追究刑事责任
E. 依法承担赔偿责任正确答案：B

309. 以下疾病通常不会表现为唇部糜烂的是A. 盘状红斑狼疮
B. 慢性唇炎 C. 多形性红斑
D. 增殖型天疱疮 E. 大疱性类天疱疮正确答案：E

310. 血管神经性水肿一般不发生在A. 唇
C. 上腭 E. 咽喉部B. 舌
D. 眼睑
正确答案：C

311. 面横裂是由于
A. 一侧上颌突未能与内侧鼻突融合B. 上颌突与外侧鼻突未融合
C. 上颌突与下颌突未融合
D. 原发腭突未能在两侧与继发腭突融合E. 原发腭突未能在两侧与继发腭突融合正
确答案：C

312. 胺碘酮的药理作用不包括A. 明显延长APD 和ERP
B. 降低窦房结的自律性C. 有翻转使用依赖性 D. 拮抗 α 受体
E. 扩张冠状动脉正确答案：C

313. 在心理治疗工作中，治疗对象有伤害他人的情况时，应该采取的措施是A. 治
疗，同时录像取证
B. 继续治疗，无其他措施C. 继续遵守保密原则

- D. 向有关部门报告
E. 治疗者加强自我保护，继续治疗 正确答案：D

314. 手术前患者最常见的情绪反应是A. 抑郁
B. 焦虑C. 愤怒D. 敌意E. 绝望
正确答案：B

315. 为了达到目的和手段的一致，必须遵循的原则不包括A. 优化原则
B. 有效性原则C. 一致性原则D. 社会性原则E. 医学原则 正确答案：E

316. 患者，男，20 天，出生时萌出下颌中切牙两颗，Ⅲ度松动，并影响患儿吮吸母乳。下面说法不正确的是
A. 乳牙早萌B. 新生儿牙
C. 拔除这两颗牙D. 改变喂养方式
E. 若引起创伤性溃疡，涂以甲紫 正确答案：B

317. 患者，女性，36 岁，因口腔黏膜反复起水疱 1 年多就诊，起疱与进食无关，水疱可破溃形成溃疡。检查：下唇内侧黏膜有直径 5mm 的水疱，探针无法伸入水疱周围的黏膜下方，涂片未见Tzanck 细胞。
该患者的诊断最可能是

- A. 疱型扁平苔藓B. 天疱疮
C. 黏液囊肿D. 单纯疱疹E. 类天疱疮 正确答案：E

318. 患者，男性，63 岁，颊癌术后 7 年，术后曾行颈部及下颌下区放疗，剂量不详。3 个月前行出现下颌牙龈溃疡，经久未愈且局部骨外露伴下颌区域针刺剧痛。
此患者可能的诊断为

- A. 下颌牙龈癌
B. 放射性颌骨坏死 C. 中央性颌骨骨髓炎D. 边缘性颌骨骨髓炎E. 原发性三叉神经痛
正确答案：B

319. 患者，女性，65 岁，口腔黏膜灼痛，难以忍受，夜间尤其剧烈，检查发现口腔内黏膜颜色、弹性、质地正常，口腔内也无明显龋坏。最可能的诊断是
A. 念珠菌性口炎B. 萎缩性舌炎 C. 坏死性龈口炎D. 灼口综合征 E. 以上都不是 正确答案：D

320. 患者，女性，28 岁，妊娠 5 个月。主诉近 3 个月来刷牙出血严重。关于妊娠期龈炎的治疗原则，说法不正确的是
A. 去除局部刺激因素是关键

- B. 妊娠 8 个月时，对于过度增生的牙龈可以行手术切除
C. 局部可应用 1%过氧化氢液冲洗D. 治疗完成后定期复查
E. 自我口腔卫生维护很重要正确答案：B

321. 妊娠胆汁淤积症的产生是由于胆汁从胆囊流出受阻，导致胆盐在体内堆积，初级胆汁酸与次级胆汁酸以钠盐或钾盐的形式存在即为胆盐。下列属于次级结合胆汁酸的是

- A. 牛磺胆酸 B. 鹅脱氧胆酸
c. 甘氨脱氧胆酸D. 石胆酸
E. 甘氨酸胆酸正确答案：C

322. 病变多见于女性，牙龈部位呈颗粒状肉芽状，镜下见结缔组织内浆细胞密集浸润，呈片状或灶性聚集，上皮多为完整。该疾病可能是

- A. 急性坏死溃疡性龈炎
B. 浆细胞龈炎
C. 牙龈浆细胞肉芽肿D. 剥脱性龈病损
E. 药物性龈炎正确答案：B

323. 前颅底平面与鼻根点至下牙槽座点连线之间的夹角A. 颅底一上牙槽座角

- B. 颅底一下牙槽座角C. 面角
D. 颌平面角 E. 上中切牙角正确答案：B

324. 患者，男性，38 岁，右下颌角及升支处无痛性. 渐进性颌骨膨大 8 年，X 线见多囊性骨损害，有受累牙的根吸收。镜下见病变由孤立的上皮岛组成上皮岛的中心部细胞呈星形，排列疏松，其周边部围绕一层柱状细胞，核远离基底膜呈栅栏状排列。最可能的病理诊断是

- A. 滤泡型成釉细胞瘤B. 丛状型成釉细胞瘤C. 牙源性腺样瘤
D. 牙源性钙化上皮瘤E. 牙源性鳞状细胞瘤正确答案：A

325. 患者，男性，26 岁，舌部溃疡 1 个月。患者近 2 个月来。低热. 乏力. 盗汗。检查：舌部右侧溃疡。较深，约¹/₂，边缘不齐，表面假膜。基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。该患者最可能患有的疾病为

- A. 创伤性溃疡B. 结核性溃疡C. 梅毒
D. 癌性溃疡
E. 深部真菌感染正确答案：B

326. 属于孕激素的生理作用是A. 使阴道上皮细胞脱落加快
B. 使宫颈黏液变稀薄C. 使子宫肌层增厚 D. 使子宫内膜增生
E. 使血循环中胆固醇水平降低正确答案：A

327. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系A. 胎方位

- B. 胎先露C. 骨盆轴D. 胎 势 E. 胎产式
正确答案：A

328. 很少引起AIDS 患者机会性感染的病原体是

- A. 巨细胞病毒 B. 卡氏肺孢子菌病毒
- D. 弓形虫
- E. 新型隐球菌 正确答案: C

329. 额外牙的萌出部位不正确的是A. 在颌骨的某些特定部位萌出

B. 萌出于口腔

C. 阻生于颌骨内D. 牙弓外

E. 鼻腔. 上颌窦内 正确答案: A

330. 骨上袋的慢性牙周脓肿最适宜采取的术式是A. 翻瓣术

B. 牙龈切除术C. 牙冠延长术

D. 引导组织再生术E. 结缔组织移植术 正确答案: B

331. 下列哪些细胞表达高亲和力的 FcRI A. 单核细胞. 巨噬细胞

B. 中性粒细胞. 肥大细胞

C. 中性粒细胞. 嗜碱性粒细胞D. 肥大细胞. 嗜碱性粒细胞

E. 嗜酸性粒细胞. 嗜碱性粒细胞 正确答案: D

332. 腺样囊性癌多见于哪个腺体A. 舌下腺

B. 下颌下腺C. 唇腺

D. 腭部小腺体E. 皮脂腺

正确答案: D

333. 颈外动脉的描述, 错误的是

A. 开始在颈内动脉前内侧, 继而转到前外侧

B. 来源于颈总动脉

C. 在颈部有一系列分支

D. 上行于腮腺的浅面, 形成终支(颞浅动脉)

E. 暂时阻断颈外动脉, 颞浅动脉和面动脉均无波动 正确答案: D

334. 患儿, 男, 8 岁, 活泼好动, 身体健康, 左颊黏膜颊脂垫处可见不规则溃疡, 溃疡面较深, 而疼痛不明显, 最可能的诊断是

A. 结核性溃疡B. 褥疮性溃疡C. 阿弗他溃疡D. 白塞病

E. 自伤性溃疡 正确答案: E

335. 患者, 男性, 32 岁, 右侧下颌下区进食时肿痛 1 个月, 口内右舌下腺触及黄豆大小之硬结, 对该患者应首先选择下列哪种检查

A. 曲面体层片

B. 右 F 颌下腺造影C. 下颌骨正位片 D. 舌下区活检

E. 右下颌下腺造影+右侧口底横断牙合片 正确答案: E

336. 类风湿性颞下颌关节炎可出现

- A. 颞下颌关节区及其周围疼痛，一般为非剧痛的钝痛
 - B. 关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对牙合，稍用力即可引起关节区剧痛
 - C. 颞下颌关节区及其周围疼痛，常伴有全身游走性. 多发性关节炎，晚期可发生关节强直
 - D. 吞咽时咽部疼痛和感觉异常
 - E. 阵发性点击样剧烈疼痛
- 正确答案：C

337. 下唇囊肿直径约，镜下见囊肿无衬里上皮，由炎性肉芽组织和结缔组织包绕，其中见大量泡沫细胞。最可能的病理诊断是

- A. 潴留性黏液囊肿
 - B. 外渗性黏液囊肿
 - C. 鳃裂囊肿
 - D. 鼻唇囊肿
 - E. 表皮样囊肿
- 正确答案：B

338. 细菌脂多糖在牙周病损中的作用错误的是

- A. 主要损伤牙周组织的细胞成分
- B. 抑制成纤维细胞的生长
- C. 促进骨组织的吸收
- D. 抑制吞噬细胞释放溶酶体，促进炎症反应
- E. 检测牙周病损中细菌作用的一项标志

正确答案：D

339. 畸形中央尖

- A. 成釉细胞增生突入牙乳头
- B. 牙齿发育时牙乳头组织向成釉器突起
- C. 釉牙本质界平直
- D. 釉基质合成. 分泌或矿化障碍
- E. 局限性釉质增生

正确答案：B

340. 同时麻醉颊神经. 舌神经和下牙槽神经的穿刺部位是

- A. 下颌孔
- B. 下颌神经沟
- C. 下颌舌骨沟
- D. 下颌隆突

E. 下颌小舌
正确答案：D

341. 患者，男性，76岁，高血压30余年，平时血压在150-180/90-110mmHg，不规则服用降压药。2周来胸闷. 气促，贫血貌，颈静脉怒张；心界向左下扩大，心率104次/分；两肺底有细小湿性啰音，肝肋下2指；下肢水肿(++)，尿蛋白(+)，血肌酐884 μmol/L(10mg/dl)。若血钾增高时，降压治疗不宜使用

- A. β受体阻滞剂
 - B. 袢利尿剂
 - C. 钙通道阻滞剂
 - D. 血管扩张剂
 - E. 血管紧张素转换酶抑制剂
- 正确答案：E

342. 下述临床表现最可能患有何种疾病：牙有自发性阵发性剧痛，间隔几小时，

温度刺激，夜间疼痛加重，探有深龋，未穿髓，无叩痛 ()

急性浆液性牙髓炎 急性化脓性牙髓炎 急性牙髓充血

慢性闭锁性牙髓炎 慢性溃疡性牙髓炎
正确答案：A

343. 患者，男性，22岁，因刷牙出血，牙齿松动半年就诊。无全身疾病。牙周龈上、龈下洁治后，临床检查见左下颌第一磨牙颊侧中央仍有7mm深牙周袋，探诊出血。

最可能的诊断是

- A. 青少年后期牙周炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 侵袭性牙周炎
- D. 快速进展型牙周炎
- E. 成人牙周炎

正确答案：C

344. 一般恶性混合瘤的治疗手段以A. 放射治疗为主

B. 化学治疗为主 C. 手术治疗为主 D. 免疫治疗为主 E. 冷冻治疗为主 正确答案：C

345. 下列哪项是全口义齿垂直距离过大的表现 A. 颏唇沟变深

B. 鼻唇沟变浅 C. 发舌齿音困难

D. 咀嚼时要用较大的力量 E. 两侧颞肌动度不一致 正确答案：C

346. 医疗机构配制制剂，应是本单位临床需要而市场上没有供应的品种，并须经所在地下列部门批准后方可配制

A. 省级卫生行政部门

B. 省级药品监督管理部门 C. 县级卫生行政部门

D. 地市级药品监督管理部门 E. 省级工商行政管理部门 正确答案：B

347. 以下疾病中不属于口腔变态反应性疾病的是 A. 接触性口炎

B. 血管神经性水肿 C. 药物性口炎

D. 斯一约综合征病

正确答案：E

348. 以下哪一种疾病愈合后一般不留瘢痕 A. 腺周口疮

B. 带状疱疹

C. 白塞病中的生殖器溃疡 D. 口腔黏膜纤维性变

E. 褥疮性溃疡 正确答案：B

349. 下列归纳的恒牙列外形正确的是 A. 尖圆形

B. 方圆形和尖圆形 C. 尖圆形和椭圆形 D. 方圆形和椭圆形

E. 方圆形、尖圆形和卵圆形 正确答案：E

350. 患者，男性，25岁，背部刀伤，伤口流血2小时。查体：神志尚清楚，诉口渴，皮肤苍白，稍冷，脉搏110次/分，血压90/70mmHg，脉压小，表浅静脉塌陷，尿少。应采取哪种措施

A. 门诊观察 B. 胸部X线片

C. 全血细胞计数 D. 收住院手术治疗 E. 输血

正确答案: D

351. 免疫组织化学染色中淀粉酶阳性的唾液腺肿瘤是

A. 多形性腺瘤 B. 嗜酸性腺瘤 C. 腺样囊性癌 D. 腺泡细胞癌 E. 黏液表皮样癌

正确答案: D

352. 患者, 女, 10 岁, 左上颌中切牙及侧切牙受外伤, 未发现硬组织折断, 叩 (+), 松 (-), 诊断为牙齿震荡。不合理的处置方法是

A. 消除咬合创伤

B. 减少或避免不良刺激 C. 服用抗菌药

D. 釉质若出现裂纹, 可用复合树脂修复 E. 定期追踪复查

正确答案: D

353. 固有牙槽骨又称 A. 网状板

B. 束状板 C. 硬骨板 D. 基板

E. 松质骨板 正确答案: C

354. 大唾液腺, 混合腺, 以浆液性腺泡为主的是 A. 腮腺

B. 下颌下腺 C. 舌下腺 D. 唇腺

E. 腭腺

正确答案: B

355. 一肠梗阻术后患者, 血清 Na^+ 130mmol/L, K^+ 3mmol/L, Cl^- 98mmol/L,

BUN 8mmol/L。应考虑与下列哪项因素有关 A. 水分补充不足

B. 补充了大量等渗盐水 C. 补充了大量等渗糖水 D. 补充了足量的钾盐 E. 肾功能不全

正确答案: C

356. 患者, 女性, 45 岁, 颌面部损伤, 上颌骨骨折, 出血 700ml, 烦躁, 面色苍白, 皮肤湿冷, 血压 110/94mmHg, 脉搏 100 次/分。此时患者病情处在哪种情况

A. 无休克

B. 休克代偿期 C. 中度休克 D. 重度休克 E. 虚脱

正确答案: B

357. 患者, 男, 8 岁, 乳磨牙不同程度龋坏, 考虑的治疗方法不可能是

A. 药物治疗 B. 充填治疗 C. 嵌体修复

D. 金属成品冠修复

E. 对患儿及家长进行口腔卫生宣传 正确答案: E

358. 常用于腐败坏死性口底蜂窝织炎脓腔冲洗的局部用药是A. 复方硼砂液
%过氧化氢液氯己定液

%过氧化氢液氯己定液

正确答案：B

359. 下颌骨骨折易移位的主要因素是A. 咀嚼肌的牵拉作用

B. 骨折部位

C. 骨折线上是否有牙D. 骨折线方向

E. 外力的大小和方向
正确答案：A

360. 关于自凝软衬材料重衬的说法错误的是A. 无刺激性，可在口腔内直接重衬

B. 刃状牙槽嵴和黏膜较厚的患者适用

C. 能增加义齿的固位，消除压痛和其他不适，提高咀嚼效能D. 软衬材料如有不适
可及时添加

E. 待软衬材料在口内凝固定形后方可取出
正确答案：B

361. 双侧上颌骨横断骨折或颅颌分离的骨折常用A. 单颌牙弓夹板固定

B. 切开复位，骨间固定 C. 带钩牙弓夹板颌间固定

D. 黏片颌间固定E. 颅颌固定

正确答案：E

362. 颈部肿块病人出现声嘶，舌偏患侧，最可能哪些神经末梢受侵犯() A. 第 X.

第XI 脑神经 B. 第 K. 第 X 脑神经C. 第见. 第X 脑神经

D. 第 X. 第孤脑神经E. 第 K. 第]01 脑神经
正确答案：D

363. 子宫动脉来自A. 腹主动脉

B. 髂总动脉C. 髂内动脉D. 髂外动脉E. 肾动脉

正确答案：C

364. 匙形刮治器的真 3Z-v 作端是刃部

A. 上 1/

365. X 线影像显示为根管不规则增宽的是

A. 局限性牙髓钙化B. 弥散性牙髓钙化C. 牙内吸收

D. 牙根吸收 E. 畸形舌侧窝
正确答案：C

366. 艾滋病患者常具有机会性感染和肿瘤的发生率增高的特点。试问下列哪一项
指标可以评价患者的细胞免疫功能

+ /CD4+

+ /CD4+

+ /CD8+

+ /CD8+

+ /CD8+

正确答案：D

367. 为提高金瓷结合强度，下列哪项要求是不正确的A. 基底冠表面喷砂处理

B. 瓷的热膨胀系数略小于合金

C. 基底冠表面不应使用含有机物的磨具打磨D. 可在基底冠表面设计倒凹固位

E. 应清除基底冠表面油污
正确答案：D

368. 类风湿性颞下颌关节炎可出现

A. 颞下颌关节区及其周围疼痛，一般为非剧痛的钝痛

B. 关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对牙合，稍用力即可引起关节区剧痛

C. 颞下颌关节区及其周围疼痛，常伴有全身游走性. 多发性关节炎，晚期可发生关节强直D. 吞咽时咽部疼痛和感觉异常

E. 阵发性点击样剧烈疼痛
正确答案：C

369. 临床上分腮腺为浅. 深叶的依据是A. 颈外动脉穿行的平面

B. 下颌后静脉穿行的平面

C. 面神经主干及其分支的平面D. 咬肌的前缘

E. 下颌支的后缘
正确答案：C

370. 在生长活跃的青春前期，新生的龋蚀急速地发展，牙质崩坏A. 奶瓶龋

B. 少年龋

C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋

正确答案：B

371. 下列情况哪项是皮脂腺囊肿所特有的临床表现A. 常见于面部

B. 发生缓慢

C. 囊壁与皮肤粘连，中央可有一色素点D. 质地软，无压痛

E. 边界清楚，可活动
正确答案：C

372. 颌面部创口初期缝合允许最长时限为（） 小时小时小时小时

E. 只要没有明显化脓创口，48 小时或更长，在清创后仍可作初期缝合
正确答案：

E

373. 人类辅助生殖技术的目的是A. 赢利

B. 演进性优生

C. 有利于未婚男女生儿育女

D. 治疗. 补偿已婚夫妇的生育功能E. 控制人口数量

正确答案：D

374. 核酸中核苷酸之间的连接方式是'，3'-磷酸二酯键

'，5'-磷酸二酯键

C. 糖苷键

'，5'-磷酸二酯键

E. 肽键

正确答案：B

375. 烤瓷熔附金属全冠边缘为烤瓷者，牙体颈缘应预备成A. 羽状

B. 凹槽状

C. 直角斜面形度凹面或直角

E. 以上颈缘预备形均可 正确答案：D

376. 患者，男性，26岁，舌部溃疡1个月。患者近2个月来。低热. 乏力. 盗汗。检查：舌部右侧溃疡。较深，约 \sim ，边缘不齐，表面假膜。基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。为尽早作出诊断，

A. 血培养

B. 胸透或胸片 C. 标本动物接种D. 结核菌素试验E. 活检

正确答案：E

377. 有关龋病活跃性的检测。不正确的是A. 测定机体对龋病的敏感度

B. 可用于个体或群体

C. 反映机体龋坏程度的现状D. 预测龋病进展的状况

E. 诊断龋病 正确答案：E

378. 患者，男性，13岁，上前牙先天性畸形，要求矫治。检查：上中切牙切缘中央可见半月形缺陷，切缘比牙颈部狭窄，切牙之间有较大空隙。第一恒磨牙的牙尖皱缩，牙尖向

中央偏斜，釉质发育不全，呈多个不规则的小结节和坑窝凹陷，散在于近咬合面处。应诊断为

A. 一期梅毒 B. 二期梅毒 C. 获得性梅毒

D. 晚期胎传梅毒E. 淋病

正确答案：D

379. 艾滋病患者常具有机会性感染和肿瘤的发生率增高的特点。试问下列哪一项指标可以评价患者的细胞免疫功能

+ /CD4+

+ /CD4+

+ /CD8+

+ / CD8+

+ / CD8+

正确答案：D

380. 成釉细胞瘤的典型X线表现是

- A. 骨质膨胀，骨密质消失
 - B. 呈单房型，圆形或卵圆形
 - C. 呈多房型，房差悬殊，可含牙，牙根呈锯齿状吸收
 - D. 常见散在性钙化小团
 - E. 邻牙被推移位或脱落
- 正确答案：C

381. 关于牙本质龋脱矿层，错误的说法是

- A. 小管形态不完整
- B. 无细菌侵入
- C. 有再矿化现象发生
- D. 色素容易沉着
- E. 部分成牙本质细胞突变性坏死

正确答案：A

382. 免疫荧光检查时，病变上皮细胞之间呈现网状的荧光图形。提示为

- A. 白斑
- B. 类天疱疮
- C. 红斑狼疮
- D. 类天疱疮样扁平苔藓
- E. 寻常性天疱疮

正确答案：E

383. Mongolism 是指综合征

- B. 掌跖角化一牙周破坏综合征
 - C. 白细胞功能异常
 - D. 艾滋病
 - E. 坏死性溃疡性牙周炎
- 正确答案：A

384. 与异常的宿主反应有关的牙周炎是

- A. 侵袭性牙周炎
 - B. 顽固性牙周炎
 - C. 慢性牙周炎
 - D. 复合性牙周炎
 - E. 成人性牙周炎
- 正确答案：A

385. /

386. 不属于三叉神经功能检查项目的是

- A. 颌面部皮肤及黏膜的痛、温觉检查
- B. 角膜反向试验

D. 腭反射

E. 咀嚼肌运动功能检查

正确答案：C

387. 医患双方当事人对患者死因有异议的，应当尸检。当地不具备尸体冻存条件的，尸检的期限是

- A. 在患者死亡后 24 小时内进行
- B. 在患者死亡后 12 小时内进行
- C. 在患者死亡后 36 小时内进行

- D. 在患者死亡后 48 小时内进行
E. 在患者死亡后 60 小时内进行 正确答案：D

388. 下述临床表现最可能患有何种疾病：牙有自发性阵发性剧痛，间隔几小时，温度刺激，夜间疼痛加重，探有深龋，未穿髓，无叩痛（）
急性浆液性牙髓炎 急性化脓性牙髓炎 急性牙髓充血
慢性闭锁性牙髓炎 慢性溃疡性牙髓炎 正确答案：A

389. 根分叉区病变发生频率最低的牙位是 A. 上颌第一磨牙
B. 下颌第一磨牙 C. 上颌前磨牙 D. 上颌第二磨牙 E. 下颌第二磨牙 正确答案：C

390. 患者，男性，45 岁，体检时发现右侧口角区黏膜有黄白色粟粒大小斑点，呈丛集性

分布，无明显自觉症状，上唇唇红处也有类似病损。最可能的诊断是

- B. 白斑病
C. 口腔扁平苔藓 D. 迷脂症
E. 疱疹性口炎 正确答案：D

391. 患者，女性，32 岁，右腮腺肿物 4 年，近半年来生长加快。镜下见部分区域呈典型的多形性腺瘤的结构。肿瘤的一侧见瘤细胞表现明显的异型性，大量玻璃样变和灶性坏死。最可能的病理诊断是

- A. 黏液表皮样癌 B. 腺样囊性癌 C. 腺泡细胞癌 D. 恶性混合瘤
E. 上皮-肌上皮癌 正确答案：D

392. ~患者，男性，53 岁，左鼻旁包块 20 年，约 2cm 大小，凸于体表。近期出现溃烂，疼痛及出血，经久不愈。最可能的诊断是

- ~ A. 皮脂腺囊肿伴感染 B. 色素痣感染
C. 疔痈
D. 皮肤感染 E. 基底细胞癌 正确答案：E

393. McCune-Albright 综合征症状有

- A. 开口受限 B. 性早熟
C. 单骨性病变 D. 突眼

- E. 血清钙磷异常 正确答案：B

394. 上唇及鼻根部炎症，若处理不当可使菌血栓逆流入颅而导致海绵窦化脓性血栓性静脉炎，下列其可能的逆流途径中哪个是错误的

- A. 面静脉—面深静脉—翼丛—眼下静脉—眼下静脉—海绵窦 B. 面静脉—内眦静脉—眼下静脉—海绵窦
C. 面静脉—面深静脉—翼丛—破裂孔导血管—海绵窦 D. 面静脉—面深静脉—翼丛—卵圆孔网—海绵窦
E. 面静脉—面深静脉—翼丛—上颌静脉—脑膜中静脉—海绵窦 正确答案：E

395. 患者，男性，56 岁，右腮腺区渐进性增大肿块，界限清楚，无其他不适。镜下见肿瘤细胞形成导管、实性片块、黏液样和软骨样结构，部分区瘤细胞异型，偶见核分裂。上皮与黏液样组织互相移行，肿瘤有包膜但不完整，且肿瘤细胞浸润包膜。上述所见符合

- A. 多形性腺瘤 B. 黏液表皮样癌
- C. 多形性腺瘤, 有恶变倾向 D. 多形性低度恶性腺癌 E. 肌上皮癌

正确答案：C

396. 下面关于 ANUG 的组织病理学表现，说法正确的是

- A. 病变的表层为坏死区
- B. 主要表现为牙龈的非特异性急性坏死性炎症 C. 坏死区下方为结缔组织区
- D. 病变的最里层为慢性炎症浸润区 E. 以上都是

正确答案：E

397. 大连接体的主要作用是

- A. 保护口腔的软组织
- B. 连接义齿的各部分成一体 C. 增加固位
- D. 形态美观
- E. 提高咀嚼效率

正确答案：B

398. 成牙本质细胞的形成是由于 A. 分泌性成釉细胞诱导

- B. 星网状层和中间层细胞诱导 C. 内釉上皮和星网状层诱导 D. 内釉上皮或上皮根鞘诱导 E. 外釉上皮诱导

正确答案：A

399. 患者，男性，22 岁，因刷牙出血，牙齿松动半年就诊。无全身疾病。牙周龈上、龈下洁治后，临床检查见左下颌第一磨牙颊侧中央仍有 7mm 深牙周袋，探诊出血。

如右下后牙咬合不适半个月。检查：探针可进入 6 根分叉区，且探诊后出血。诊断为根分叉病变。该病变程度的判断，主要依据是

- A. 牙松动度 B. 叩诊
- C. 探诊和 X 线片
- D. 扪诊 E. 视诊

正确答案：C

400. 患者，男性，45 岁，因交通事故，双股骨干粉碎骨折并肌肉损伤第 2 日，24 小时尿量 200ml，下列化验结果不符合急性肾衰竭的是

- A. 尿素氮 L
- B. 血钾 L
- C. 血镁 L

D. 血磷 L. 血钙 L
E. 血肌酐 106mmol/L
正确答案: D

401. 患者, 女性, 25 岁, 尿频. 尿急. 尿痛, 血尿伴发热 39°C, 1 天入院; 无呕吐, 无腰痛; 尿蛋白(+), 红细胞 30-40/HP, 白细胞满视野。
最适宜的进一步诊断方法是

A. 肾功能检查 B. 尿细胞学检查
C. 尿比重和尿渗透压检查 D. 尿细菌学检查
E. 尿路影像学检查 正确答案: D

402. 下列哪一项不是急性龈乳头炎的病因 A. 食物嵌塞
B. 不恰当的使用牙签 C. 充填体的悬突
D. 不良修复体的边缘 E. 根纵裂
正确答案: E

403. D. 大量血尿, 尿比重 1.

404. 与乳牙新生线之矿化薄弱或乳牙牙颈部出生后釉质之矿化度低有关 A. 奶瓶龋
B. 少年龋 C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋
正确答案: D

405. 在可能导致胎儿发生唇腭裂畸形的药物中, 不包括 A. 强心药物
B. 抗肿瘤药物 C. 抗组胺药物 D. 抗惊厥药物 E. 安眠药物 正确答案: A

406. 患者, 女性, 65 岁, 下颌义齿基托边缘锐利, 下后牙前庭沟处可见一处深在溃疡, 边缘隆起, 疼痛不明显, 最可能的诊断是
A. 自伤性溃疡 B. 结核性溃疡 C. 癌性溃疡 D. 褥疮性溃疡
正确答案: D

407. 新生儿先天性胸腺缺陷 A. 影响体液免疫
B. 细胞免疫正常 C. 体液免疫正常
D. 致严重细胞免疫和体液免疫缺陷 E. 只影响细胞免疫
正确答案: D

408. 关于成釉细胞瘤的x 线表现错误的是
A. 可呈单囊或多囊变 B. 呈多房性囊肿样阴影
C. 囊壁边缘不整齐, 呈半月形切迹 D. 囊内根尖不规则吸收

E. 呈分房状伴有钙化灶 正确答案: E

409. 中腭突未能在—侧或两侧与侧腭突融合, 则形成的畸形是 A. 腭裂

B. 牙槽突裂 C. 面斜裂 D. 面横裂

E. 上唇正中裂 正确答案: A

410. 患者, 男性, 58 岁, 行舌大部分切除术, 舌体缺损采用左前臂皮瓣游离血管吻合移植, 皮瓣转移术后 24 小时出现皮瓣苍白发凉, 起皱。其原因是

A. 静脉缺血 B. 静脉淤血 C. 动脉淤血 D. 动脉缺血

E. 动静脉同时缺血 正确答案: D

411. 患者, 女性, 64 岁, 发现左上牙龈菜花样溃疡 2 个月, 病检诊为“鳞癌 I 级”。查见溃疡 2cmX2cm 大小。X 线片示溃疡区牙槽突骨质有破坏, 颌面颈部未触及明显肿大淋巴结。该患者应选择的最佳治疗方案为

A. 病变区上颌骨区域性扩大切除术加根治性颈清扫术 B. 病变区上颌骨区域性扩大切除术加功能性颈清扫术

C. 病变区上颌骨区域性扩大切除术, 定期复查, 密切注意颈部淋巴结改变 D. 病变侧上颌骨次全切除术加功能性颈清扫术

E. 病变侧上颌骨全部切除术加功能性颈清扫术 正确答案: C

412. 没有移位的骨折, 需要

A. 暂时制动 B. 牙间结扎 C. 颌间结扎

D. 切开复位内固定术 E. 暂不处理, 随访 正确答案: E

413. 牙髓的细胞间质主要是 A. 胶原纤维

B. 弹力纤维 C. 嗜银纤维

D. 胶原纤维和弹力纤维 E. 胶原纤维和嗜银纤维 正确答案: E

414. 某同学准备去幼儿园对儿童进行口腔健康教育, 在准备口腔健康教育材料时, 教授提醒他应特别注意内容应具有以下特点, 除了

A. 知识性 B. 准确性 C. 创新性 D. 趣味性 E. 艺术性

正确答案: C

415. 患者, 男性, 23 岁。刷牙时牙龈出血半年。检查: 全口牙牙石(+)-(++) , 牙面有色素, 牙龈缘及龈乳头轻度水肿, 色略红, 探诊后牙龈出血, 探诊深度 3mm, 未探查附着丧失。最可能的诊断是 A. 慢性牙周炎

B. 增生性龈炎 C. 坏死性龈炎 D. 边缘性龈炎

E. 侵袭性牙周炎 正确答案: C

416. 青年李某, 右下腹疼痛难忍, 到医院就诊。经医师检查, 检验, 当即诊断为急性阑尾炎, 遂对其施行阑尾切除术。手术情况正常, 但拆线时发现伤口愈合欠佳, 有蛋黄色液体渗出。手术医师告知, 此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组

织吸收所致，在临床中少见。经过近 1 个月的继续治疗，李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定，李某被拖延近 1 个月后才得以痊愈。这一客观后果，应当属于

A. 二级医疗事故 B. 三级医疗事故 C. 四级医疗事故
D. 因患者体质特殊而发生的医疗意外 E. 因不可抗力而造成的不良后果

正确答案：D

417. 孕产妇首先发生右心衰竭的疾病是 A. 妊娠合并二尖瓣狭窄
B. 子痫
C. 羊水栓塞
D. 重型胎盘早剥 E. 产褥感染

正确答案：C

418. 以下关于重型阿弗他溃疡临床表现描述不正确的是 A. 溃疡边缘不整齐，似弹坑状
B. 溃疡边缘不整齐，呈鼠啮状，底部有肉芽组织 C. 溃疡边缘不规则，红肿隆起
D. 溃疡直径可达 10-30mm
E. 溃疡深及黏膜下层直至肌层

正确答案：B

419. 配置 2:1 等张含钠液 120ml 需
， 5%NaHCO₃40ml
， %NaHCO₃40ml
， 10%GS40ml
， 5%NaHCO₃80ml
， %NaHCO₃40ml

正确答案：E

420. 黏性放线菌损伤牙周组织的机制不包括 A. 影响成纤维细胞功能
B. 合成中性粒细胞趋化物
C. 抗原刺激宿主产生过敏反应 D. 刺激破骨细胞，造成骨吸收 E. 分泌白细胞毒素

正确答案：E

421. 造成牙龈炎的最主要因素是 A. 遗传
B. 龈上菌斑 C. 病毒感染 D. 全身性疾病
E. 龈下菌斑和龈下牙石

正确答案：B

422. 白塞病又称为
A. 口干一眼干一关节炎综合征 B. 贝赫切特综合征
C. 斯一约综合征 D. 梅一罗综合征 E. 哈钦森综合征

正确答案：B

423. 牙槽突裂最佳植骨时间个月
个月 岁左右岁

岁以后

正确答案：D

424. 下列哪项不是人工被动免疫的生物制品
A. 抗毒素
B. 丙种球蛋白
C. 细胞因子
D. 卡介苗
E. 胸腺素

正确答案：D

425. 关于自凝软衬材料重衬的说法错误的是
A. 无刺激性，可在口腔内直接重衬
B. 刃状牙槽嵴和黏膜较厚的患者适用
C. 能增加义齿的固位，消除压痛和其他不适，提高咀嚼效能
D. 软衬材料如有不适可及时添加
E. 待软衬材料在口内凝固定形后方可取出
正确答案：B

426. 上颌突与下颌突未融合
A. 面横裂
B. 面斜裂
C. 单侧唇裂
D. 上唇正中裂
E. 下唇唇裂

正确答案：A

427. 患者，男性，54岁，右面颊疼痛似刀割，阵发，间歇期较长，神经系统检查无阳性体征。
该患者的诊断最大的可能是

A. 三叉神经痛
B. 脊神经痛
C. 脑肿瘤痛
D. 血管神经痛
E. 继发性神经痛
正确答案：A

428. 患者，男性，26岁，十二指肠残端瘘20天。目前进食少，全身乏力，直立时晕倒。血清 $K^{+}3\text{mmol/L}$ ， $Na^{+}125\text{mmol/L}$ 。其水盐代谢失调应为
A. 高钾血症，重度低渗性缺水
B. 低钾血症，高渗性缺水
C. 低钾血症，等渗性缺水
D. 低钾血症，中度低渗性缺水
E. 低渗性缺水

正确答案：D

429. 患者，男性，50岁，口腔多年以来反复出现溃疡，外生殖器也常出现溃疡，近来眼睛也出现不适，经诊断为虹膜睫状体炎，除此以外下肢皮肤可见结节性红斑，手背静脉注射处可见红疹，最可能的诊断是

A. 舍格伦综合征
B. 莱特尔综合征
C. 贝赫切特综合征
D. 梅-罗综合征
E. 综合征
正确答案：C

430. 关于口腔颌面部间隙感染的描述错误的是
A. 均为继发性

- B. 有时也可为原发性
C. 多为牙源性或腺源性感染扩散所致D. 多为需氧和厌氧菌引起的混合感染
E. 化脓性炎症可局限于一个间隙内，也可波及相邻的几个间隙
正确答案：B

431. 牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后周
周周
~3 个月个月标准
正确答案：D

432. 根分叉区病变发生频率最低的牙位是A. 上颌第一磨牙
B. 下颌第一磨牙C. 上颌前磨牙 D. 上颌第二磨牙E. 下颌第二磨牙
正确答案：C

433.)患者，男性，26 岁，舌部溃疡 1 个月。患者近 2 个月来。低热，乏力，盗汗。检查：舌部右侧溃疡。较深，约 \sim ，边缘不齐，表面假膜。基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。 首选的检查方法为
下列病理变化对该病的诊断最具价值的是A. 形成类上皮结节，中央为干酪样坏死
B. 上皮坏死，形成溃疡
C. 固有层炎性细胞带状浸润
D. 上皮细胞出现非典型增生E. 基底细胞液化变性
正确答案：A

434. 不属于腮腺腺样囊型癌的生长方式是A. 血行转移
B. 直接侵犯邻近组织C. 区域淋巴转移
D. 沿血管、神经束生长E. 侵犯面神经
正确答案：C

435. 患者，男，11 岁，左上颌前磨牙区膨大 2 年，X 线见边界清楚的透射区，其中有结节状钙化物。镜下见肿物有排列紊乱、互相混杂的牙齿组织，无典型的牙齿结构。病理诊断应为
A. 牙成釉细胞瘤 B. 巨大型牙骨质瘤C. 混合性牙瘤
D. 组合性牙瘤
E. 成釉细胞纤维牙瘤
正确答案：C

436. 一般拔牙后多长时间可考虑固定义齿修复个月
个月个月个月个月
正确答案：C

437. 儿童时期一侧髁突受损，下颌畸形一般随年龄的增长而日益明显，面容不对称表现为
A. 颈部偏向患侧，健侧面部丰满，患侧面部扁平狭长B. 颈部偏向健侧，健侧面部

丰满，患侧面部扁平狭长C. 颞部偏向患侧，患侧面部丰满，健侧面部扁平狭长D. 颞部偏向健侧，患侧面部丰满，健侧面部扁平狭长E. 颞部偏向患侧，患侧面部丰满，健侧面部亦丰满 正确答案：C

438. 缺牙后长期未修复可能导致的牙周组织改变，除了A. 继发龋
B. 邻接丧失C. 牙周袋 D. 早接触
E. 对颌牙伸长 正确答案：C

439. 口腔颌面部的开始发育的时间是A. 胚胎发育第 3 周
B. 胚胎发育第 4 周
C. 胚胎发育第 6 周
D. 胚胎发育第 5 周
E. 胚胎发育第 7 周 正确答案：A

440. 以下哪项是固定桥最重要的支持基础A. 牙周膜
B. 牙槽骨C. 牙龈
D. 结合上皮E. 黏膜
正确答案：A

441. 形成腭裂
A. 上颌突与下颌突未联合或部分联合
B. 一侧或两侧的球状突或上颌突未联合或 { C. 侧腭突和鼻中隔未融合或部分融合
D. 前腭突与上颌突未能联合或部分联合E. 上颌突与侧鼻突未联合
正确答案：C

442. 不属于下颌骨内侧面的解剖结构是A. 上. 下颞棘
B. 颞结节 C. 舌下腺窝D. 下颌小舌
E. 下颌下腺窝 正确答案：B

443. 起于下颞棘的肌肉是A. 颞舌肌
B. 颞舌骨肌 C. 茎突舌骨肌D. 下颌舌骨肌E. 以上都不是 正确答案：B

444. 患者，女性，25 岁，尿频. 尿急. 尿痛，血尿伴发热 39℃，1 天入院；无呕吐，无腰痛；尿蛋白(+)，红细胞 30-40/HP，白细胞满视野。
患者最可能的诊断为

A. 急性膀胱炎 B. 急性肾盂肾炎
C. 急性肾小球肾炎D. 肾结核
E. 急性间质性肾炎 正确答案：B

445. 临床诊断乳牙根尖周病不依赖于A. 疼痛
B. 肿胀C. 松动
D. 龋洞深度线检查
正确答案：D

446. 固定桥试戴时不能就位的主要原因是A. 两侧基牙制备时未取得共同就位道
B. 基牙过高
C. 邻牙倒凹过大 D. 铸造时金属收缩E. 印模不准确
正确答案: A

447. 下列哪项是全口义齿垂直距离过大的表现A. 颏唇沟变深
B. 鼻唇沟变浅 C. 发舌齿音困难
D. 咀嚼时要用较大的力量E. 两侧颞肌动度不一致 正确答案: C

448. 关于自凝软衬材料重衬的说法错误的是A. 无刺激性, 可在口腔内直接重衬
B. 刃状牙槽嵴和黏膜较厚的患者适用
C. 能增加义齿的固位, 消除压痛和其他不适, 提高咀嚼效能
D. 软衬材料如有不适可及时添加
E. 待软衬材料在口内凝固定形后方可取出 正确答案: B

449. 以下哪一项不符合釉质钙化不全表现A. 萌出时釉质黄棕色
B. 釉质厚度明显小于正常C. 牙颈部釉质钙化较高 D. 釉质很软
E. 牙本质暴露 正确答案: B

450. 患者, 女性, 40 岁, 下唇反复糜烂 1 年。活检标本见上皮表面过度正角化, 粒层明显, 角化层可有剥脱, 有时见角质栓塞; 上皮钉突增生, 伸长, 基底细胞发生液化变性; 上皮与固有层之间可形成裂隙和小水疱。基底膜不清晰, 上皮下结缔组织内有淋巴细胞、浆细胞浸润; 血管周围有PAS 阳性类纤维蛋白沉积, 管周有淋巴细胞浸润。病理诊断应为
A. 糜烂型扁平苔藓B. 肉芽肿性唇炎
C. 慢性盘状红斑狼疮D. 非特异性肉芽肿 E. 慢性唇炎
正确答案: C

451. 叶状乳头
A. 数目最多, 舌尖部较多, 体积较小, 略呈锥体状 B. 体积最大, 约 10 个左右, 沿界沟的前方排列成一行
C. 位于舌侧缘的后部, 在人类仅有 5-8 条平行的皱襞
D. 呈卵圆形, 为味觉感受器
E. 数目较少, 色较红, 呈蕈状, 顶端圆形 正确答案: C

452. 不属于面神经的分支是A. 鼓索支
B. 颞神经 C. 下颌缘支D. 颈支
E. 岩大神经 正确答案: B

453. 面神经颊支
A. 出腮腺前缘行于咬肌筋膜深面B. 一般与腮腺导管平行

C. 损伤时口角歪斜D. 来自颞面干
E. 位于耳屏间切迹与鼻翼上缘的连线正确答案: B

454. 恒牙建牙合的关键时期是A. 新生儿期
B. 婴儿期C. 幼儿期
D. 混合牙列阶段 E. 年轻恒牙列阶段正确答案: D

455. 下列属于疱疹病毒的是

B. 柯萨奇病毒C. 肠道病毒

病毒

正确答案: E

456. 双侧颞下颌关节急性脱位的临床特点中, 哪项是错误的A. 前牙开𪙇. 后牙早接触
B. 双侧耳屏前区出现肿胀C. 下颌前伸, 两颊变平 D. 颊部皮肤可能有裂伤 E. 耳屏前方触诊有凹陷 正确答案: B

457. 下颌管走行规律是 A. 在下颌支内, 行向正下方
B. 在下颌体内, 该管行向前下
C. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间, 距骨外板较内板近
D. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间, 距下颌支前缘较后缘近 E. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间, 距牙槽缘较下颌下缘为近正确答案: D

458. 配置 2: 1 等张含钠液 120ml 需
, 5%NaHCO₃40ml
, %NaHCO₃40ml
, 10%GS40ml
, 5%NaHCO₃80ml
, %NaHCO₃40ml 正确答案: E

459. 药物过敏性口炎的临床特征为A. 皮肤红斑. 水疱, 口腔大小不等水疱
B. 皮肤水疱或斑丘疹, 口腔为相互融合的透明小水疱C. 皮肤结节性红斑, 口腔为反复发作的溃疡
D. 皮肤紫色丘疹, 口腔为白色条纹E. 皮肤大疱, 口腔黏膜白色瘢痕

正确答案: A

460. 患儿, 男, 6 岁, 双侧腮腺反复肿大 2 年, 临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。关于儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现, 下列说法错误的是

- A. 多数主导管无改变 B. 副腺体末梢导管扩张
C. 临床痊愈后仍可有末梢导管扩张D. 主导管可有扩张
E. 病变可累及下颌下腺 正确答案：E

461. 以下哪一种疾病愈合后一般不留瘢痕A. 腺周口疮
B. 带状疱疹
C. 白塞病中的生殖器溃疡D. 口腔黏膜纤维性变
E. 褥疮性溃疡 正确答案：B

462. 创伤性溃疡的治疗应首选A. 免疫增强剂
B. 肾上腺皮质激素及免疫抑制剂C. 局部消炎止痛
D. 去除刺激因素E. 以上都不是 正确答案：D

463. 患者，男性，58岁，舌左侧缘可见1cmX1cm大小的溃疡，3个月未愈合，溃疡边缘稍隆起，不整齐。底部见桑葚样肉芽肿，结核菌素试验阳性。治疗上应选择

- A. 庆大霉素和红霉素B. 苄星青霉素
C. 头孢曲松钠
D. 链霉素和异烟肼E. 环孢素
正确答案：D

464. 口腔颌面部的开始发育的时间是A. 胚胎发育第3周
B. 胚胎发育第4周
C. 胚胎发育第6周
D. 胚胎发育第5周
E. 胚胎发育第7周 正确答案：A

465. 患者，男性，30岁，6近远中向折裂。活动，需拔除。应该麻醉的神经是同侧的

- A. 下牙槽神经
B. 下牙槽神经+舌神经
C. 下颌神经+舌神经+颊长神经D. 下牙槽神经+颊长神经
E. 下牙槽神经+舌神经+颊长神经 正确答案：E

466. 一患者不慎摔伤面部，临床检查及X线片提示下颌骨体部骨折。患者最不可能出现的症状是

- A. 牙龈出血B. 牙脱位 C. 颧部塌陷D. 咬合错乱E. 前牙开胎
正确答案：C

467. 患者，男性，24岁，主诉晨起时枕头上有血迹，牙龈有自发-陛出血. 疼痛及腐败性口

臭2天。

确诊之前，不需做下列哪一项口腔检查或辅助检查

- A. 牙龈的色. 形. 质的变化
- B. 量体温
- C. 测血压
- D. 唇颊黏膜
- E. 血常规

正确答案：C

468. 牙挫伤时不会出现的临床症状是
- A. 自觉伤牙伸长
 - B. 患牙松动
 - C. 咬合痛
 - D. 牙龈撕裂
 - E. 叩痛

正确答案：E

469. 急性化脓性腮腺炎应与下列哪一类疾病相鉴别
- A. 颌骨骨髓炎
 - B. 腮腺区淋巴结炎
 - C. 流行性腮腺炎
 - D. 慢性腮腺炎
 - E. 腮腺区肿瘤

正确答案：C

470. 患甲类传染病. 炭疽死亡的，应将尸体
- A. 进行消毒处理
 - B. 立即进行卫生处理. 就近火化
 - C. 进行卫生处理后按照规定深埋
 - D. 在疾病预防控制机构的指导下，进行严格的消毒
 - E. 须依法实施消毒和无害化处理

正确答案：B

471. 牙源性角化囊肿易复发的原因不包括
- A. 囊壁薄
 - B. 可能存在多发病灶
 - C. 同一病灶内有多个囊腔
 - D. 可能存在子囊
 - E. 囊肿内有角化物

正确答案：E

472. 颈外动脉的描述，错误的是

- A. 开始在颈内动脉前内侧，继而转到前外侧
- B. 来源于颈总动脉
- C. 在颈部有一系列分支
- D. 上行于腮腺的浅面，形成终支(颞浅动脉)
- E. 暂时阻断颈外动脉，颞浅动脉和面动脉均无波动

正确答案：D

473. 关于牙本质的形成，正确的是

- A. 其矿化形态是层板状钙化
- B. 先形成牙釉质，后形成牙本质
- C. 其矿化是由牙乳头细胞完成的
- D. 牙本质基质主要是III型胶原
- E. 在成牙本质细胞层和矿化牙本质之间总有一层有机基质

正确答案：E

474. X 线头颅定位片描绘图中表现上颌对颅底的位置关系是角度
角度角度角度

角度

正确答案：A

475. 我国法定的传染病分为A. 甲. 乙. 丙三类 34 种
B. 甲. 乙. 丙三类 35 种
C. 甲. 乙. 丙三类 36 种
D. 甲. 乙. 丙三类 37 种
E. 甲. 乙. 丙三类 38 种 正确答案: D

476. 孕妇于妊娠早期患重症肝炎, 正确的处理应是A. 药物治疗重症肝炎
B. 肝炎好转后继续妊娠C. 先行人工流产术
D. 治疗肝炎的同时行人工流产术
E. 治疗肝炎待病情好转行人工流产术 正确答案: E

477. 不符合舌损伤的缝合要求是A. 保持舌的长度
B. 小针细线缝合C. 边距稍大
D. 缝得深些, 多带些组织E. 最好加褥式缝合
正确答案: B

478. 儿童颌骨和牙弓主要生长发育期是A. 新生儿期
B. 婴儿期C. 幼儿期
D. 混合牙列阶段 E. 年轻恒牙列阶段 正确答案: D

479. 颞下颌关节成形术后开口练习应于何时开始A. 一般术后 7-10 天
B. 一般术后 1 个月C. 一般术后半年 D. 一般术后 3 个月E. 即刻
正确答案: A

480. 带蒂皮瓣断蒂一般在第一次手术后多长时间进行天
天

~21 天
~30 天
~40 天
正确答案: C

481. 以下关于念珠菌性口角炎说法不正确的是A. 以湿白糜烂为特征
B. 念珠菌性口角炎常为双侧罹患
C. 年长患者的口角炎多与咬合垂直距离缩短有关D. 儿童在寒冷的冬季常发生
E. 常并发舌炎. 唇炎. 阴囊炎 正确答案: E

482. 下列哪项细胞因子具有下调免疫功能的作用

483. C. 局部理疗D. 口服镇静剂
E. 不作特殊处理 正确答案: E

484. 单纯涎石摘除术适应于
. A. 涎石发生于下颌第二磨牙以前B. 涎石在腺体和导管交接处
C. 涎石在腺体, 腺体无纤维化D. 涎石在腺体, 腺体纤维化 E. 导管与腺体都有涎石
正确答案: A

485. 先天性龈瘤的主要组成细胞是A. 炎症细胞
B. 上皮细胞C. 颗粒细胞D. 黏液细胞E. 肌细胞
正确答案: C

486. 患者, 男性, 69 岁, 右侧面部及口唇出现群集分布的水疱, 伴有剧痛, 下列治疗不当的是
A. 免疫增强治疗B. 抗病毒治疗
C. 首选肾上腺皮质激素D. 抗感染治疗
E. 局部消炎止痛 正确答案: C

487. 以下与口腔黏膜下纤维化发生关系最为密切的因素是
A. 咀嚼槟榔B. 喜食辣椒C. 酗酒
D. 过量吸烟E. 全身因素 正确答案: A

488. 某患者前牙唇侧龈乳头增大表面呈颗粒结节样改变, 该患者有癫痫病史, 长期服用苯妥英钠。镜下观: 纤维结缔组织增生, 粗大的胶原束类似瘢痕组织结构, 炎症不明显。该疾病可诊断为
A. 慢性龈炎 B. 慢性牙周炎C. 龈增生
D. 浆细胞龈炎
E. 急性坏死性溃疡性龈炎 正确答案: C

489. 复合性创伤患者出现下列情况。应首先抢救A. 休克
B. 开放性气胸C. 昏迷
D. 四肢开放性伤口E. 肾挫裂伤
正确答案: B

490. 患者, 女性, 70 岁, 急性心梗。查血压 83/60mmHg, 中心静脉压(20cmH₂O), 应首先采取哪项措施
A. 应用毛花苷丙B. 应用呋塞米 C. 应用激素
D. 适当补液

E. 继续观察 正确答案: D

491. 患者, 男性, 26 岁, 十二指肠残端瘘 20 天。目前进食少, 全身乏力, 直立

时晕倒。血清 $K^{+}3\text{mmol/L}$ ， $Na^{+}125\text{mmol/L}$ 。其水盐代谢失调应为

- A. 高钾血症，重度低渗性缺水
- B. 低钾血症，高渗性缺水
- C. 低钾血症，等渗性缺水
- D. 低钾血症，中度低渗性缺水
- E. 低渗性缺水

正确答案：D

492. 大面积皮肤剥脱伤需

- A. 清创及一期缝合
- B. 清创后不予缝合
- C. 清创及植皮
- D. 清创后缝合
- E. 清创后不植皮

493. 下列关于病历资料说法正确的是

- A. 医疗机构应按要求书写病历资料并交由患者或其家属保管
- B. 因抢救急危患者，未及时书写病历的要在抢救结束后 12 小时内据实补记
- C. 医务人员书写病历时可以涂改
- D. 发生医疗事故争议时，可封存病历资料的复印件
- E. 病历资料不包括会诊意见

正确答案：D

494. 很少引起 AIDS 患者机会性感染的病原体是

- A. 巨细胞病毒
- B. 卡氏肺孢子菌

病毒

D. 弓形虫

E. 新型隐球菌

正确答案：C

495. 某患者前牙唇侧龈乳头增大表面呈颗粒结节样改变，该患者有癫痫病史，长期服用苯妥英钠。镜下观：纤维结缔组织增生，粗大的胶原束类似瘢痕组织结构，炎症不明显。该疾病可诊断为

- A. 慢性龈炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 龈增生
- D. 浆细胞龈炎
- E. 急性坏死性溃疡性龈炎

正确答案：C

496. 牙周脓肿发生的部位一般

- A. 牙周袋
- B. 坏死牙髓
- C. 接近龈缘
- D. 接近龈颊沟
- E. 牙龈炎

正确答案：C

497. 目前发现的能与乳牙牙根同步吸收的充填材料是

- A. 丁香油氧化锌糊剂
- B. 氧化锌碘仿糊剂
- C. 氢氧化钙碘仿糊剂
- D. 抗菌药糊剂
- E. 以上都不是

正确答案：E

498. 患者，女性，34 岁，321123 拥挤，前牙深覆牙合。深覆盖，1 唇向移位。此患者需要调牙合的最可靠依据是

- A. 前牙深覆牙合拥挤

- C. 前牙深覆盖 D. 预防性调牙合
E. 前伸牙合时有早接触 正确答案：E

499. 颞下颌关节的功能单位主要是

- A. 髁突后斜面与关节盘双板区及关节窝后斜面 B. 髁突顶部与关节盘后带及关节窝中央
C. 髁突前斜面与关节盘前带及关节结节后斜面 D. 髁突前斜面与关节盘中间带及关节结节后斜面 E. 髁突前斜面与关节盘中间带及关节结节前斜面 正确答案：D

500. 医患关系的本质特征是 A. 具有互利性质的经济关系 B. 具有买卖性质的依附关系 C. 具有协作性质的买卖关系 D. 具有依附性质的非平等关系 E. 具有契约性质的信托关系 正确答案：E

501. 维生素D 缺乏性手足搐搦症发生惊厥是由于

- A. 血钾浓度降低 B. 血钠浓度降低 C. 血钙浓度降低 D. 血磷浓度降低 E. 血镁浓度降低

正确答案：C

502. 罩牙本质和透明层内侧的牙本质称为 A. 前期牙本质

- B. 继发牙本质 C. 球间牙本质 D. 透明牙本质 E. 髓周牙本质 正确答案：E

503. 患者，男性，56 岁，右腮腺区渐进性增大肿块，界限清楚，无其他不适。镜下见肿瘤细胞形成导管，实性片块，黏液样和软骨样结构，部分区瘤细胞异型，偶见核分裂。上皮与黏液样组织互相移行，肿瘤有包膜但不完整，且肿瘤细胞浸润包膜。上述所见符合

- A. 多形性腺瘤 B. 黏液表皮样癌
C. 多形性腺瘤，有恶变倾向 D. 多形性低度恶性腺癌 E. 肌上皮癌

正确答案：C

504. 患儿，女，8 岁，左上第二乳磨牙深龋洞，探诊敏感，去龋后未露髓。若窝洞去龋时发现近髓腔处有一个透红点，探痛，首选治疗方案

- A. 盖髓术
B. 根管治疗术 C. 再矿化术
D. 根尖诱导成形术 E. 拔除术

正确答案：B

505. 患者，女性，45 岁，右侧颊黏膜一蓝黑色肿块 1 个月，查体：右侧颊部有一直径约的蓝黑色圆形肿块，表面有破溃，右颌下淋巴结肿大。

该病的诊断最可能是

- A. 色素痣 B. 黏膜黑斑 C. 黑棘皮病
D. 恶性黑色素瘤

E. 多发性神经纤维瘤 正确答案: D

506. 关于三叉神经痛的临床表现描述错误的是
A. 发作多在白天
B. 疼痛如电击, 针刺或撕裂样剧痛
C. 多可自行痊愈
D. 两次发作之间无任何疼痛症状
E. 患者常有拔牙史
正确答案: C

507. 一个 3 岁的男孩, 在常规检查口腔情况时, 发现所有乳牙均已萌出, 并且已建立咬合关系, 临床检查发现下列 4 种情况, 哪一种是不符合这一年龄段牙合关系的特点
A. 切缘和牙合面没有明显的磨耗
B. 牙齿排列较紧密
C. 上下颌的乳磨牙有袷接触
D. 下颌第二乳磨牙在上颌第二乳磨牙的近中达一个牙尖
E. 下颌第二乳磨牙与上颌第二乳磨牙的远中面平齐
正确答案: D

508. 关于机体水钠代谢失调。下列叙述正确的是
A. 脱水就是指水分的减少
B. 低渗性脱水时尿钠可以消失
C. 各种原因引起的脱水都使体重减轻
D. 高渗性脱水的治疗应以补盐为主
E. 重度等渗性脱水需大量补液时以生理盐水为宜

正确答案: B

509. 牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后周周
周周
~3 个月个月标准
正确答案: D

510. 患者, 男性, 46 岁, 体重 60kg, 因急性肠梗阻 3 天入院, 诉口渴, 全身乏力, 不能起坐。查: 脉搏 100 次/分, 血压 100/60mmHg, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 发病后未进食, 24 小时尿量 1000ml。入院后查: 血红蛋白 170g/L, 红细胞比容 53%, 血清钠 134mmol/L, 血清钾 L, 尿比重。动脉血气分析: , , /L。当日液体治疗宜用
A. 平衡液 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%碳酸氢钠 150ml
B. 平衡液 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 30ml, 5%碳酸氢钠 500ml
C. 平衡液 2000ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%糖盐水 500ml
D. 平衡液 1000ml, 5%葡萄糖 3000ml, 5%糖盐水 500ml, 5%碳酸氢钠 150ml
E. 生理盐水 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%碳酸氢钠 150ml
正确答案: B

511. 新生儿溶血病如需要换血疗法的A. 由患儿家属申请并签字同意
B. 由经治医师申请并经患儿家属签字同意C. 由经治医师申请并经主治医师批准
D. 由主治医师申请并经患儿监护人同意 E. 由主治医师申请并经患儿家属签字同意
正确答案： B

512. 有关龋病活跃性的检测。不正确的是A. 测定机体对龋病的敏感度
B. 可用于个体或群体
C. 反映机体龋坏程度的现状D. 预测龋病进展的状况
E. 诊断龋病正确答案： E

513. 下面哪项不是义齿就位困难的原因A. 基托进入倒凹区
B. 卡环臂进入倒凹区C. 卡环体进入倒凹区D. 支托位置不当
E. 义齿变形正确答案： B

514. HSV-2 可引起
A. 宫颈癌肉瘤
C. 原发性肝细胞癌淋巴瘤
E. 白血病
正确答案： A

515. ~临床上应注意根尖距离上颌窦最近的牙是
~A. 上颌第一前磨牙B. 上颌第二前磨牙C. 上颌第一磨牙
D. 上颌第二磨牙E. 上颌第三磨牙正确答案： C

516. 受累
621

517. 患病后可以完全免疫，很少复发的疾病是A. 单纯疱疹
B. 带状疱疹
C. 口腔扁平苔藓D. 口腔念珠菌病
E. 复发性阿弗他溃疡正确答案： B

518. 唾液腺恶性肿瘤发生率相对较高的是A. 腮腺
B. 舌下腺C. 腮腺
D. 下颌下腺E. 唇腺
正确答案： B

519. 面神经的分支有
A. 眼神经. 上颌神经. 下颌神经. 颊神经. 颈神经B. 眼神经. 耳颞神经. 颊神经. 下颌神经. 颈神经C. 眼支. 上颌支. 下颌支. 下颌缘支. 颈支
D. 颞支. 颧支. 颊支. 下颌缘支. 颈支 E. 颞支. 颧支. 颊支. 下颌下支. 舌下支正确答案：

D

520. • 乳牙龋多见的好发牙面，以下正确的是A. 上颌乳中切牙近中面
B. 上颌第一乳磨牙远中面C. 下颌乳尖牙近远中面 D. 下颌第二乳磨牙远中面E. 下颌第一乳磨牙远中面

正确答案：A

521. 引起口角炎的因素不包括A. 细菌感染
B. 营养不良C. 霉菌感染D. 创伤
E. 寒冷刺激正确答案：E

522. DC 的组织分布不包括
A. 脑 B. 体腔C. 皮肤
D. 淋巴结E. 肝脏
正确答案：A

523. 以下关于桩冠时冠桩长度的说法中，不正确的是A. 不破坏根尖封闭的情况下应该尽量长
B. 至少达根长的 4/

524. 与光照密切相关的唇炎是A. 腺性唇炎
B. 慢性唇炎
C. 肉芽肿性唇炎 D. 变态反应性唇炎E. 以上都不是
正确答案：E

525. 免疫组织化学染色中淀粉酶阳性的唾液腺肿瘤是A. 多形性腺瘤
B. 嗜酸性腺瘤 C. 腺样囊性癌 D. 腺泡细胞癌 E. 黏液表皮样癌正确答案：D

526. DC 的组织分布不包括
A. 脑 B. 体腔C. 皮肤
D. 淋巴结E. 肝脏
正确答案：A

527. 足月儿生后第 1 小时内呼吸频率约是次/分
次/分次/分次/分次/分
正确答案：C

528. 患者，男性，24 岁，主诉晨起时枕头上有血迹，牙龈有自发-陛出血. 疼痛及

腐败性口臭 2 天。
患者首诊时，最佳处理措施是

- A. 牙周彻底洁治后，3%过氧化氢冲洗
 - B. 去除大块的牙石及坏死物，3%过氧化氢冲洗
 - C. 口服抗生素及维生素C
 - D. 保守治疗，查血确诊
- %过氧化氢含漱 1 周
正确答案：B

529. 上皮异常增生可表现下列变化。除了
A. 上皮基底细胞极性消失
B. 基底细胞液化变性
C. 上皮钉突呈滴状
D. 有丝分裂象增加
E. 细胞核浓染
正确答案：B

530. 颌间结扎的患者用吸管进流食，流食主要经何种途径自口腔前庭进入固有口腔
A. 牙合间隙
B. 牙间隙
C. 舌下间隙
D. 翼下颌皱襞与最后磨牙之间的间隙
+B
正确答案：D

531. 造成铸造全冠就位困难的原因不包括
A. 石膏代型磨损
B. 蜡型蠕变变形
C. 间隙涂料涂得过厚
D. 牙颈部肩台不整齐
E. 铸造冠缘过长
正确答案：C

532. 涎石病的典型症状是
A. 炎症症状
B. 阻塞症状
C. 口干症状
D. 神经症状
E. 全身症状
正确答案：B

533. 患者，男性，52 岁，有溃疡病史并经常发作，现患者体温 $^{\circ}\text{C}$ ，需要解热药，选用下列药物中的哪一种比较好
A. 阿司匹林
B. 对乙酰氨基酚
C. 吲哚美辛
D. 保泰松
E. 布洛芬
正确答案：B

534. 经典精神分析疗法常用的技术是
A. 暴露疗法
B. 识别负性自动想法
C. 自由联想
D. 逐步接近法
E. 自我管理法
正确答案：C

535. 患者，男性，36岁，左面部肿胀3年。无任何不适。近期引起面部畸形，牙齿移位咬合错乱。X线片示左上颌骨局限性膨胀，骨密度降低，其中可见不规则钙化。最可能诊断是

A. 成釉细胞瘤 B. 牙骨质瘤

C. 牙瘤

D. 颌骨囊肿 E. 骨化纤维瘤 正确答案：E

536. 下唇囊肿直径约1cm，镜下见囊肿无衬里上皮，由炎性肉芽组织和结缔组织包绕，其中见大量泡沫细胞。最可能的病理诊断是

A. 潴留性黏液囊肿

B. 外渗性黏液囊肿 C. 鳃裂囊肿

D. 鼻唇囊肿 E. 表皮样囊肿 正确答案：B

537. 患者，男性，18岁，左上中切牙变色唇颊沟肿胀伴瘻道。X线显示根尖阴影约2cm

大小。边缘整齐，无骨质增强影。最可能的诊断是

A. 鼻腭囊肿 B. 含牙囊肿 C. 球上顿囊肿

D. 上颌正中囊肿 E. 根端囊肿

正确答案：E

538. 恒牙建牙合的关键时期是 A. 新生儿期

B. 婴儿期 C. 幼儿期

D. 混合牙列阶段 E. 年轻恒牙列阶段 正确答案：D

539. 翼腭间隙向下通口腔的途径结构是 A. 蝶腭孔

B. 眶下裂 C. 翼腭管 D. 圆孔

E. 翼上颌裂 正确答案：C

540. 瘻孔中长期排脓且有时可排出死骨片的颌骨骨髓炎是 A. 中央性颌骨骨髓炎急性期

B. 中央性颌骨骨髓炎慢性期 C. 边缘性颌骨骨髓炎增生型

D. 边缘性颌骨骨髓炎溶解破坏型 E. 新生儿颌骨骨髓炎

正确答案：B

541. 龈炎患者菌斑内优势菌是 A. 普氏菌

B. 梭形杆菌 C. 弯曲菌 D. 放线菌 E. 链球菌

正确答案：D

542. 小儿语言发育三个阶段的顺序是 A. 发音. 理解. 表达

B. 理解. 表达. 发音 C. 表达. 理解. 发音 D. 听觉. 发音. 理解 E. 模仿. 表达. 理解

正确答案：A

543. 以下哪一种疾病愈合后一般不留瘢痕A. 腺周口疮
B. 带状疱疹
C. 白塞病中的生殖器溃疡D. 口腔黏膜纤维性变
E. 褥疮性溃疡 正确答案: B

544. 脓肿局部切开引流的目的不包括
A. 解除局部疼痛. 肿胀及张力, 以防发生窒息
B. 使脓液和腐败坏死物迅速排出体外, 以达消炎解毒的目的C. 颌周间隙脓肿引流, 以免并发边缘性骨髓炎
D. 预防感染向颅内和胸腔扩散或侵入血循环E. 便于局部使用抗炎药物
正确答案: E

545. 患者, 女性, 32 岁, 主诉: 牙龈自动出血伴牙龈疼痛. 腐败性口臭 3 天。未发烧。有 2 年吸烟史。检查: CI-S 为 3. 龈缘呈虫蚀状, 表面覆盖坏死假膜。其最可能的诊断是A. 慢性牙周炎
B. 急性坏死性溃疡性龈炎C. 慢性龈缘炎
D. 疱疹性龈口炎 正确答案: B

546. 以下关于铸金球说法哪项是错误的A. 可避免铸件缩孔
B. 直径略大于铸件蜡型最厚处C. 补偿铸金冷却后体积的收缩D. 位置距蜡型 1mm
E. 应在铸圈温度中心区 正确答案: D

547. 在以下关于沟固位形的说法中错误的是A. 深度一般为 1mm
B. 可抗水平脱位和牙合向脱位C. 分有肩台式和无肩台式
D. 对修复体有加固作用E. 与就位道方向一致

正确答案: D

548. 可激动骨骼肌 N₂ 受体的药物是
A. 毛果芸香碱B. 新斯的明
C. 氯琥珀胆碱D. 毒扁豆碱 E. 筒箭毒碱 正确答案: B

549. 患者, 男性, 58 岁, 舌左侧缘可见 1cmX1cm 大小的溃疡, 3 个月未愈合, 溃疡边缘稍隆起, 不整齐。底部见桑葚样肉芽肿, 结核菌素试验阳性。治疗上应选择

- A. 庆大霉素和红霉素B. 苄星青霉素
C. 头孢曲松钠
D. 链霉素和异烟肼E. 环孢素

正确答案: D

550. 口腔种植学的指导理论是A. 骨结合理论
B. 纤维结合理论C. 微创理论
D. 骨牵张理论E. 骨粘连理论正确答案：A

551. 关于早期釉质龋表层，错误的说法是A. 与正常釉质较为相似
B. 脱矿程度明显较病损体部低C. 孔隙容积约占釉质体积的 5%
D. 与再矿化现象有关
E. 约出现在 50%的病例中正确答案：E

552. 患者，女性，45 岁，右侧颊黏膜一蓝黑色肿块 1 个月，查体：右颊部有一直径约的蓝黑色圆形肿块. 表面有破溃，右颌下淋巴结肿大。
该病应采取的主要治疗手段是

A. 手术治疗B. 化学治疗C. 免疫治疗D. 放射治疗E. 冷冻治疗正确答案：A

553. 整复手术的目的是A. 恢复外形与功能
B. 预防心理疾病C. 恢复功能
D. 提高生存质量E. 恢复外形
正确答案：A

554. 对根分叉区病变治疗效果影响最小的因素是A. 根的数量
B. 根分叉的位置 C. 患牙的龋坏程度D. 根面凹槽
E. 骨破坏程度正确答案：C

555. 不能补充血糖的代谢过程是

A. 肌糖原分解B. 肝糖原分解C. 糖异生作用D. 糖类食物
E. 肾小管上皮细胞的重吸收作用正确答案：A

556. 一名 25 岁的非洲男子患有镰状细胞贫血，其发病原因是血红蛋白一级结构发生了改变。正常血红蛋白(Hb)具有运输 O₂ 的功能，当第一个 O₂ 与 Hb 结合后可引起 Hb 构象变化，导致其他氧的快速结合，这种现象称为
A. 变构激活 C. 协同效应 E. 以上都不是B. 变构抑制 D. 变构效应正确答案：C

557. /

558. 有关龋病活跃性的检测。不正确的是A. 测定机体对龋病的敏感度
B. 可用于个体或群体
C. 反映机体龋坏程度的现状D. 预测龋病进展的状况
E. 诊断龋病正确答案：E

559. 患者，男，8 岁，乳磨牙不同程度龋坏，考虑的治疗方法不可能是

A. 药物治疗B. 充填治疗C. 嵌体修复

D. 金属成品冠修复

E. 对患儿及家长进行口腔卫生宣传正确答案：E

560. 下列哪种微生物不能使人或动物致病A. 螺旋体
型细菌 C. 噬菌体D. 衣原体E. 支原体

正确答案：C

561. 医患关系的性质是

A. 医患关系是一般的契约关系B. 医患关系是纯粹的信托关系

C. 医患关系是在信托关系基础上的契约关系D. 医患关系是信托关系就不是契约关系

E. 医患关系是契约关系就不是信托关系正确答案：C

562. 患者，男性，32岁，6天前感冒后出现左下后牙区胀痛，进食、吞咽时加重。昨日起出现局部自发性跳痛，张口受限，低热，头痛。检查可见：左下颌角区颊部稍肿胀，无压痛，张口度两指。左下第三磨牙近中阻生牙龈红肿充血，挤压可见远中盲袋内少量脓液溢出，颊侧前庭沟丰满、充血。压痛明显。叩诊(一)，无松动。咽侧壁稍充血，无压痛。

此患者的正确诊断为

A. 根尖周脓肿

B. 左咬肌间隙感染C. 急性根尖周炎 D. 急性智齿冠周炎E. 左咽旁间隙感染正确答案：D

563. 一患者不慎摔伤面部，临床检查及X线片提示下颌骨体部骨折。患者的治疗以下哪一项最合理

A. 复位牙及牙槽骨B. 单颌固定

C. 仅缝合软组织D. 坚强内固定 E. 不做处理

正确答案：D

564. 舌体起源于A. III对鳃弓

B. II对鳃弓C. IV对鳃弓 D. 对鳃弓 E. II、III对鳃弓正确答案：D

565. 恒尖牙萌出困难多与哪种情形有关A. 牙瘤

B. 额外牙

C. 先行的乳牙过早脱落D. 含牙囊肿

E. 牙龈坚韧肥厚正确答案：C

566. 有关窝沟封闭正确的观点是A. 乳磨牙不做窝沟封闭

B. 只需对第一恒磨牙做窝沟封闭C. 只要有窝沟就可以做窝沟封闭D. 成年人不需要

做窝沟封闭

E. 患有畸形舌尖的前牙不需做窝沟封闭 正确答案：C

567. 患者，女性，38岁，剑突下阵发性绞痛，起病急骤伴有寒战高热并出现黄疸，右上腹压痛。首先考虑

A. 急性胰腺炎 B. 急性胆囊炎 C. 胆囊结石 D. 胆道蛔虫 E. 胆总管结石 正确答案：E

568. 女，36岁，主诉牙龈胀痛。检查：5与4之间牙龈乳头发红肿胀，探诊出血，未探及釉牙骨质界；4近中邻面的银汞充填体有悬突。关于此病的临床疼痛，下面说法哪一项是正确的

A. 与冷热刺激无关
B. 月经期可感疼痛加重 C. 夜间痛明显
D. 无叩痛
E. 无明显的探触痛 正确答案：B

569. 绒毛膜癌主要播散的方式 A. 淋巴转移和种植
B. 血行转移和淋巴转移 C. 直接蔓延和种植
D. 直接蔓延和淋巴转移 E. 血行转移
正确答案：E

570. 患者，女性，45岁，慢性牙周炎史多年，昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛，夜间

加重，手持冷水瓶就诊。检查：右下第一磨牙II度松动，叩诊(+)，颊侧牙周袋6mm。为了进一步确诊，还需要进行哪一项检查
A. 麻醉测验 B. 冷测验 C. 热测验
D. 染色法测验 E. 咬诊法测验 正确答案：C

571. 者，男性，62岁。自觉牙龈出血。牙齿松动半年余。检查：CI-S：3，多个牙松动度在I-II度之间，牙龈红肿。探易出血，牙周袋深3-5mm。如该患者口腔内有种植体修复，则种植牙定期洁治的间隔时间最好为个月个月个月个月
正确答案：E

572. 口腔颌面部不易早期发现的肿瘤是 A. 腮腺浅叶肿瘤
B. 下颌下腺肿瘤 C. 硬腭肿瘤
D. 舌根部肿瘤 E. 舌下腺肿瘤 正确答案：D

573. 以下关于游离皮片移植的叙述错误的是
A. 按皮肤厚度分为表层皮片、中厚皮片及全厚皮片 3种
B. 中厚皮片包括表皮及真皮全层

C. 面颈部植皮多采用全厚或厚中厚皮片

D. 皮片愈薄生活力愈强，移植后收缩愈大

E. 有感染的肉芽创面或骨面只能采用刃厚皮片移植正确答案：B

574. 患儿，10岁，半个月以来右下后牙自发痛，持续痛，不能咬物2日。检查：4情出2

/3，无龋，叩(++)，松Ⅱ度，牙龈红肿，X线示髓角尖细。根发育畸形。病因可能是

A. 磨耗B. 隐裂C. 创伤

D. 畸形中央尖折断E. 逆行性感染

正确答案：D

575. 对提高全口义齿固位和稳定意义最小的是A. 准确印模

B. 有利的磨光面形态C. 合理的排牙

D. 尽量扩大基托面积

E. 指导患者正确使用义齿正确答案：E

576. 青少年期心理卫生的重点是A. 接受现实确立奋斗目标

B. 发展良好的自我意识C. 消除心理代沟

D. 性心理和生理健康. 性道德和法制教育E. 以上都正确

正确答案：E

577. 现代医学伦理学中。对生命的看法已转变为A. 生命质量论

B. 生命神圣论C. 生命价值论

D. 生命质量与生命价值相统一的理论

E. 生命神圣与生命质量. 生命价值相统一的理论正确答案：E

578. 下唇囊肿直径约，镜下见囊肿无衬里上皮，由炎性肉芽组织和结缔组织包绕，其中见大量泡沫细胞。最可能的病理诊断是

A. 潴留性黏液囊肿B. 外渗性黏液囊肿C. 鳃裂囊肿

D. 鼻唇囊肿 E. 表皮样囊肿正确答案：B

579. 颌骨囊肿的发生率高于身体其他骨，是由于A. 咬合关系

B. 有牙根存在

C. 龋病的发病率高D. 复杂的胚胎发育E. 颌骨内有埋伏牙正确答案：D

580. 最多出现畸形中央尖的牙齿是A. 上颌第一前磨牙

B. 下颌第一前磨牙C. 上颌第二前磨牙D. 下颌第二前磨牙E. 上颌侧切牙

正确答案：D

581. 患者，男，因牙齿松动半年就诊。无全身疾病，未接受过牙科治疗，如诊断为广泛型侵袭性牙周炎，年龄通常在

岁左右岁以下岁以上岁以下. 岁以下

正确答案: D

582. 患者, 男性, 46 岁, 体重 60kg, 因急性肠梗阻 3 天入院, 诉口渴, 全身乏力, 不能起坐。查: 脉搏 100 次/分, 血压 100/60mmHg, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 发病后未进食,

24 小时尿量 1000ml。入院后查: 血红蛋白 170g/L, 红细胞比容 53%, 血清钠

134mmol/L, 血清钾 L, 尿比重。动脉血气分析: , , /L。当日液体治疗宜用A.

平衡液 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%碳酸氢钠 150ml

B. 平衡液 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 30ml, 5%碳酸氢钠 500ml

C. 平衡液 2000ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%糖盐水 500ml

D. 平衡液 1000ml, 5%葡萄糖 3000ml, 5%糖盐水 500ml, 5%碳酸氢钠 150ml

E. 生理盐水 1500ml, 5%葡萄糖 2000ml, 10%氯化钾 40ml, 5%碳酸氢钠 150ml

正确答案: B

583. 磷酸戊糖途径又称为磷酸葡萄糖酸旁路, 产生 ATP 供能不是其主要功能, 它的主要功能是生成

磷酸果糖和NADPH++H+ 磷酸核糖和NADH++H+ 磷酸甘油醛和NADH++H+ 磷酸核糖和NADPH++H+

磷酸葡萄糖酸和 NADH++H+

正确答案: D

584. 医师进行实验性临床医疗, 应当A. 经医院批准或患者本人同意

B. 经医院批准或患者家属同意C. 征得患者本人或其家属同意

D. 经医院批准并征得患者本人或者其家属同意E. 经医院批准或征得患者本人及其家属同意 正确答案: D

585. 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素是A. 雌二醇

B. 雌酮 C. 雌三醇D. 孕酮 E. 睾酮

正确答案: C

586. 维生素D 缺乏病时由骨样组织增生所致的骨骼改变为

A. 方颅

B. 肋膈沟(赫氏沟) C. 鸡胸或漏斗胸

D. “O”形腿或“X”形腿E. 脊椎后突或侧弯

正确答案: A

587. 一患者双侧髌突颈部骨折, 关于其临床表现的描述不正确的是A. 下颌升支向后上移位, 前牙开牙合

- B. 下颌不能前伸运动
 - C. 严重的肿痛和功能障碍
 - D. 侧方运动不受限
 - E. 合并不同程度的脑震荡
- 正确答案：D

588. 下列关于遗传性牙龈纤维瘤说法正确的是

- A. 牙龈增生广泛
 - B. 患者可有家族史
 - C. 一般开始于恒牙萌出后
 - D. 可累及全口牙的龈缘、龈乳头和附着龈，甚至到膜龈联合处
 - E. 以上都是
- 正确答案：E

589. 患者，女性，36岁，因口腔黏膜反复起水疱1年多就诊，起疱与进食无关，水疱可破溃形成溃疡。检查：下唇内侧黏膜有直径5mm的水疱，探针无法伸入水疱周围的黏膜下方，涂片未见Tzanck细胞。

本病的最好发部位是

- A. 颊
 - B. 唇
 - C. 牙龈
 - D. 舌
 - E. 硬腭
- 正确答案：C

590. 上颌神经阻滞麻醉二次进针的方向正确的是

- A. 向后 10°，向下 15°
 - B. 向上 10°，向前 15°
 - C. 向下 10°，向前 15°
 - D. 向下 10°，向后 15°
 - E. 向上 10°，向后 15°
- 正确答案：B

591. 选择固定桥基牙的最低限度是

592. 患者，男性，70岁，6因慢性牙髓炎就诊。根管预备过程中发现4个根管均狭小，15号根管锉难以进入根尖1/3。可行的治疗方案是

- A. 干髓治疗
 - B. 根尖倒封闭术
 - C. 空管治疗
 - D. 塑化治疗
 - E. 拔除患牙
- 正确答案：D

593. 关于牙本质的形成，正确的是

- A. 其矿化形态是层板状钙化
 - B. 先形成牙釉质，后形成牙本质
 - C. 其矿化是由牙乳头细胞完成的
 - D. 牙本质基质主要是III型胶原
 - E. 在成牙本质细胞层和矿化牙本质之间总有一层有机基质
- 正确答案：E

594. 味蕾

- A. 数目最多，舌尖部较多，体积较小，略呈锥体状
- B. 体积最大，约10个左右，沿界沟的前方排列成一行
- C. 位于舌侧缘的后部，在人类仅有5-8条平行的皱襞

- D. 呈卵圆形，为味觉感受器
E. 数目较少，色较红，呈蕈状，顶端圆形 正确答案：D

595. 猛性龋与下列因素有关，但应除外（）

- A. 接受头颈部放射治疗后综合征病人 C. 唾液中变异链球菌计数高 D. 口腔卫生良好
E. 唾液缓冲能力差

正确答案：D

596. 穿行于腮腺内的血管是 A. 颈内动脉

B. 颈外动脉

C. 颈外静脉 D. 面动脉 E. 舌动脉

正确答案：B

597. 代谢性碱中毒

降低， p_{t1} 降低， P_{aCO_2} 正常升高，pH 降低， P_{aCO_2} 正常正常，pH 降低， P_{aCO_2} 升高正常，pH 降低， P_{aCO_2} 降低降低，pH 升高， P_{aCO_2} 降低 正确答案：E

598. 关于牙周炎预后的影响因素。下列哪项不正确 A. 牙齿松动情况

B. 牙槽骨吸收程度 C. 牙周炎类型

D. 牙龈退缩程度 E. 患者依从性 正确答案：D

599. 眶下神经阻滞麻醉口外注射法进针方向是 A. 注射针与皮肤成 60。角，向上。后。外进针

B. 注射针与皮肤成 45。角，向下。后。外进针

C. 注射针与皮肤成 45。角，向上。后。外进针

D. 注射针与皮肤成 45。角，向上。后。内进针

E. 注射针与皮肤成 60。角，向上。后。内进针 正确答案：C

600. 下列药物中不常用于单纯疱疹病毒感染治疗的是 A. 利巴韦林

B. 阿昔洛韦 C. 聚肌胞 D. 泼尼松 E. 胸腺素

正确答案：D

601. 以下关于单纯疱疹病毒感染描述不正确的是 A. 全世界约 1/3 以上的人群曾被感染

B. 主要通过飞沫、唾液传播

C. 随着接受器官移植、肿瘤放化疗、受 HIV 感染人群的增加，HSV-1 的患病率不断增高

D. 单纯疱疹病毒为中等大小球形、有核衣壳和脂蛋白包膜的 RNA 病毒

E. 口腔、皮肤、眼、会阴、神经系统等是易受侵犯的部位 正确答案：D

602. 患者肿瘤放化疗后出现口腔黏膜充血糜烂，覆盖灰白色假膜，可拭去，伴口

角炎，舌背乳头团块状萎缩，味觉丧失，觉得黏膜干燥，灼痛。最可能的诊断是
A. 急性假膜型念珠菌性口炎 B. 急性红斑型念珠菌性口炎 C. 慢性红斑型念珠菌性口炎
D. 慢性肥厚型念珠菌性口炎 E. 慢性黏膜皮肤念珠菌病 正确答案：B

603. Mongolism 是指综合征

- B. 掌跖角化一牙周破坏综合征 C. 白细胞功能异常
- D. 艾滋病
- E. 坏死性溃疡性牙周炎 正确答案：A

604. 患者，男，因牙龈出血半年就诊。如果该患者左下第一磨牙为种植体修复，该种植牙的探诊深度为 5mm，有脓液溢出，最佳的治疗方法是

- 刮治器清除种植牙周围的菌斑、牙石即可
- B. 选择合适的器械清除种植牙周围的菌斑、牙石外，还应使用氯己定治疗 C. 必须先进行机械治疗和应用氯己定，并全身使用抗生素
- D. 牙龈切除
- E. 引导性骨再生术治疗 正确答案：B

605. 颞下颌关节紊乱病可出现

- A. 颞下颌关节区及其周围疼痛，一般为非剧痛的钝痛
- B. 关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对牙合，稍用力即可引起关节区剧痛
- C. 颞下颌关节区及其周围疼痛，常伴有全身游走性、多发性关节炎，晚期可发生关节强直 D. 吞咽时咽部疼痛和感觉异常
- E. 阵发性点击样剧烈疼痛 正确答案：A

606. 同时麻醉颊神经、舌神经和下牙槽神经的穿刺部位是 A. 下颌孔

- B. 下颌神经沟 C. 下颌舌骨沟 D. 下颌隆突 E. 下颌小舌 正确答案：D

607. 面神经从茎乳孔穿出处，一般在乳突前缘相当于乳突尖上方约 正确答案：B

608. 下列哪一项不是药物性牙龈增生的发病特点 A. 前牙区较重

- B. 牙龈增生常发生于全口牙龈
- C. 无牙区的牙龈增生更加严重
- D. 拔牙后增生的牙龈组织可以自行消退 E. 增生的牙龈表面可呈分叶状或桑葚状 正确答案：C

609. 医疗侵权赔偿责任中，医疗过错的认定标准是 A. 未尽到分级诊疗义务

- B. 未尽到先行垫付义务 C. 未尽到健康教育义务 D. 未尽到主动协商义务
- E. 未尽到与当时的医疗水平相应的义务 正确答案：E

610. 以下各类口腔黏膜疾病中。发病率最高的是 A. 斑纹类疾病

- B. 感染性疾病
- C. 自身免疫性疾病 D. 唇舌疾病
- E. 溃疡类疾病 正确答案：E

611. 患者，女性，35 岁，昨日出现感冒症状，自行服用复方新诺明、阿司匹林等药物，今日发现舌背中央出现一个大面积的水疱，破裂后形成椭圆形的浅溃疡面。最可能的诊断是

- A. 扁平苔藓
 - B. 天疱疮
 - C. 药敏性口炎
 - D. 多形性红斑
 - E. 大疱性类天疱疮
- 正确答案：C

612. 以下哪项不是输血的禁忌证

- A. 充血性心力衰竭
- B. 急性肺水肿
- C. 恶性高血压
- D. 严重感染
- E. 肾衰竭

正确答案：D

613. 截根术前必须进行

- A. 根管治疗
- B. 牙髓活力测定
- C. 口服消炎药物
- D. 牙龈切除
- E. 局部用药

正确答案：A

614. 急性大量丧失消化液后，脉搏细速，肢端湿冷，血压下降，引起

- A. 低渗性缺水
- B. 等渗性缺水
- C. 高渗性缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

正确答案：B

615. 我国法定的传染病分为

- A. 甲、乙、丙三类 34 种
- B. 甲、乙、丙三类 35 种
- C. 甲、乙、丙三类 36 种
- D. 甲、乙、丙三类 37 种
- E. 甲、乙、丙三类 38 种

正确答案：D

616. 25 岁，初孕妇。末次月经 2012 年 3 月 10 日。于 2012 年 10 月 13 日就诊，检查宫底在脐上 2 横指，枕右前位，胎心率正常。现在应是

- A. 妊娠满 30 周，宫底高度符合正常情况
- B. 妊娠满 30 周，宫底高度低于正常
- C. 妊娠满 31 周，宫底高度符合正常情况
- D. 妊娠满 31 周，宫底高度低于正常
- E. 妊娠满 32 周，宫底高度低于正常

正确答案：D

617. 患者，女性，26 岁，主诉：近 1 年来，咀嚼硬物或刷牙时牙龈出血，若诊断为慢性龈缘炎，应该不会出现下列哪一种临床表现

- A. 严重时波及附着龈
- B. 牙龈炎症一般局限于游离龈和龈乳头
- C. 炎症以前牙区为主，也可波及全口牙
- D. 牙龈松软光亮
- E. 牙龈炎症以上前牙区最为显著

正确答案：E

618. 口腔颌面部不易早期发现的肿瘤是

- A. 腮腺浅叶肿瘤
- B. 下颌下腺肿瘤
- C. 硬腭肿瘤
- D. 舌根部肿瘤
- E. 舌下腺肿瘤

正确答案：D

619. 以下哪点不属于三角瓣法手术矫治单侧唇裂的缺点
A. 三角瓣嵌入上唇下 1/3, 有损正常解剖形态
B. 要切除部分正常的唇组织
C. 定点明确, 初学者易掌握
D. 在不完全唇裂常可发生患侧过长的现象

E. 完全唇裂患侧唇高常嫌不足
正确答案: E

620. 某人开口困难, 有走马疳史, X 线片示颞下颌关节强直。可能的诊断是

- ~A. 咀嚼肌痉挛
- B. 真性颞下颌关节强直
- C. 颌间瘢痕挛缩
- D. 破伤风性牙关紧闭
- E. 癔症

正确答案: C

621. 患儿, 5 岁, 双侧腮腺肿胀, 发热, 检查尿淀粉酶增高, 最可能的诊断是

- ~A. 舍格伦综合征
- B. 慢性化脓性腮腺炎
- C. 腮腺多型性腺瘤
- D. 流行性腮腺炎
- E. 急性化脓性腮腺炎

正确答案: D

622. 关于外科修整, 以下说法中错误的是

- A. 会给患者带来精神和经济负担
- B. 易造成承托面积减小
- C. 对骨吸收速度没有明显影响
- D. 与义齿能否成功恢复外形和功能有关
- E. 有利于义齿的固位和稳定

正确答案: C

623. 呈“十”字形发育沟的牙是

- A. 上颌第一磨牙
- B. 下颌第一磨牙
- C. 上颌第二磨牙
- D. 下颌第二磨牙
- E. 下颌第二前磨牙

正确答案: D

624. 下颌第一磨牙髓角的高度是

- A. 近中舌侧髓角最高
- B. 近中颊侧髓角最高
- C. 远中颊侧髓角最高
- D. 远中舌侧髓角最高
- E. 四个髓角高度相同

正确答案: A

625. 对建立正常的咬合关系起重要作用, 应尽量保留, 避免拔除的牙是

- A. 尖牙
- B. 第一前磨牙
- C. 第二前磨牙
- D. 第一磨牙
- E. 第二磨牙

正确答案: D

626. 患者, 男性, 26 岁, 舌部溃疡 1 个月。患者近 2 个月来。低热, 乏力, 盗汗。检查: 舌部右侧溃疡。较深, 约 1cm, 边缘不齐, 表面假膜。基底有细小的颗粒状结节, 触痛明显。为尽早作出诊断, 首选的检查方法为

- A. 血培养
- B. 胸透或胸片
- C. 标本动物接种
- D. 结核菌素试验
- E. 活检

正确答案: E

627. 年轻恒牙牙髓坏死较晚, 牙根停止发育晚。根端形态可能是

型型
型或B 型型
型

正确答案：C

628. 关于口腔颌面部间隙感染的描述错误的是A. 均为继发性
B. 有时也可为原发性
C. 多为牙源性或腺源性感染扩散所致D. 多为需氧和厌氧菌引起的混合感染
E. 化脓性炎症可局限于一个间隙内，也可波及相邻的几个间隙
正确答案：B

629. 子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于月经周期的A. 增生期早期
B. 分泌期早期C. 增生期中期D. 分泌期中期E. 增生期晚期
正确答案：B

630. 牙周病复查的时间一般为
~2 个月复查 1 次
个月复查 1 次
个月复查 1 次
个月复查 1 次
个月复查 1 次
正确答案：C

631. 50. 半月神经节射频控温热术。温度应升至
~85°C
~75°C
~70°C
~90°C
~60°C
正确答案：A

632. 关节强直手术前，必须明确以下几项诊断，才能制定正确的手术计划，其中错误的是A. 确定是关节内强直. 关节外强直或混合性强直
B. 确定强直的性质是纤维性还是骨性C. 确定强直是单侧或双侧
D. 确定病变的部位和范围
E. 确定是何种原因引起的强直
正确答案：E

633. 艾滋病患者常具有机会性感染和肿瘤的发生率增高的特点。试问下列哪一项指标可以评价患者的细胞免疫功能
+/CD4+
+/CD4+
+/CD8+
+/CD8+
+/CD8+
+/CD8+
正确答案：D

634. ~患者，男性，因外伤导致颌面部严重骨折，并出现呼吸困难。最后可能引起此症状的骨折是

- ~A. 髁突颈部骨折B. 颧弓骨折
- C. 喙突骨折
- D. 下颌角线性骨折
- E. 下颌正中区粉碎性骨折

正确答案：E

635. 咬肌间隙脓肿应做

- A. 下颌角下 2cm 绕下颌角弧形切口B. 口内翼下颌皱襞内侧纵形切口 C. 下颌骨下缘下 2cm 作平行切口D. 口内翼下颌皱襞处横形切口
 - E. 下颌骨下缘下 1~1.5cm 作平行切口
- 正确答案：A

636. 患者，男性，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天伴全身发热。检查：体温℃，上唇肿胀明显，可见多个脓头。

此部位感染最常见的致病菌为

- A. 绿脓杆菌B. 大肠杆菌
 - C. 金黄色葡萄球菌D. 变形链球菌
 - E. 白色念珠菌
- 正确答案：C

637. 肉芽肿性唇炎的典型病理改变为

- A. 血管周围上皮样细胞、淋巴细胞及浆细胞聚集B. 上皮疔
 - C. 结节中心易发生坏死D. 上皮内疱
 - E. 导管扩张，有慢性炎细胞浸润
- 正确答案：A

638. 小唾液腺，纯黏液腺是A. 腮腺

B. 下颌下腺

C. 舌下腺D. 唇腺 E. 腭腺

正确答案：E

639. 患儿，男，4 岁，从 2 岁半开始补牙，至今仍有蛀牙，患儿家长前来找医生询问刷牙方法。有关刷牙不正确的观点是

- A. 家长为儿童刷牙时，以握笔式持牙刷柄的方法操作较方便B. 儿童不宜采用顺刷牙刷牙
 - C. 刷牙效果与刷牙所用的压力有关D. 刷牙效果与所花时间有关
 - E. 当牙刷毛出现弯曲有散开状时，应及时替换牙刷
- 正确答案：B

640. 哪种囊肿实际上是肿瘤A. 含牙囊肿

B. 黏液囊肿

- C. 牙源性钙化囊肿D. 婴儿龈囊肿
 - E. 牙旁囊肿
- 正确答案：C

641. 1 岁时小儿的头围约是

正确答案：C

642. 黏性放线菌损伤牙周组织的机制不包括A. 影响成纤维细胞功能

- B. 合成中性粒细胞趋化物
 - C. 抗原刺激宿主产生过敏反应D. 刺激破骨细胞，造成骨吸收E. 分泌白细胞毒素
- 正确答案：E

643. 牙龈炎最主要的致病细菌是A. 变形链球菌
B. 伴放线放线杆菌C. 牙龈卟啉单胞菌D. 黏性放线菌
E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：C

644. 患者，男性，22 岁，因刷牙出血，牙齿松动半年就诊。无全身疾病。牙周龈上。龈下洁治后，临床检查见左下颌第一磨牙颊侧中央仍有 7mm 深牙周袋，探诊出血。
最可能的诊断是

- A. 青少年后期牙周炎B. 慢性牙周炎
 - C. 侵袭性牙周炎
 - D. 快速进展型牙周炎E. 成人牙周炎
- 正确答案：C

645. 患者，男性，22 岁，因刷牙出血，牙齿松动半年就诊。无全身疾病。牙周龈上。龈下洁治后，临床检查见左下颌第一磨牙颊侧中央仍有 7mm 深牙周袋，探诊出血。
相应治疗方案应是

- A. 牙周翻瓣术
- C. 半牙切除术D. 调牙合

E. 以上都可能 正确答案: E

646. 患儿, 男, 6 岁, 双侧腮腺反复肿大 2 年, 临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。关于儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现, 下列说法错误的是

- A. 多数主导管无改变
 - B. 副腺体末梢导管扩张
 - C. 临床痊愈后仍可有末梢导管扩张
 - D. 主导管可有扩张
 - E. 病变可累及下颌下腺
- 正确答案: E

647. 口服磺胺类药物出现过敏性粒细胞减少症最可能的原因是型超敏反应

- A. II 型超敏反应
 - B. III 型超敏反应
 - C. IV 型超敏反应
 - D. 以上都不是
- 正确答案: B

648. 牙周病易受到以下哪个系统疾病的影响

- A. 糖尿病
- B. 心脏病
- C. 高血压
- D. 吸烟
- E. 胃病

正确答案: A

649. 可摘局部义齿的基本要求不包括

- A. 完全恢复咀嚼功能
- B. 保护口腔组织的健康
- C. 舒适美观
- D. 良好的固位和稳定作用
- E. 坚固耐用

正确答案: A

650. 患者的基本医疗权不包括

- A. 应该得到基本医疗保健服务的权利
 - B. 生病后得到及时医疗的权利
 - C. 平等享受医疗服务的权利
 - D. 能够选择自己应该得到何种医疗的权利
 - E. 医疗保健不受民族、性别、财产状况影响的权利
- 正确答案: D

651. 面部刀砍伤患者临床检查发现笑时对侧口角高, 考虑为哪一支面神经损伤

- A. 颧支
- B. 颞支
- C. 颊支
- D. 下颌缘支
- E. 颈支

正确答案: D

652. 患者, 男性, 38 岁, 每日吸烟 2 包十余年。3 个月前发现舌右侧缘中份发白, 并有不适, 进食时尤为明显。体检见一处白色斑块, 形状不规则, 大小约 2cmX1cm, 颜色均一, 呈小颗粒状突起于黏膜表面, 触之仍较柔软, 口腔内其余黏膜未见明显异常

以下疾病中不需要与该病相鉴别的是

- A. 白色水肿
- B. 白色海绵状痣
- C. 迷脂症

D. 梅毒 E. 淋病

正确答案：E

653. 唇裂的治疗是 A. 以手术治疗为主

法和 Tennison 法各有优缺点 C. 往往需要二期修复鼻. 唇畸形 D. 多学科序列治疗

E. 以上都是 正确答案：E

654. 只存在于脱氧核糖核酸中的碱基是 A. 鸟嘌呤

B. 腺嘌呤 C. 胞嘧啶 D. 胸腺嘧啶 E. 尿嘧啶

正确答案：D

655. 使用超声波洗牙机时，工作头应与牙面成 A. 与牙面平行或小于 20° 角

B. 与牙面平行或小于 15° 角

$^{\circ}$ 角左右

D. 与牙面平行或小于 30° 角

$^{\circ}$ 角左右

正确答案：B

656. 对牙周预后影响较小的因素是 A. 骨吸收程度

B. 牙周袋深度 C. 附着丧失程度

D. 根分叉是否受累

E. 治疗过程中使用的药物类型

正确答案：E

657. Lineal gingival erythema 与下列哪一疾病有关综合征

B. 掌跖角化一牙周破坏综合征 C. 白细胞功能异常

D. 艾滋病

E. 坏死性溃疡性牙周炎 正确答案：D

658. 外渗性黏液囊肿的特点是 A. 假复层纤毛柱状上皮衬里

B. 复层扁平上皮衬里 C. 扁平上皮衬里

D. 矮柱状上皮衬里 E. 无衬里上皮

正确答案：E

659. 沟纹舌一般不需要治疗，但对于有症状的沟纹舌应该 A. 口服肾上腺皮质激素

B. 口服止痛药

C. 维 A 酸乳膏局部涂擦

D. 清理沟内食物残屑，漱口E. 手术切除沟裂后拉拢缝合正确答案：D

660. 常用于面部疼痛的鉴别诊断和射频治疗的麻醉方法是A. 上颌神经阻滞麻醉
B. 下颌神经阻滞麻醉C. 鼻腭神经阻滞麻醉D. 腭前神经阻滞麻醉

E. 上牙槽后神经阻滞麻醉正确答案：B

661. ~患者，男性，42岁，因车祸致双侧髌骨骨折后出现移位伴开牙合，合理的治疗方法是

~A. 颌间固定+弹性牵引 B. 单侧固定+颅颌弹性绷带C. 单纯颌间固定

D. 在双侧磨牙后区垫以 2~3mm 厚的橡皮垫，再用颅颌弹性绷带进行牵引

E. 手术切开复位固定正确答案：D

662. 患者，男性，35岁，右上后牙夜痛不能眠 1 日。3 个月来右侧下后牙冷水引起疼痛，咬物不适。近日夜痛影响睡眠，并引起右半侧头、面和耳后部痛。检查时见右侧上、下磨牙均有咬合面和邻面深龋洞，右下第三磨牙近中阻生。为确定患牙进行的检查是

A. 探诊 B. 叩诊 C. 松动度

D. 温度测验线片检查

正确答案：D

663. 大多数舍格伦综合征患者同时伴有的自身免疫性疾病是A. 结节性多动脉周围炎

B. 类风湿关节炎C. 多发性肌炎

D. 系统性红斑狼疮E. 硬皮病

正确答案：B

664. 牙本质发育不全

A. 成釉细胞增生突入牙乳头

B. 牙齿发育时牙乳头组织向成釉器突起C. 釉牙本质界平直

D. 釉基质合成、分泌或矿化障碍E. 局限性釉质增生

正确答案：C

665. 患者，女性，26岁，口腔溃疡反复发作 3 年，多在月经前出现，数目每次 1-3 个不等，主要位于下唇和舌等部位，疼痛明显。下列治疗措施中最好的是

A. 口腔局部对症治疗B. 全身使用抗生素 C. 补充多种维生素

D. 口服雌激素及对症治疗E. 注射转移因子

正确答案：D

666. 关于边缘运动的描述。不正确的是A. 边缘运动是下颌的一种功能性运动

B. 边缘运动代表了下颌在运动方面的功能的潜力 C. 边缘运动是指下颌向各方向所做的最大限度运动

D. 边缘运动表明了颞下颌关节. 肌肉. 韧带的生物学特性图形是下颌边缘运动在矢状面的投影

正确答案: A

667. 腮腺导管口开口于

A. 上颌第一前磨牙牙冠的颊黏膜 B. 上颌第二前磨牙牙冠的颊黏膜 C. 上颌第一磨牙牙冠的颊黏膜 D. 上颌第二磨牙牙冠的颊黏膜 E. 上颌第三磨牙牙冠的颊黏膜

正确答案: D

668. 以下哪项不是流行性腮腺炎的特点 A. 常双侧同时或先后发病

B. 腮腺肿痛. 分泌物浑浊 C. 可终身免疫

D. 有传染性 E. 儿童多发 正确答案: B

669. 妊娠早期羊水的主要来源是 A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液 B. 胎儿尿液

C. 胎儿皮肤 D. 胎儿肺 E. 胎膜

正确答案: A

670. 咽部肿胀压迫呼吸道时应如何处理 ()

A 应迅速用手指掏出或用塑料管吸出堵塞物, 改变体位, 取头低侧卧位

B 用粗线穿过舌体将其牵拉到口腔外

C 用筷子或木棒置于两侧双尖牙部位, 加力上提上颌骨

D 从口腔或鼻腔插入通气管

E 15 号以上粗针头作环甲膜穿刺, 随既行气管切开术 正确答案: D

671. 小儿有牙 18 个, 会用汤匙吃饭。能说 2~3 字拼成的短语, 其年龄为岁
岁半岁 岁半

岁

正确答案: C

672. 足月儿生后第 1 小时内呼吸频率约是次/分

次/分次/分次/分次/分

正确答案: C

673. 患者, 男性, 28 岁, 疣状新生物 20 天。曾有两个性伴侣, 无保护性接触。

查体: 包皮. 包皮系带. 冠状沟处直径约 2-3mm 大小丘疹, 呈乳头状, 触之易出血。

活检: 表皮角化不全, 棘层增生肥厚, 棘层上部细胞胞体较大, 胞质淡染, 中央有大而圆深染的核, 细胞无异形性及排列紊乱。

本例最可能的诊断是A. 阴茎珍珠状丘疹 B. 尖锐湿疣
C. 扁平湿疣
D. 生殖器鳞状细胞癌 E. 生殖器鲍温样丘疹病
正确答案：B

674. 唾液腺炎最主要的感染途径是A. 血源性
B. 逆行性C. 损伤
D. 淋巴源性
E. 邻近组织炎症波及
正确答案：B

675. 佐剂的生物学作用不包括A. 增强抗原的免疫原性
B. 改变产生抗体的类型C. 诱导免疫耐受
D. 增强巨噬细胞的活性E. 增加抗体的效价
正确答案：C

676. 全口义齿初戴。患者使用易出现A. 义齿容易松动脱位
B. 不会用来进食C. 发音不清晰 D. 唾液多
E. 以上全部
正确答案：E

677. 提出“生物医学逐渐演变为生物-心理-社会医学是医学发展的必然”这一观点的是A. 希波克拉底
B. 恩格尔 C. 胡弗兰德D. 帕兹瓦尔E. 皮内尔
正确答案：B

678. 可进一步分化为成牙本质细胞的结构是A. 牙囊
B. 成釉器C. 牙板 D. 牙乳头E. 前庭板
正确答案：D

679. 患者，男，8岁，右上颌前磨牙萌出，颊尖釉质发育不全，之前乳磨牙曾严重破坏，未做治疗，过早脱落，X线检查根部刚开始发育，根管粗大。不可能的诊断是
A. 乳牙早失
B. 釉质发育不全C. 恒牙早萌
D. 乳牙根尖周炎
E. 乳牙根尖周炎
正确答案：D

680. 患儿，男，7岁，下前牙长出“双排牙”。经检查：前排牙松动 I 度，后排牙位于牙列舌侧。最可能的诊断是
A. 额外牙
B. 牙齿数目异常C. 乳牙滞留
D. 乳牙排列不齐E. 牙齿形态异常
正确答案：C

681. 颌骨囊肿内衬上皮为复层扁平上皮。部分区域上皮表层为嗜酸性立方状。可见上皮球结构。上皮内见有黏液池。最可能的病理诊断是

- A. 根侧囊肿
- B. 含牙囊肿
- C. 牙旁囊肿
- D. 腺牙源性囊肿
- E. 黏液囊肿

正确答案：D

682. 关于显微血管外科错误的是

- A. 是指外径在 3mm 以上的血管外科手术
- B. 是指外径在 3mm 以下的血管外科手术

C. 可使手术得到简化

D. 大型缺损可一次修复成功

E. 在感染区、放射区可同期组织移植
正确答案：A

683. 牙周膜内的上皮剩余来源于

- A. 牙板上皮
- B. 前庭板上皮
- C. 缩余釉上皮
- D. 上皮根鞘
- E. 口腔黏膜上皮

正确答案：D

684. 有关质粒的叙述不正确的是

- A. 是细菌染色体外的遗传物质
- B. 是闭合环状的双链DNA
- C. 具有自主复制的能力
- D. 是细菌必不可少的结构
- E. 可自行丢失或人工处理消除

正确答案：D

685. 无牙颌患者初诊可以暂时不过问的情况是

- A. 患者的主观要求
- B. 患者以往的牙科治疗情况
- C. 患者的全身健康状况
- D. 患者的性格
- E. 患者的职业

正确答案：E

686. 某一 17 岁的男性患者，近来饮冷水时，有左上后牙一过性疼痛，检查发现：左上第一磨牙近中邻面有深龋洞，在治疗这个龋过程中，最易出现意外穿髓的部位是

- A. 近中颊侧髓角和远中颊侧髓角
- B. 近中舌侧髓角和远中舌侧髓角
- C. 近中颊侧髓角和近中舌侧髓角
- D. 远中颊侧髓角和远中舌侧髓角
- E. 以上都不是

正确答案：C

687. 治疗盘状红斑狼疮可选用

- A. 三氮唑核苷
- B. 氯化喹啉
- C. 氯己定
- D. 氟康唑
- E. 维甲酸

正确答案：B

688. 以下关于新生儿鹅口疮描述不正确的是

- A. 散在的色白如雪的柔软小斑点，如帽针头大小
- B. 多在出生后 2-8 日内发生
- C. 白色斑片遍布整个舌背
- D. 白色斑片甚至可分布于软腭及咽部
- E. 斑片附着十分紧密，不可擦掉

正确答案：E

689. 下列哪一项不是药物性牙龈增生的发病特点
A. 前牙区较重
B. 牙龈增生常发生于全口牙龈
C. 无牙区的牙龈增生更加严重
D. 拔牙后增生的牙龈组织可以自行消退
E. 增生的牙龈表面可呈分叶状或桑葚状
正确答案: C

690. 颌面部复合伤伴有鼻腔外耳道出血时应考虑有
A. 鼻腔. 外耳道软组织挫伤
B. 鼻黏膜撕裂伤
C. 口腔出血反流至鼻腔
D. 颅底骨折脑脊液漏
E. 鼻. 耳道骨折
正确答案: D

691. 《医疗机构管理条例》规定, 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事的工作为
A. 医疗后勤服务
B. 医疗卫生技术
C. 医院财务审计
D. 医院安全保卫
E. 医疗器械采购
正确答案: B

692. 重度牙周炎患牙附着丧失达
A. $\geq 6\text{mm}$
B. $\leq 5\text{mm}$
C. $\leq 6\text{mm}$
D. $< 4\text{mm}$
E. $\geq 5\text{mm}$
正确答案: E

693. 哪种不是汉-许-克病的表现
A. 牙齿松动脱落
B. 突眼
C. 颅骨病变
D. 眶距过宽
E. 尿崩症
正确答案: D

694. D. 磨牙后垫的 2/3 到后缘
E. 磨牙后垫后缘
正确答案: B

695. 在医疗实践活动中分配医疗收益与负担时, 类似的个案适用相同的准则, 不同个案适用不同的准则, 这所体现的医学伦理学基本原则是
A. 尊重原则
B. 不伤害原则
C. 公正原则
D. 有利原则
E. 公益原则
正确答案: C

696. 正确答案: A

697. 急性腮腺炎最常见的病原菌是
A. 金黄色葡萄球菌
B. 链球菌
C. 文生螺旋体
D. 肺炎球菌
E. 厌氧菌
正确答案: A

698. 暂时性牙关紧闭是由于麻药注入
A. 翼内肌或翼外肌

B. 翼内肌或咬肌 C. 翼内肌或颞肌 D. 翼外肌或咬肌 E. 翼外肌或颊肌 正确答案：B

699. 唇高恢复好，但容易出现患侧唇过长现象的单侧唇裂修复法是法
法法法法

正确答案：A

700. 下列哪一种细胞不参与T 细胞介导的免疫应答

A. 巨噬细胞

细胞细胞细胞

正确答案：D

701. 自觉症状不明显，可有咀嚼不适或乏力，X 线片见根尖周呈边界模糊的不规则透射影，周围骨质疏松呈云雾状，镜下见炎性肉芽组织内部出现液化坏死伴大量泡沫细胞，根尖牙骨质和牙槽骨出现不同程度的吸收，这是

A. 慢性根尖周囊肿 B. 慢性根尖周

C. 慢性根尖周脓肿 D. 致密性骨炎

E. 慢性牙髓炎 正确答案：C

702. 患者，女性，32 岁，主诉：左下后牙颊侧牙龈长一个肿物 4 个月，并慢慢增大，影响进食，如果临床诊断为牙龈瘤，关于该患者的治疗原则，下列哪一项说法错误

A. 必须手术彻底，否则容易复发 B. 主要治疗方法为手术切除

C. 多次复发时，需拔除波及的患牙

D. 手术时需切除瘤体组织，尽可能保留骨膜 E. 手术切口在瘤体底部周围正常的组织上 正确答案：D

703. 患者，女，12 岁，主诉：戴矫治器半年后，经常刷牙时牙龈出血。临床检查：前牙唇侧牙龈充血肿胀明显，龈乳头呈球状突起。探易出血。

最合适的诊断为 A. 单纯性龈炎 B. 慢性龈缘炎 c. 青春期龈炎

D. 急性坏死性溃疡性龈炎 E. 急性龈乳头炎

正确答案：C

704. 生后第 1 年身高增长约

正确答案：E

705. 下列关于白血病牙龈病损的治疗原则，说法错误的是A. 出血时局部可用压迫或药物止血

B. 牙周治疗以保守治疗为主

C. 肿大的牙龈可进行手术或活组织检查D. 急性白血病可以做轻柔牙周洁治

E. 可用 3%过氧化氢液清洗龈缘，消除炎症
正确答案：C

706. 具有高等学校医学专业本科学历，参加执业医师资格考试的条件是A. 在执业医师的指导下，在医疗机构中工作满 1 年

B. 在执业医师的指导下，在医疗机构中试用期满 1 年

C. 在医疗机构中试用期满 2 年

D. 在医疗机构中工作满 2 年

E. 在执业医师的指导下，在医疗机构中工作满 5 年
正确答案：B

707. 口腔颌面部最常见的感染病原菌是A. 单纯厌氧菌感染

B. 单纯需氧菌感染

C. 需氧菌和厌氧菌混合感染D. 单纯真菌感染

E. 单纯病毒感染
正确答案：C

708. 哪种不是汉-许-克病的表现A. 牙齿松动脱落

B. 突眼

C. 颅骨病变D. 眶距过宽E. 尿崩症

正确答案：D

709. 恶性淋巴瘤的治疗应首选A. 手术加放疗

B. 手术加化疗C. 化疗加放疗D. 中药治疗 E. 热疗

正确答案：C

710. 患儿，男，6 岁，双侧腮腺反复肿大 2 年，临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。关于

儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现，下列说法错误的是

A. 多数主导管无改变 B. 副腺体末梢导管扩张

C. 临床痊愈后仍可有末梢导管扩张D. 主导管可有扩张

E. 病变可累及下颌下腺
正确答案：E

711. 以下不属于口腔结核临床表现的是A. 结核初疮

B. 寻常狼疮

C. 溃疡基底较硬

D. 溃疡边缘呈鼠啮状E. 潜掘状溃疡

正确答案：C

712. 患者，男性，30 岁，1 个月前打呵欠后出现左关节区疼痛及张口受限，伴咀嚼和侧方运动痛。无关节弹响史。临床检查示：张口度 25mm，被动张口度 35mm。张口末下颌偏向左侧，相当左侧下关节处有压痛。左侧后牙不能咬合。诊断为

- A. 右侧 TMJ 脱位
 - B. 左侧 TMJ 脱位
 - C. 左侧翼外肌痉挛
 - D. 右侧翼外肌痉挛
 - E. 左侧咬肌痉挛
- 正确答案：C

713. 掌跖角化一牙周破坏综合征的牙周病损可最早始发于

- A. 青少年
- B. 青春期
- C. 中年
- D. 乳牙萌出后不久

E. 恒牙萌出后不久
正确答案：D

714. 对提高全口义齿固位和稳定意义最小的是

- A. 准确印模
 - B. 有利的磨光面形态
 - C. 合理的排牙
 - D. 尽量扩大基托面积
 - E. 指导患者正确使用义齿
- 正确答案：E

715. 牙列缺损会引起的不良影响是

- A. 咀嚼功能减退
- B. 发音功能障碍
- C. 美观差
- D. 颞下颌关节紊乱病
- E. 以上均是

正确答案：E

716. 一般认为，进行双侧唇裂整复术最合适的年龄是

- A. 新生儿期
- B. 6 个月
- C. 1 岁
- D. 1 岁以后

正确答案：D

717. 患者，男性，56 岁，近 1 个月来始有左侧舌根、软腭及咽部阵发性剧烈疼痛，并向外耳道放射。吞咽、说话均可引起疼痛，甚至夜间有疼醒现象。临床检查以上部位未见明显肿胀，黏膜色正常无溃疡，服用卡马西平有效。最有可能的原因是

- A. 三叉神经痛
 - B. 非典型性口炎
 - C. 蝶腭神经痛
 - D. 舌咽神经痛
- 正确答案：D

718. 全口义齿戴入后，若出现疼痛，可能有下列原因

- A. 组织面有塑料小瘤
- B. 颌位关系不正确，或个别牙早接触
- C. 印模、模型不准

+C

+B+C

正确答案：E

719. 某一牙体冠面或颈面牙质缺损处遇冷热刺激后即感不适即谓A. 扳机点
B. 触痛点C. 敏感点D. 刺激点E. 疼痛点
正确答案: C

720. 上颌两侧多个后牙缺失, 混合支持式可摘局部义齿设计时连接两侧鞍基的大连接体一般不考虑
A. 后腭杆 B. 前腭杆 C. 变异腭板D. 全腭板
E. 关闭马蹄状腭板正确答案: B

721. 口腔白色念珠菌感染(鹅口疮)常见于A. 新生儿期
B. 婴儿期C. 幼儿期
D. 混合牙列阶段 E. 年轻恒牙列阶段正确答案: B

722. 颌面部复合伤伴有鼻腔外耳道出血时应考虑有A. 鼻腔. 外耳道软组织挫伤
B. 鼻黏膜撕裂伤
C. 口腔出血反流至鼻腔D. 颅底骨折脑脊液漏 E. 鼻. 耳道骨折
正确答案: D

723. 下列哪项不是腺样囊腺瘤的临床病理特点A. 浸润性极强, 易沿神经扩散
B. 易侵入血管, 早期发生远处转移C. 极易发生颈部淋巴结转移
D. 可沿骨髓腔扩散
E. 单纯放疗不能达到根治正确答案: C

724. 使用龈下刮治器时, 刀刃与牙面应成
° 角左右
° 角左右
° 角左右
° 角左右
° 角左右
° 角左右

正确答案: C

725. 增生性龈炎多发生于

A. 儿童 B. 青少年C. 老年人D. 中年人E. 新生儿
正确答案: B

726. 患者，女性，45 岁，颌面部损伤，上颌骨骨折，出血 700ml，烦躁，面色苍白，皮肤湿冷，血压 110/94mmHg，脉搏 100 次/分。此时患者病情处在哪种情况
A. 无休克
B. 休克代偿期 C. 中度休克 D. 重度休克 E. 虚脱
正确答案：B

727. 患者，男性，22 岁，刷牙时牙龈出血 2 周，可以自行止住。
)该患者临床上不会有哪些临床表现 A. 探诊出血
B. 龈缘肥厚
C. 多发生于前牙
D. 可形成假性牙周袋
线检查可发现牙槽骨垂直型吸收 正确答案：E

728. 肾前性氮质血症 A. 肾形小，尿比重 1.

729. 口腔颌面部最常见的感染病原菌是 A. 单纯厌氧菌感染
B. 单纯需氧菌感染
C. 需氧菌和厌氧菌混合感染 D. 单纯真菌感染
E. 单纯病毒感染 正确答案：C

730. 患者，女性，34 岁，6 于 1 年前已做干髓治疗，现咬合痛，冷热刺激痛，查 6 充填物完整，叩 (+)，其疼痛的原因及处理方法
A. 残髓炎，更换干髓剂 B. 残髓炎，重新失活牙髓 C. 残髓炎，改做塑化治疗
D. 慢性根尖周炎，改做根管充填治疗 E. 慢性根尖周炎，改做塑化治疗
正确答案：C

731. 患者 3 个月来感觉左上后牙持续性胀痛，可放射至头面部。伴有头痛、鼻塞、脓涕，该患者最可能患哪种疾病
A. 急性上颌窦炎 B. 急性牙髓炎 C. 慢性牙髓炎 D. 可复性牙髓炎 E. 深龋
正确答案：A

732. 患者，女性，30 岁，拔除右上第一磨牙残根时，根不慎进入上颌窦。最佳处理方法是
A. 堵塞明胶海绵 B. 经牙槽窝探查 C. 行上颌窦开窗术 D. 扩大牙槽窝底 E. 不处理
正确答案：D

733. 纯浆液性腺泡的大唾液腺是 A. 腮腺
B. 下颌下腺 C. 舌下腺 D. 唇腺
E. 腭腺

正确答案：A

734. 在生长活跃的青春前期，新生的龋蚀急速地发展，牙质崩坏A. 奶瓶龋
B. 少年龋 C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋

正确答案：B

735. 患者，男性，30岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速；近1周伴声音嘶哑，

ECT示右甲状腺冷结节。

如病理报告为甲状腺乳头状癌，又无远处转移表现应采用哪种术式

- A. 患侧全切加颈淋巴结清除
- B. 患侧全切，峡部切除，对侧大部切除
- C. 双侧甲状腺全部切除
- D. 患侧腺体大部切除，峡部切除
- E. 患侧腺体大部切除加颈淋巴结清除

正确答案：B

736. 一个1岁半男婴，口内检查发现，上下颌乳中切牙和乳侧切牙均已萌出，按照一般乳牙萌出顺序在其口内萌出的下一颗牙为

A. 上颌乳尖牙 B. 下颌乳尖牙

C. 上颌第一乳磨牙 D. 下颌第一乳磨牙 E. 下颌第二乳磨牙

正确答案：D

737. 子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于月经周期的A. 增生期早期

B. 分泌期早期 C. 增生期中期 D. 分泌期中期 E. 增生期晚期

正确答案：B

738. 患者，男性，12岁，检查发现前牙牙间乳头呈球状突起，松软光亮。如果诊断为青春期龈炎，其病变程度一般不受下列哪一因素影响

- A. 口呼吸习惯 C. 乳恒牙更替 E. 戴矫治器
- B. 牙齿排列不齐 D. 磨牙症

正确答案：D

739. 牙周脓肿多源于A. 牙周袋

B. 坏死牙髓 C. 接近龈缘 D. 接近龈颊沟 E. 牙龈炎

正确答案：A

740. 患者，女性，45岁，慢性牙周炎史多年，昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛，夜间

加重，手持冷水瓶就诊。检查：右下第一磨牙Ⅱ度松动，叩诊(+)，颊侧牙周袋6mm。为了进一步确诊，还需要进行哪一项检查

A. 麻醉测验 B. 冷测验 C. 热测验

D. 染色法测验E. 咬诊法测验 正确答案：C

741. 下列哪一项不会引起病理性根吸收A. 乳牙根尖周炎症

B. 乳牙牙髓炎C. 牙外伤

D. 活髓切断术. 盖髓术治疗E. 牙萌出

正确答案：E

742. 患者，女，13岁，上颌骨无痛性膨胀半年，X线见病变区呈境界不清楚的不透光区。肉眼见病变区与正常骨无明显分界。镜下见纤维组织代替了正常骨组织，其中骨小梁形态不一，呈“W”或“C”形。骨小梁的周围大多数无成排的成骨细胞。病理诊断应为

A. 纤维异常增殖症

B. 家族性巨颌症

C. 骨纤维异常增殖症D. 骨化纤维瘤

E. 牙骨质一骨化纤维瘤 正确答案：C

743. 患者，女性，52岁，有胆管结石病史，近2天来右上腹痛。体温 $^{\circ}\text{C}$ ，2小时前突然畏寒. 寒战，体温达 40°C ；精神紧张兴奋，口渴，面色苍白，脉搏98次/分，动脉搏动有力，血压110/96mmHg。尿量每小时26ml。下列哪一项不是其微循环变化的特征

A. 微动脉. 微静脉收缩

B. 动静脉短路开放C. 直捷通路开放 D. 组织灌流减少

E. 静脉回心血量减少 正确答案：E

744. 真核基因表达受多级调控。其中最普遍. 最有效的是A. 基因结构的活化

B. 转录起始的调节

C. 转录后的加工及转运翻译

E. 翻译后加工修饰 正确答案：B

745. 局部麻醉术后麻木症状仍未恢复的可能原因是A. 注射区有血肿

B. 注射区有感染

C. 注射区有神经损伤D. 注射针折断

E. 注射区有水腫 正确答案：C

746. 颊间隙脓肿波及下列哪种组织时可形成多间隙感染A. 黏膜下组织

B. 颊部皮下组织C. 颊肌

D. 颊脂体

E. 颊部的神经 正确答案：D

747. 患儿，男，6岁，双侧腮腺反复肿大2年，临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。关于

儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现，下列说法错误的是

A. 多数主导管无改变 B. 副腺体末梢导管扩张

- C. 临床痊愈后仍可有末梢导管扩张D. 主导管可有扩张
E. 病变可累及下颌下腺
正确答案：E

748. 表皮损伤超过哪一层会形成瘢痕A. 基底层
B. 棘层 C. 颗粒层D. 透明层E. 角质层
正确答案：A

749. 白血病牙龈病损的特点是
A. 可波及牙间乳头. 边缘龈和附着龈B. 牙龈暗红发绀或苍白色
C. 自发性出血 D. 牙龈坏死. 疼痛E. 以上全是
正确答案：E

750. 关于坏死性唾液腺化生特征的描述错误的是A. 假上皮瘤样增生
B. 形成黏液池 C. 腺小叶坏死 D. 火山口样溃疡E. 骨坏死
正确答案：E

751. 白血病患者牙龈组织内浸润的细胞主要是A. 幼稚白细胞
B. 正常的中性粒细胞C. 淋巴细胞
D. 浆细胞
E. 以上都不是
正确答案：A

752. 患者，男性，59岁，腭部无痛性渐进性肿大包块半年。肉眼观肿瘤无包膜，镜下见肿瘤细胞形态一致，组织结构表现多样。如巢状. 条索状. 筛孔状. 小梁状. 管状和乳头状结构等。肿瘤周边可见单列的瘤细胞浸润。最可能的诊断是
A. 恶性多形性腺瘤B. 腺样囊性癌
C. 恶性肌上皮瘤D. 上皮肌上皮癌
E. 多形性低度恶性腺癌
正确答案：E

753. 全口义齿戴入后，若出现疼痛，可能有下列原因A. 组织面有塑料小瘤
B. 颌位关系不正确，或个别牙早接触C. 印模. 模型不准
+C
+B+C
正确答案：E

754. 成牙本质细胞的形成是由于A. 分泌性成釉细胞诱导
B. 星网状层和中间层细胞诱导C. 内釉上皮和星网状层诱导 D. 内釉上皮或上皮根鞘诱导

E. 外釉上皮诱导
正确答案：A

755. 牙本质钙化小球之间遗留的未钙化间质，其中有牙本质小管通过，此区域称

为A. 前期牙本质

B. 继发牙本质C. 球间牙本质D. 透明牙本质E. 髓周牙本质 正确答案: C

756. 低渗性缺水, 血清尚未出现缺钠之前, 尿中氯化钠A. 略高

B. 正常

C. 时高时低 D. 减少或缺乏E. 由低升高 正确答案: D

757. 颞下颌关节成形术后开口练习应于何时开始A. 一般术后 7-10 天

B. 一般术后 1 个月C. 一般术后半年 D. 一般术后 3 个月E. 即刻

正确答案: A

758. 患儿, 男, 8 岁, 因左面部烧伤后瘢痕, 行瘢痕切除植皮术, 术后植皮区拆线及更换敷料的时间是

A. 术后 3~5 天

B. 术后 5~7 天

C. 术后 8~10 天

D. 术后 2 周

E. 术后 1 个月 正确答案: C

759. 儿童时期一侧髁突受损, 下颌畸形一般随年龄的增长而日益明显, 面容不对称表现为A. 颈部偏向患侧, 健侧面部丰满, 患侧面部扁平狭长

B. 颈部偏向健侧, 健侧面部丰满, 患侧面部扁平狭长C. 颈部偏向患侧, 患侧面部丰满, 健侧面部扁平狭长D. 颈部偏向健侧, 患侧面部丰满, 健侧面部扁平狭长E. 颈部偏向患侧, 患侧面部丰满, 健侧面部亦丰满 正确答案: C

760. D. 磨牙后垫的 2/3 到后缘

E. 磨牙后垫后缘 正确答案: B

761. 腺泡细胞癌主要发生在A. 舌下腺

B. 下颌下腺C. 腮腺

D. 腭腺

E. 磨牙后腺 正确答案: C

762. 颞下颌关节的组成部分, 不包括A. 髁突

B. 颞骨关节面C. 关节囊

D. 喙突

E. 关节韧带

正确答案: D

763. 在口腔黏膜上皮细胞中, 一种细胞体积大。多边形, 细胞质伸出许多小的突起与相邻的细胞相接, 这种细胞是

A. 扁平细胞B. 角化细胞C. 粒细胞 D. 棘细胞 E. 基底细胞

正确答案：D

764. 手术前患者最常见的情绪反应是A. 抑郁

B. 焦虑C. 愤怒D. 敌意E. 绝望

正确答案：B

765. 关于牙本质小管，不正确的叙述是A. 近牙髓一端较粗，越近表面越细

B. 行程中可有許多侧支可存在于球间牙本质内

C. 在近髓侧和近表面每单位面积内小管数目之比为 4:

766. 能激活卵磷脂胆固醇脂酰转移酶 (LCAT) 的载脂蛋白是

767. 单颌固定不具备的优点是A. 可行使张闭口运动

B. 对进食. 语言功能影响较小C. 便于保持口腔卫生

D. 固定坚实可靠

E. 具有一定功能活动，有利于改善局部血液循环
正确答案：D

768. 拔牙后注意事项中错误的是A. 拔牙当日可刷牙或漱口

B. 拔牙后 30 分钟可吐掉压迫止血用的棉球

C. 不宜反复吸吮创口D. 拔牙当日进软食

E. 拔牙当日进食不宜过热
正确答案：A

769. 临床中下颌骨体部骨折固定时间应该为周

个月个月周

E. 半年

正确答案：D

770. 以下有关皮瓣的叙述中错误的是

A. 皮瓣感觉的恢复首先为温度觉，最后是痛觉

B. 术后 72 小时内是游离皮瓣最容易发生血管危象的时候

C. 皮瓣设计应比缺损处稍大，以预防皮瓣转移后发生收缩

D. 原则上组织畸形和缺损能用带蒂皮瓣修复就不用游离皮瓣，能用游离皮瓣就不用管状皮瓣

E. 轴型皮瓣只要在血管的长轴内设计，一般可不受长宽比例的限制
正确答案：A

771. 以下各类口腔黏膜疾病中。发病率最高的是A. 斑纹类疾病

B. 感染性疾病

C. 自身免疫性疾病D. 唇舌疾病

E. 溃疡类疾病正确答案：E

772. 粒细胞绝对计数低于多少时属拔牙禁忌证L

L L L L

正确答案：B

773. 不属于发育性囊肿的是A. 鼻腭囊肿

B. 鳃裂囊肿

C. 血外渗性囊肿D. 球上颌囊肿 E. 甲状舌管囊肿正确答案：C

774. 以下关于前牙 3/4 冠切沟的描述哪项是错误的

A. 连接两邻轴沟B. 平行于切嵴

C. 可增加 3/4 冠强度

D. 最主要的抵抗舌侧脱位的结构E. 可用倒锥钻预备

正确答案：C

775. 患者，男性，35 岁，右上后牙夜痛不能眠 1 日。3 个月来右侧下后牙冷水引起疼痛，咬物不适。近日夜痛影响睡眠，并引起右半侧头、面和耳后部痛。检查时见右侧上、下磨牙均有咬合面和邻面深龋洞，右下第三磨牙近中阻生。

为确定患牙进行的检查是

A. 探诊 B. 叩诊 C. 松动度

D. 温度测验线片检查

正确答案：D

776. 牙周膜神经

A. 来自牙槽神经和根尖神经B. 不伴随血管分布

C. 神经末梢均附着于牙骨质D. 无定位觉

E. 对压力刺激迟钝正确答案：A

777. 急性化脓性颞下颌关节炎可出现

A. 颞下颌关节区及其周围疼痛，一般为非剧痛的钝痛

B. 关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对牙合，稍用力即可引起关节区剧痛

C. 颞下颌关节区及其周围疼痛，常伴有全身游走性、多发性关节炎，晚期可发生关节强直D. 吞咽时咽部疼痛和感觉异常

E. 阵发性点击样剧烈疼痛正确答案：B

778. 患者，男性，38 岁，8 重度伸长，无对颌牙，上颌对应位置牙龈红肿，可见咬合印记。合理的处理方式是

牙合面调磨

根管治疗后截冠

C. 拔除

779.

780. 有关恒牙髓腔的叙述。错误的是A. 上前牙开髓部位在舌面窝
B. 上前牙根管粗，根管治疗效果好C. 活髓牙作针道时应避开牙髓
D. 下颌双尖牙根管治疗时防侧穿E. 下颌磨牙髓室顶底相距较远 正确答案：E

781. 正确答案：A

782. 正确答案：B

783. B. 上前牙盖过下前牙的唇面小于 2/

784. 患者，女性，48 岁。鼻唇沟处皮肤溃疡 1 年余不愈，溃疡似鼠咬状，边缘硬。镜下见肿瘤呈浸润性生长，癌细胞小，梭形或圆形，核深染，分裂象易见，癌巢周边细胞呈立方或柱状，核呈栅栏状排列。癌巢与间质之间有裂隙。符合

A. 鳞癌
B. 基底细胞癌C. 未分化癌
D. 基底细胞腺癌E. 疣状癌

正确答案：B

785. 过敏性接触性口炎主要是型变态反应
型变态反应型变态反应型变态反应 E. 以上都不是 正确答案：D

786. 患者，女性，在行左腮腺浅叶切除加面神经解剖术后 3 个月开始出现进食时耳垂下皮肤潮红，出汗。最有可能的原因是

A. 手术中损伤耳大神经B. 腮腺术后并发涎瘘
C. 该区域副交感神经与交感神经发生错位愈合D. 该区域副交感神经与面神经发生错位愈合 E. 该区域面神经与交感神经发生错位愈合

正确答案：C

787. 患者，男，因牙龈出血半年就诊。

若诊断为急性坏死性溃疡性牙周炎，下列哪一项不是该患者应出现的体征

- A. 牙龈增生
 - B. 牙龈乳头和龈缘坏死
 - C. 晨起时枕头上有血迹
 - D. 口腔腐败性恶臭
 - E. 下颌下淋巴结肿大
- 正确答案：A

788. 治疗年轻恒牙的操作中不恰当的是

- A. 考虑年轻恒牙的形态、组织结构和生理特点
 - B. 宜用金刚砂车针高速切削，减少牙质发生裂纹
 - C. 挖匙去除深部软化牙本质，避免不必要的露髓
 - D. 用龋蚀显示液
 - E. 选用对牙髓无刺激的材料垫底
- 正确答案：B

789. 三叉神经痛的主要病理表现是

- A. 脱髓鞘改变
- B. 退行性变
- C. 轴突节段性断裂

D. 轴突消失

E. 神经细胞坏死

正确答案：A

790. E. 大量蛋白尿，尿比重 1.

791. 选择固定桥基牙的最低限度是

A. 冠根比为 2:

792. 乳牙的嵌体修复法适用于

- A. 乳磨牙 I 类复合洞形和 II 类复合洞形
 - B. 乳磨牙 II 类复合洞形和 III 类复合洞形
 - C. 乳磨牙 III 类复合洞形和 IV 类复合洞形
 - D. 乳磨牙 IV 类复合洞形和 V 类复合洞形
 - E. 乳磨牙 V 类复合洞形和 I 类复合洞形
- 正确答案：A

793. 患者，男性，12 岁，检查发现前牙牙间乳头呈球状突起，松软光亮。如果诊断为青春期龈炎，其病变程度一般不受下列哪一因素影响

- A. 口呼吸习惯
- C. 乳恒牙更替
- E. 戴矫治器
- B. 牙齿排列不齐
- D. 磨牙症

正确答案：D

794. 口腔医师在确定拔牙适应证时首先应考虑的是

- A. 患者年龄因素
- B. 有无全身系统疾病
- C. 对局部麻药是否过敏
- D. 女性患者是否在月经期
- E. 患牙是否能够保存

正确答案：E

795. 25 岁，初孕妇。末次月经 2012 年 3 月 10 日。于 2012 年 10 月 13 日就诊，检查宫底在脐上 2 横指，枕右前位，胎心率正常。现在应是

- A. 妊娠满 30 周，宫底高度符合正常情况
- B. 妊娠满 30 周，宫底高度低于正常
- C. 妊娠满 31 周，宫底高度符合正常情况

- D. 妊娠满 31 周，宫底高度低于正常
E. 妊娠满 32 周，宫底高度低于正常 正确答案：D

796. 舌下腺囊肿的内容物的特点是A. 白色凝乳状物质
B. 灰白色角化物质 C. 无色透明黏稠液体D. 豆腐渣样物质
E. 淡黄色含胆固醇结晶液体 正确答案：C

797. E. 大量蛋白尿，尿比重 1.

798. 正确答案：C

799. 智齿冠周炎局部检查的常见表现不包括A. 局部糜烂颗粒状增生似菜花状
B. 挤压龈袋可有脓液溢出
C. 严重者炎症可波及舌腭弓和咽侧壁D. 肿胀的龈瓣覆盖低位阻生齿
E. 化脓性炎症局限后，可形成冠周脓肿 正确答案：A

800. 创伤性溃疡的治疗应首选

- A. 免疫增强剂
B. 肾上腺皮质激素及免疫抑制剂C. 局部消炎止痛
D. 去除刺激因素E. 以上都不是 正确答案：D

801. 患者，男性，13 岁，上前牙先天性畸形，要求矫治。检查：上中切牙切缘中央可见半月形缺陷，切缘比牙颈部狭窄，切牙之间有较大空隙。第一恒磨牙的牙尖皱缩，牙尖向中央偏斜，釉质发育不全，呈多个不规则的小结节和坑窝凹陷，散在于近咬合面处。应诊断为

- A. 一期梅毒 B. 二期梅毒 C. 获得性梅毒
D. 晚期胎传梅毒E. 淋病

正确答案：D

802. 一额颞部外伤出血的患者，为了暂时止血。行压迫止血的合理部位是A. 耳屏前区域

- B. 颈动脉三角区 C. 颈外动脉走行区
D. 下颌下缘与咬肌附着前缘交界处E. 下颌角区

正确答案：A

803. Kennedy 第一类义齿蜡型装盒法应用

- A. 反装法B. 正装法C. 混装法D. 倒置法

E. 正置法

正确答案：C

804. 传导B 细胞活化第一信号的分子是和 CD

805. 患者，女性，45 岁，右侧颊黏膜一蓝黑色肿块 1 个月，查体：右侧颊部有一直径约的蓝黑色圆形肿块. 表面有破溃，右颌下淋巴结肿大。
该病的诊断最可能是

- A. 色素痣 B. 黏膜黑斑C. 黑棘皮病
 - D. 恶性黑色素瘤
 - E. 多发性神经纤维瘤
- 正确答案： D

806. 主要发生于上颌乳切牙唇面，且较快发展成广泛性龋，少见于下颌乳前牙A. 奶瓶龋

- B. 少年龋 C. 猖獗龋 D. 环状龋 E. 忽视性龋
- 正确答案： A

807. 以下不符合淋球菌性口炎的临床表现的一项是A. 可发生于上腭. 颊. 舌等口腔黏膜

- B. 黏膜充血发红
 - C. 可有糜烂或浅表溃疡
 - D. 被覆白色凝乳状斑点或斑片 E. 假膜易擦去，呈现出血性创面
- 正确答案： D

808. 年轻恒牙牙髓坏死较晚，牙根停止发育晚。根端形态可能是型

型或B 型型
型

正确答案： C

809. 关于妊娠期龈炎的治疗原则。说法不正确的是A. 去除局部刺激因素是关键

- B. 无须治疗，分娩后牙龈炎症会自行消退C. 治疗完成后定期复查
- D. 对于过度增生的牙龈可以行手术切除E. 自我口腔卫生维护很重要

正确答案： B

810. 患儿，女，8 岁，左上第二乳磨牙深龋洞，探诊敏感，去龋后未露髓。首选治疗方案

- A. 盖髓术
- B. 根管治疗术C. 再矿化术
- D. 根尖诱导成形术E. 拔除术

正确答案： A

811. 患者，男性，36 岁，以“反复左下颌下区进食后肿痛不适半年”为主诉。患者病程中有明显的进食时左侧下颌下区肿胀疼痛，进食后数小时方可逐渐消退。临床查体见患者左下颌下腺导管开口处红肿，轻压腺体导管口溢脓，口内外双合诊于左侧口底近第一磨牙处可触及一黄豆大小硬物。

该患者的治疗方案可考虑

- A. 临床及实验室检查，若结石较小且位于导管前段，可扪及者可采用保守治疗，或导管取石术。若结石较大，或位于导管后部. 腺体内. 腺体反复感染. 继发慢性硬化性下颌下腺炎. 腺体萎缩时则应行腺体切除术。
 - B. 直接手术切除左侧下颌下腺
 - C. 用生理盐水或抗生素液反复冲洗左下颌下腺导管
 - D. 左下颌下腺理疗
 - E. 左下颌下腺切开排脓引流
- 正确答案：A

812. 关于牙本质龋透明层，错误的说法是

- A. 管腔中矿物盐沉积
- B. 牙本质小管变窄
- C. 硬度较正常牙本质高
- D. 存在轻度的脱矿
- E. 可出现脂肪变层

正确答案：C

813. C. 肾形不小，尿比重 1.

814. 临床表现出现张口受限的间隙感染不包括

- A. 颞间隙感染
- B. 颞下间隙感染
- C. 咬肌间隙感染
- D. 翼下颌间隙感染
- E. 颊间隙感染

正确答案：E

815. 颞下颌关节成形术后开口练习应于何时开始

- A. 一般术后 7-10 天
- B. 一般术后 1 个月
- C. 一般术后半年
- D. 一般术后 3 个月
- E. 即刻

正确答案：A

816. 女性，45 岁。血性白带 2 个月，妇检阴道未受肿瘤侵犯，宫颈菜花样，宫体正常大小，宫旁明显增厚，未达盆腔，宫颈活检为鳞癌。其分期是

- A. I 期
 - B. II 期
 - C. IIa 期
 - D. IIb 期
 - E. IIIa 期
- 正确答案：D

817. 关于三叉神经痛患病分支区域内神经功能描述正确的是A. 触觉减退
B. 痛觉更敏感C. 温度觉异常
D. 运动支咀嚼功能亢进E. 以上功能均无变化 正确答案: E

818. 关于妊娠期龈炎的治疗原则。说法不正确的是A. 去除局部刺激因素是关键
B. 无须治疗, 分娩后牙龈炎症会自行消退C. 治疗完成后定期复查
D. 对于过度增生的牙龈可以行手术切除E. 自我口腔卫生维护很重要
正确答案: B

819. 二期梅毒的诊断标准不包括
A. 多种皮疹伴全身淋巴结肿大和早期流感症状
B. 有不洁性交史或下疳史, 病程两年以内
C. 实验室检查时黏膜损害处能找到梅毒螺旋体D. 梅毒血清学试验强阳性
E. 梅毒黏膜白斑 正确答案: E

820. 缺陷两端各有一基牙, 一侧为可动连接体. 一侧为不动连接体的固定桥称为A.
双端固定桥
B. 种植体固定桥C. 半固定桥
D. 复合固定桥E. 黏结固定桥 正确答案: C

821. 磨除基牙牙体组织最少的固定桥是A. 双端固定桥
B. 单端固定桥C. 半固定桥 D. 黏结固定桥
E. 固定一可摘联合桥 正确答案: D

822. 可摘局部义齿的基本要求不包括A. 完全恢复咀嚼功能
B. 保护口腔组织的健康C. 舒适美观
D. 良好的固位和稳定作用E. 坚固耐用
正确答案: A

823. 患者, 女性, 34 岁, 6 于 1 年前已做干髓治疗, 现咬合痛, 冷热刺激痛,
查 6 充填物

完整, 叩(+), 其疼痛的原因及处理方法

A. 残髓炎, 更换干髓剂 B. 残髓炎, 重新失活牙髓C. 残髓炎, 改做塑化治疗
D. 慢性根尖周炎, 改做根管充填治疗E. 慢性根尖周炎, 改做塑化治疗
正确答案: C

824. 牙髓是一种A. 神经组织
B. 疏松结缔组织C. 致密结缔组织D. 黏液组织
E. 脂肪组织 正确答案: B

825. 患者, 男性, 29 岁, 张口困难, 双侧颊黏膜可见大范围灰白色条索。触之坚

韧而弹性差，咀嚼槟榔已经有 5 年余。最可能的诊断是

- A. 白色水肿 B. 白色角化病
- C. 白色海绵状痣
- D. 口腔黏膜下纤维化 E. 以上都不是

正确答案：D

826. 截根术前必须进行
- A. 根管治疗
 - B. 牙髓活力测定 C. 口服消炎药物 D. 牙龈切除
 - E. 局部用药

正确答案：A

827. 患者，女性，28 岁，妊娠 5 个月。主诉近 3 个月来刷牙出血严重。如果诊断为妊娠期龈炎，这种疾病的发生与下列哪一因素最密切相关

- A. 年龄 B. 体重
- C. 全身健康状况 D. 口腔卫生状况 E. 妊娠时间长短

正确答案：D

828. 关于皮片移植的生理变化，错误的是
小时后，创面毛细血管与皮片毛细血管吻合建立血液循环

- B. 术后 8 天已有足够的血供
- C. 术后 2 年神经末梢开始生长
- ~72 小时后皮片已基本成活
- E. 皮片移植后数分钟，创面毛细血管扩张，血浆渗出维持皮片存活

正确答案：C

829. 因血块或分泌物阻塞咽喉部时应如何处理（）

应迅速用手指掏出或用塑料管吸出堵塞物，改变体位，取头低侧卧位应用粗线穿过舌体将其牵拉到口腔外

用筷子或木棒置于两侧双尖牙部位，加力上提上颌骨从口腔或鼻腔插入通气管 15 号以上粗针头作环甲膜穿刺，随即行气管切开术

正确答案：A

830. 蛋白质合成时，每掺入 1 个氨基酸需消耗个高能磷酸键
个高能磷酸键个高能磷酸键

个高能磷酸键个高能磷酸键
正确答案：D

831. 哪种囊肿实际上是肿瘤
- A. 含牙囊肿
 - B. 黏液囊肿
 - C. 牙源性钙化囊肿 D. 婴儿龈囊肿
 - E. 牙旁囊肿

正确答案：C

832. 关于急性龈乳头炎的临床表现，哪一项不正确
- A. 病变局限于个别牙间乳头
 - B. 牙间乳头发红肿胀
 - C. 有自发的胀痛和明显的探触痛 D. 牙间乳头易出血

线片检查见牙槽骨吸收正确答案：E

833. ~

834. 一患者被人用刀划伤面部软组织，耳前区皮肤有长约 6cm 的纵形创口。创缘整齐，有活动出血。
应采取的处理措施是

- A. 清创止血，检查是否合并重要的结构损伤，并用无菌敷料覆盖
 - B. 局部冷敷加压包扎
 - C. 尽早行清创缝合术
 - D. 创面用油纱布覆盖
 - E. 暴露创口全身用抗生素
- 正确答案：C

835. 患者，男性，37 岁，右下颌下区胀痛 2 周，进食时痛加剧，继而可减轻。
该患者体检中最可能发现的是

- A. 下颌下区波动
 - B. 开口困难
 - C. 下颌舌沟隆起，舌上抬
 - D. 下颌下腺导管口唾液分泌增多
 - E. 可扪及下颌下腺导管结石
- 正确答案：E

836. 上颌突与侧鼻突未融合

- A. 面横裂
- B. 面斜裂
- C. 单侧唇裂
- D. 上唇正中裂
- E. 下唇唇裂

正确答案：B

837. 有关牙周膜细胞的叙述，错误的是

- A. 成纤维细胞是数量多，功能上最重要的细胞
 - B. 成牙骨质细胞分布在临近牙骨质的牙周膜中
 - C. 成骨细胞受炎症刺激可形成颌骨囊肿和牙源性肿瘤
 - D. 当骨吸收停止时，破骨细胞消失
 - E. 未分化间充质细胞在牙周膜的更新中起重要作用
- 正确答案：C

838. 促结缔组织增生型成釉细胞瘤多见于

- A. 颌骨前部
- B. 前磨牙—磨牙区
- C. 下颌磨牙区
- D. 上颌磨牙区

E. 下颌升支区

正确答案：A

839. 牙本质受到损伤刺激时，牙本质小管内的成牙本质细胞突变性，矿物盐沉积而封闭牙本质小管，这样的牙本质为

- A. 前期牙本质
 - B. 继发牙本质
 - C. 球间牙本质
 - D. 透明牙本质
 - E. 髓周牙本质
- 正确答案：D

840. 表现为典型的关节炎、尿道炎和结膜炎三联症，也常出现口腔溃疡、口腔炎、阴

茎头炎. 皮疹. 宫颈炎等皮肤黏膜病变的疾病是

- A. 手一足-E1 病
 - B. 口一眼一生殖器三联症C. 斯一约综合征
 - D. 莱特尔综合征E. 梅一罗综合征
- 正确答案: D

841. II度根分歧病变最适宜采取的术式是A. 翻瓣术

- B. 牙龈切除术C. 牙冠延长术
 - D. 引导组织再生术E. 结缔组织移植术
- 正确答案: D

842. 使用龈下刮治器时, 刀刃与牙面应成

- ° 角左右
- ° 角左右
- ° 角左右
- ° 角左右
- ° 角左右

正确答案: C

843. 带蒂皮瓣断蒂一般在第一次手术后多长时间进行天

- ~21 天
- ~30 天
- ~40 天

正确答案: C

844. 急性龈乳头炎的主要临床特征是A. 伴有全身症状

- B. 口臭 C. 牙松动
- D. 牙间乳头发红肿胀, 探诊和吸吮时出血E. 累及附着龈

正确答案: B

845. 患者, 男性, 68 岁, 右下牙龈癌, 拟行颌颈联合根治术加胸大肌. 肋骨复合组织瓣修复术。

该骨肌皮瓣转移修复后, 应主要注意观察的是

- A. 伤口渗血B. 水肿
- C. 血液循环D. 质地
- E. 感觉

正确答案: C

846. 牙挫伤时不会出现的临床症状是A. 自觉伤牙伸长
B. 患牙松动C. 咬合痛 D. 牙龈撕裂E. 叩痛
正确答案: E

847. 患者, 男性, 42 岁, 发现腭部包块半年, 伴有明显疼痛。肉眼观察肿物与周围组织无明显界限。镜下见瘤细胞包括腔上皮细胞和肌上皮细胞, 结构上以瘤细胞排列成筛状结构为主。此外肿瘤细胞可构成管状, 实性小条索或团块, 并可见瘤细胞小条索浸润神经。上述所见最符合的诊断是
A. 肌上皮癌 B. 腺样囊性癌
C. 多形性低度恶性腺癌D. 恶性混合瘤
E. 上皮肌上皮癌正确答案: B

848. 下列不属于拔牙禁忌证的是A. 充血性心力衰竭
B. 频发心绞痛
C. 双束支传导阻滞 D. 未控制的心律不齐
个月前发生过心肌梗死正确答案: E

849. 急性腮腺脓肿可发生面瘫的原因是A. 炎症的破坏
B. 面神经炎
C. 炎症的浸润
D. 高热使面神经失去功能E. 肿胀压迫
正确答案: E

850. 关于牙列缺失后舌的改变, 错误的是A. 舌体萎缩
B. 舌体形态改变C. 舌体功能异常D. 味觉异常
E. 舌与颊部内陷软组织接触正确答案: A

851. 一患者被人用刀划伤面部软组织, 耳前区皮肤有长约 6cm 的纵形创口, 创缘整齐, 有活动出血。
本病例不会损伤的重要结构是
A. 腮腺腺体损伤B. 腮腺导管损伤
C. 面静脉和面动脉损伤D. 面神经分支损伤
E. 颌骨骨折正确答案: E

852. 新生儿, 诊断为单侧完全性唇裂合并单侧完全性腭裂, 同时伴有鼻部畸形。
腭裂的正畸治疗应开始于
A. 唇裂整复术后B. 乳恒牙交替期C. 恒牙期
D. 腭裂整复术后E. 新生儿无牙期正确答案: E

853. 正确答案: B

854. 白塞病的诊断标准是以复发性口腔溃疡为基础, 加上复发性生殖器溃疡. 眼疾 (前后葡萄膜炎. 视网膜炎). 针刺反应阳性及 () 中任意两项即可确诊

- A. 结节性红斑
 - B. 虹膜状红斑
 - D. 蝶形红斑
 - E. 尼氏征阳性
- 正确答案: A

855. 患者, 女性, 45 岁, 右侧颊黏膜一蓝黑色肿块 1 个月, 查体: 右侧颊部有一直径约的蓝黑色圆形肿块. 表面有破溃, 右颌下淋巴结肿大。诊断该病的主要依据线片

- B. 涂片检查
 - C. 病理检查
 - D. 临床表现
 - E. 血液检查
- 正确答案: D

856. 患者, 男, 因牙龈出血半年就诊。

若诊断为急性坏死性溃疡性牙周炎, 下列哪一项不是该患者应出现的体征

- A. 牙龈增生
 - B. 牙龈乳头和龈缘坏死
 - C. 晨起时枕头上有血迹
 - D. 口腔腐败性恶臭
 - E. 下颌下淋巴结肿大
- 正确答案: A

857. 女, 36 岁, 主诉牙龈胀痛。检查: 5 与 4 之间牙龈乳头发红肿胀, 探诊出血, 未探及

釉牙骨质界; 4 近中邻面的银汞充填体有悬突。关于此病的临床疼痛, 下面说法哪一项是正确的

- A. 与冷热刺激无关
 - B. 月经期可感疼痛加重
 - C. 夜间痛明显
 - D. 无叩痛
 - E. 无明显的探触痛
- 正确答案: B

858. 属于乙类传染病的疾病是

- A. 麻疹
 - B. 流行性腮腺炎
 - C. 风疹
 - D. 急性出血性结膜炎
 - E. 麻风病
- 正确答案: A

859. 反密码子 ICG 的相应密码子是

正确答案：C

860. 病毒感染性疾病是综合征

- B. 掌跖角化一牙周破坏综合征
 - C. 白细胞功能异常
 - D. 艾滋病
 - E. 坏死性溃疡性牙周炎
- 正确答案：D

861. 患者，男性，19岁，左颈上部淋巴结结核，下列哪种药物对此患者治疗无效

- A. 链霉素
 - B. 青霉素
 - C. 异烟肼
 - D. 利福平
 - E. 乙胺丁醇
- 正确答案：B

862. 腭裂是由于

- A. 侧腭突和鼻中隔未联合的结果
 - B. 侧腭突和中鼻突未联合的结果
 - C. 侧腭突和上颌突未联合的结果
 - D. 侧腭突和前腭突未联合的结果
 - E. 侧腭突和下颌突未联合的结果
- 正确答案：A

863. 患者，男性，50岁，口腔多年以来反复出现溃疡，外生殖器也常出现溃疡，近来眼睛也出现不适，经诊断为虹膜睫状体炎，除此以外下肢皮肤可见结节性红斑，手背静脉注射处可见红疹，最可能的诊断是

- A. 舍格伦综合征
 - B. 莱特尔综合征
 - C. 贝赫切特综合征
 - D. 梅一罗综合征
 - E. 综合征
- 正确答案：C

864. 金属成品冠修复乳牙窝洞的错误操作是A. 颊面近颈部 1/3 隆起，不应较多地切削

B. 颊舌面与邻面相交处制成圆钝状移行

C. 牙合面去除的牙体表面较好

D. 牙合面制备时着重切割裕面嵴

E. 牙颈部不能有台阶

正确答案：A

865. 患者，女性，39岁，近1年来感觉牙齿松动，咬合无力。检查：CI-S：2，牙龈充血，牙松动 I-11 度，牙周袋 3-5mm，X线片示牙槽骨水平型吸收达根长 1/3~1/2。该患者的牙周病史主要应通过以下哪种方式收集

- A. 触诊
- B. 探诊
- C. 问诊
- D. 叩诊
- E. 视诊

正确答案：C

866. 患者，女性，28岁，妊娠5个月。主诉近3个月来刷牙出血严重。关于妊娠期龈炎的治疗原则，说法不正确的是

A. 去除局部刺激因素是关键

B. 妊娠8个月时，对于过度增生的牙龈可以行手术切除

C. 局部可应用 1%过氧化氢液冲洗D. 治疗完成后定期复查
E. 自我口腔卫生维护很重要正确答案: B

867. 医务人员在医疗活动中违反诊疗护理常规, 过失造成患者死亡的A. 一级甲等医疗事故
B. 一级乙等医疗事故C. 二级甲等医疗事故D. 二级乙等医疗事故E. 不属于医疗事故
正确答案: A

868. 真核基因表达受多级调控。其中最普遍, 最有效的是A. 基因结构的活化
B. 转录起始的调节
C. 转录后的加工及转运翻译
E. 翻译后加工修饰正确答案: B

869. 下列哪一项不是青春期龈炎的临床表现A. 好发于前牙舌侧的牙间乳头和龈缘
B. 女性患者稍多于男性C. 探诊出血明显
D. 有龈袋形成
E. 牙龈颜色暗红或鲜红正确答案: A

870. 下面关于急性龈乳头炎的治疗哪一项不正确A. 全身应用抗生素
B. 去除局部刺激因素
C. 局部使用抗菌消炎药物冲洗
D. 急性炎症过后, 彻底去除病因, 如邻面龋, 不良修复体等E. 去除邻面的菌斑, 牙石, 以缓解急性炎症
正确答案: A

871. 下列症状中, 哪一个是颞下颌关节双侧急性前脱位的特有症状A. 呈开口状不能闭合
B. 双侧耳屏前触诊有凹陷C. 咀嚼及吞咽困难
线显示髁突位于关节凹外
E. 完全不能张口正确答案: B

872. 患者, 男, 8 岁, 右上颌前磨牙萌出, 颊尖釉质发育不全, 之前乳磨牙曾严重破坏, 未做治疗, 过早脱落, X 线检查根部刚开始发育, 根管粗大。不可能的诊断是
A. 乳牙早失
B. 釉质发育不全C. 恒牙早萌
D. 乳牙根尖周炎牙
正确答案: D

873. 多形渗出性红斑属于A. 传染性疾病
B. 感染性疾病

- C. 变态反应性疾病D. 遗传性疾病
E. 自身免疫性疾病 正确答案：C

874. 全口义齿修复与固位有关的因素，下列哪一项是错误的A. 牙槽骨致密程度
B. 口腔黏膜的性质c. 颌骨的解剖形态D. 颊侧基托的伸展E. 前伸牙合平衡 正确答案：
A

875. 患者，女性，41岁，右下颌磨牙区膨胀1年。X线见不规则透射区并含大小不等的不透光区。肉眼观察肿物呈实性，镜下肿瘤由片状或岛状多边形上皮细胞组成，细胞间桥清晰。肿瘤细胞及细胞核有多形性。但核分裂罕见。肿瘤组织内见嗜酸性均质状物质。并有同心圆形钙化。最可能的病理诊断是

- A. 成釉细胞瘤
B. 牙源性钙化囊肿 C. 牙源性钙化上皮瘤D. 牙源性角化囊肿 E. 牙源性鳞状细胞瘤
正确答案：C

876. 关于骨上袋以下描述正确的是A. 牙周袋位于牙槽嵴顶下方
B. 牙槽骨高度并未丧失
C. 主要是牙槽骨发生垂直吸收所致D. 牙槽嵴高度明显降低
E. 又称假性牙周袋 正确答案：D

877. 在生理情况下牙骨质A. 只增生而不吸收
B. 受压侧增生
C. 只吸收而不增生D. 不断地改建
E. 不断地重塑 正确答案：A

878. 带蒂皮瓣断蒂一般在第一次手术后多长时间进行天

~21天

~30天

~40天

正确答案：C

879. 脓肿切开引流操作错误的是A

- . 切口的位置在脓肿的低位
B. 切口的位置选择在愈合后瘢痕隐蔽的位置C. 最好选择在口内切开引流
D. 切开至黏膜下或皮下，可钝性分离扩大创口
E. 颜面危险三角区的脓肿切开后只能轻度挤压，以保证引流通畅 正确答案：E

880. 以下疾病中不具有癌变倾向的是A. 口腔白斑病
B. 口腔红斑病 C. 口腔扁平苔藓D. 盘状红斑狼疮
E. 坏死性黏膜腺周围炎 正确答案：E

881. 关于T 细胞介导的细胞免疫的说法，下列哪一项是错误的

- A. 抗原肽-MHC 分子复合物与TCR 结合产生第一信号
 - B. 由 TD 抗原引起分子传递第二信号
 - 识别抗原受MHC 分子限制
 - E. 需抗原呈递细胞参与
- 正确答案： C

882. 关于周围性面瘫临床表现不正确的是

- A. 一侧面部表情肌完全瘫痪
 - B. 一侧眼裂以下表情肌瘫痪
 - C. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍
 - D. 一侧面瘫+味觉丧失
 - E. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍+听觉改变
- 正确答案： B

883. 上颌神经阻滞麻醉二次进针的方向正确的是

- A. 向后 10° ， 向下 15°
 - B. 向上 10° ， 向前 15°
 - C. 向下 10° ， 向前 15°
 - D. 向下 10° ， 向后 15°
 - E. 向上 10° ， 向后 15°
- 正确答案： B

884. 以下关于面神经麻痹的叙述错误的是

- A. 预后主要取决于病情严重程度和治疗是否及时得当
 - B. 面神经损害如发生在茎乳孔 L 外，一般不发生味觉. 泪液. 唾液等方面的变化
 - C. 分原发性和继发性两种
 - D. 贝尔麻痹指临床上不能肯定病因的不伴有其他症状或体征的单纯性周围面神经麻痹
 - E. 贝尔面瘫急性期不宜应用强的刺激疗法
- 正确答案： C

885. 基因诊断和基因治疗中争论最激烈的伦理难题是

- A. 人类遗传物质的纯洁性. 神圣性是否受到了亵渎
 - B. 胎儿的生命质量和父母选择权的矛盾
 - C. 对个体和人类社会是否安全
 - D. 是否会造成医疗费用的猛增
 - E. 生殖细胞的基因治疗是否可行
- 正确答案： E

886. 不能实现卡环稳定作用的部分是

- A. 卡环体
 - B. 卡环臂
 - C. 牙合支托
 - D. 连接体
 - E. 卡环肩
- 正确答案： D

887. 下列哪个可能是原位癌或早期鳞癌的表现

- A. 均质型红斑
 - B. 均质型白斑
 - C. 颗粒型红斑
 - D. 疣状增生
 - E. 多形渗出性红斑
- 正确答案： C

888. E. 在血管长轴内不受长宽比例的限制

正确答案： E