

月度考试

- 1、(A1型题) 麦氏点的解剖位置正确的是
 - A. 脐与左髂前上棘连线中外 1/3 交界处
 - B. 脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处
 - C. 脐与左髂前上棘连线 1/2 交界处
 - D. 脐与右髂前上棘连线 1/2 交界处
 - E. 脐与左髂前上棘连线中内 1/3 交界处
- 2、(A1型题) 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是
 - A. 链球菌
 - B. 霍乱弧菌
 - C. 幽门螺杆菌
 - D. 痢疾杆菌
 - E. 大肠埃希菌
- 3、(A1型题) 十二指肠球部溃疡患者原疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐隔夜食物。推断患者出现的并发症是
 - A. 溃疡出血
 - B. 溃疡穿孔
 - C. 多发性溃疡
 - D. 溃疡癌变
 - E. 幽门梗阻
- 4、(A1型题) 胃、十二指肠溃疡急性大出血的主要表现是
 - A. 剧烈上腹痛
 - B. 上腹部反跳痛
 - C. 大量呕血或黑便
 - D. 肠鸣音活跃
 - E. 血细胞比容下降
- 5、(A2型题) 患儿，1岁，因腹泻脱水入院。经补液，脱水基本纠正，但患儿精神萎靡、四肢无力、心音低钝、腹胀、腱反射减弱。应考虑为
 - A. 低血糖
 - B. 低钙血症
 - C. 低镁血症
 - D. 低钾血症
 - E. 酸中毒
- 6、(A1型题) 等渗性脱水的患儿，应首先给下列哪种液体
 - A. 2:1 等张含钠液
 - B. 1/2 张含钠液
 - C. 1/3 张含钠液
 - D. 1/4 张含钠液
 - E. 1/5 张含钠液
- 7、(A1型题) 急性阑尾炎发生的最重要的原因
 - A. 阑尾梗阻
 - B. 阑尾损伤
 - C. 胃肠道功能紊乱
 - D. 全身感染
 - E. 神经反射

- 8、(A1型题)成人排便时肛门滴血,有痔核脱出,便后自行回纳。属哪一种痔
- A. I 期内痔
 - B. II 期内痔
 - C. III 期内痔
 - D. 嵌顿性内痔
 - E. 血栓性外痔
- 9、(A1型题)肝硬化失代偿期患者最常见的死亡原因是
- A. 电解质紊乱
 - B. 肝性脑病
 - C. 原发性肝癌
 - D. 肝肾综合征
 - E. 上消化道出血
- 10、(A1型题)胰腺炎患者禁用吗啡镇痛的原因是
- A. 吗啡可导致呼吸抑制
 - B. 吗啡容易导致炎症扩散
 - C. 吗啡容易成瘾
 - D. 吗啡可引起 Oddi 括约肌痉挛,加重疼痛
 - E. 吗啡与其他药物产生配伍禁忌
- 11、(A2型题)患儿,2岁,肺炎,抗生素治疗3周。口腔护理发现黏膜有点状灰白色乳凝块状物,局部无痛,无全身症状,应考虑为
- A. 卡他性口炎
 - B. 维生素 A 缺乏
 - C. 鹅口疮
 - D. 疱疹性咽峡炎
 - E. 腮腺炎
- 12、(A2型题)患者,男,45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时,护士应提出质疑
- A. 氢氧化铝凝胶
 - B. 口服补盐液
 - C. 奥美拉唑
 - D. 枸橼酸铋钾
 - E. 克拉霉素
- 13、(A2型题)患者,女,39岁,餐后3小时突觉上腹部持续性刀割样剧痛,伴恶心入院,既往有胃溃疡病史。急诊护士查体:腹式呼吸消失,移动性浊音阳性,全腹压痛、反跳痛、肌紧张,上腹为甚。该护士的初步判断是
- A. 胃溃疡急性穿孔
 - B. 胃溃疡出血
 - C. 十二指肠溃疡出血
 - D. 胃溃疡癌变
 - E. 胆囊炎
- 14、(A2型题)患者,男,60岁,胃溃疡病史20年,常于餐后半小时出现上腹疼痛。近3个月来食欲较差,体重下降,上腹痛时轻时重,疼痛逐渐加重,不易缓解,粪便检查示大便隐血阳性。可考虑
- A. 胃溃疡出血
 - B. 十二指肠溃疡伴出血
 - C. 胃溃疡癌变
 - D. 胰腺癌
 - E. 胃穿孔

- 15、(A2型题)患者,女,48岁,毕Ⅱ式胃大部切除术后6天,突发右上腹剧烈疼痛伴腹膜刺激征。外科护士应首先考虑
- 术后胃出血
 - 输入段梗阻
 - 低血糖综合征
 - 碱性反流性胃炎
 - 十二指肠残端破裂
- 16、(A2型题)患者,男,18岁,反复腹泻,脓血便6个月,抗生素治疗无效,近2周来脓血便每日2~3次,粪便镜检:WBC及RBC成堆,细菌培养阴性,首选的治疗是
- 异烟肼
 - 手术治疗
 - 左氧氟沙星
 - 柳氮磺胺吡啶
 - 强的松
- 17、(A2型题)患儿,8个月,呕吐,腹泻3天,大便15次/天。皮肤弹性极差,无尿,血清钠140mmol/L,患儿脱水的程度是
- 轻度脱水
 - 中度脱水
 - 低渗性脱水
 - 重度脱水
 - 高渗性脱水
- 18、(A2型题)患儿,11个月。呕吐、腹泻4天。每日排便12~14次,稀水样便,精神差,脱水症状明显。在补液过程中,小儿出现无力、心音低钝、腹胀、肠鸣音弱,病区护士首先应考虑
- 低磷血症
 - 高钾血症
 - 低血糖
 - 低钾血症
 - 低钠血症
- 19、(A1型题)患儿,女,10个月。因腹泻4天入院。患病期间进食少,呕吐频繁,精神萎靡,前囟凹陷,尿量明显减少,皮肤弹性差,腹胀,肠鸣音减弱,心率快,心音低钝,有奔马律。护士根据查体的情况考虑该患儿可能并发
- 重度脱水伴低钠血症
 - 中度脱水伴低钾血症
 - 轻度脱水伴低钾血症
 - 中度脱水伴高钾血症
 - 轻度脱水伴高钾血症
- 20、(A2型题)男,28岁,十二指肠溃疡并发幽门梗阻2天入院,中度脱水,以下哪项治疗不妥
- 输液中补充钾离子
 - 输注碳酸氢钠纠正碱中毒
 - 给予口服补液盐纠正脱水
 - 补充钾离子的液体浓度不能超过0.3%
 - 入院第一日补液量按50~100ml/kg计算
- 21、(A2型题)患者,男,48岁,转移性右下腹痛3小时,伴恶心、呕吐、发热。最能提示该患者患有阑尾炎的体征是
- 腹部呼吸减弱
 - 右下腹固定压痛
 - 肠鸣音消失
 - 腹胀
 - 肝浊音界缩小

22、(A2型题)患者,男,50岁。坏疽性阑尾术后第7天,局部伤口红肿,触之有波动感,穿刺抽到脓液,其最佳处理方法是

- A.伤口用酒精纱布湿敷
- B.局部理疗
- C.拆去缝线,伤口敞开引流
- D.全身应用抗菌药
- E.外敷鱼石脂药膏

23、(A2型题)患者,男,40岁。剧烈咳嗽时,右侧腹股沟斜疝被嵌顿。下列哪项说明疝发生绞窄,应做好紧急手术准备

- A.疝块增大,不能回纳
- B.腹胀明显,恶心、呕吐
- C.疝块紧张发硬,有触痛
- D.阵发性腹痛伴停止排气排便
- E.局部有压痛,肌紧张

24、(A2型题)患者,男,25岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当术后饮食护理是

- A.术后应禁食48小时
- B.术后即进普通饮食
- C.术后应胃肠减压
- D.术后应静脉供给营养3天
- E.若术后6小时无恶心即可进流质饮食

25、(A2型题)患者,男,63岁,脓血便伴里急后重2周。首选的检查方法是

- A.X线钡剂造影检查
- B.纤维结肠镜
- C.直肠指诊
- D.腹部超声
- E.肛门镜检查

26、(A1型题)我国肝硬化最常见的病因为

- A.酒精中毒
- B.饮水污染
- C.血吸虫
- D.病毒性肝炎
- E.黄曲霉素

27、(A1型题)肝硬化患者出现全血细胞减少的主要原因是

- A.血液稀释
- B.脾功能亢进
- C.肝衰竭
- D.营养不良
- E.失血过多

28、(A1型题)蜘蛛痣形成的原因是

- A.胆道感染
- B.胆红素过多
- C.毛细血管脆性增加
- D.严重感染
- E.血中雌激素增加

29、(A1型题)肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现是

- A.头晕、头痛
- B.恶心、呕吐

- C.腹痛、腹泻
- D.蜘蛛痣
- E.腹水

30、(A1型题)肝硬化合并上消化道出血最主要的原因是

- A.缺乏维生素 K
- B.急性胃黏膜糜烂
- C.血小板减少
- D.食管胃底静脉曲张破裂
- E.反流性食管炎

31、(A2型题)患者,男,48岁,肝硬化病史5年。查体:腹部膨隆,腹壁皮肤紧张发亮,脐周可见静脉曲张。患者腹壁膨隆的最可能原因是

- A.肝大
- B.脾大
- C.大量腹水
- D.腹腔胀气
- E.腹腔肿瘤

32、(A2型题)患者,男,47岁,肝硬化6年,入院一周。2天前患者突然神志恍惚、举止反常、言语不清。判断患者可能出现的情况是

- A.脑栓塞
- B.尿毒症
- C.脑出血
- D.高血压脑病
- E.肝性脑病

33、(A2型题)患者,男,36岁。肝硬化10年,近半年出现肝增大,持续性肝区疼痛不能忍受入院。查体明显消瘦,腹部膨隆,移动性浊音阳性,肝大,质硬,表面凹凸不平,考虑并发症

- A.上消化道出血
- B.电解质紊乱和酸中毒
- C.原发性肝癌
- D.腹部感染
- E.肝肾综合征

34、(A2型题)肝硬化病人,3天未排便,出现嗜睡和幻觉,在给予灌肠时,不宜采用哪种灌肠溶液

- A.生理盐水
- B.生理盐水+醋
- C.肥皂水
- D.清水
- E.温水

35、(A2型题)患者,女,45岁,患肝硬化6年,移动性浊音阳性。近2天突然呕血约1000ml,现出现烦躁不安、扑翼样震颤、脑电图异常。对该患者的治疗正确的是

- A.使用镇静安眠药
- B.口服乳果糖
- C.大量使用排钾利尿药
- D.快速放净腹水
- E.肥皂水灌肠

36、(A2型题)患者,女30岁,胆道手术后,T管引流已14天,拔管前先试行夹管1~2天,下列哪项为观察重点

- A.切口渗血
- B.尿量
- C.呼吸

- D.腹痛、发热、黄疸
- E.神志、血压和脉搏

37、(A2型题)患者,女,43岁,患胆石症6年,2天前因腹痛、寒战、高热和黄疸发作,门诊用抗生素输液治疗无效入院,来院时发现患者神志不清,血压75/50mmHg,考虑

- A.急性坏疽性胆囊炎
- B.急性梗阻性化脓性胆管炎
- C.慢性胆囊炎急性发作
- D.胆道蛔虫伴感染
- E.胆囊穿孔

38、(A2型题)患者,男,42岁。急性梗阻性化脓性胆管炎急诊入院,寒战,体温骤升至39.0℃,血压85/65mmHg,此患者的休克体征表现为

- A.感染性休克
- B.低血容量性休克
- C.创伤性休克
- D.心源性休克
- E.过敏性休克

39、(A2型题)患者,女,50岁。上腹痛1天,体温39℃,巩膜黄染,B型超声示胆总管结石。为警惕急性重症胆管炎,病情观察中要特别注意

- A.体温、面色
- B.血压、神志
- C.腹部体征
- D.恶心、呕吐
- E.血白细胞计数

40、(A2型题)患者,女,45岁,患胆结石,护士嘱患者应用的饮食是

- A.无盐
- B.低盐高蛋白
- C.低脂肪
- D.低盐低糖
- E.低糖

41、(A2型题)患者,男,行胆总管切开取石、T管引流术。术后第3天,护士查房时发现T管无胆汁流出,患者诉腹痛。首先应

- A.用无菌生理盐水冲洗T管
- B.检查T管是否受压扭曲
- C.用注射器抽吸T管
- D.准备T管造影
- E.继续观察,暂不处理

42、(A2型题)患者,男,10岁,突发剑突下剧烈绞痛1小时,疼痛呈钻顶样,辗转不安。查体:腹肌柔软,右上腹部轻微压痛,首先考虑的诊断是

- A.急性胆囊炎
- B.胆总管结石
- C.胆道蛔虫病
- D.急性胰腺炎
- E.急性胃炎

43、(A2型题)患者,女,40岁。因饱餐并大量饮酒后出现上腹部持续疼痛2小时入院,疼痛剧烈而持续,阵发性加剧,为减轻疼痛,护士应协助患者采取的体位是

- A.仰卧位
- B.半卧位
- C.弯腰屈膝位

- D.端坐位
- E.截石位

44、(A2型题)患者,男,30岁,既往体健。大量饮酒后突然出现上腹剧痛,频繁呕吐,面色苍白,疑为急性胰腺炎。对此患者的饮食护理,最佳的是

- A.高纤维素饮食
- B.高蛋白饮食
- C.低盐饮食
- D.低脂饮食
- E.禁食

45、(A2型题)患者,男,60岁。慢性乙型病毒性肝炎30余年。进食油炸麻花后突发呕血和黑便。该患者呕血的原因可能是

- A.凝血功能异常
- B.胃溃疡出血
- C.急性胃黏膜病变
- D.食管-胃底静脉曲张破裂出血
- E.十二指肠溃疡

46、(A2型题)患者,男,46岁。因上消化道大量出血伴休克,紧急入院抢救,护士采取的措施中不妥是

- A.头低足高卧位
- B.暂禁食
- C.建立静脉通路
- D.迅速交叉配血
- E.氧气吸入

47、(A2型题)患者,女,25岁,上消化道出血入院2天,已行三腔管止血,今晨护士接班时,注意到患者出血已停止,接下来可采取的处理措施是

- A.拔去三腔管
- B.放气数分钟再注气加压
- C.可进行鼻饲
- D.遵医嘱拔管
- E.放气,留观24小时

48、(A2型题)患者,男,50岁。急性腹膜炎行腹腔引流术后5天,患者出现下腹部坠胀感,排便次数增多,黏液便,伴尿频、尿急、排尿困难等症状,考虑并发

- A.急性肠炎
- B.膀胱炎
- C.膈下脓肿
- D.盆腔脓肿
- E.肠袢间脓肿

49、(A2型题)患者,男,32岁。既往有胃病史,近一周常感上腹部不适,4小时前突发上腹部剧烈疼痛,伴有恶心、呕吐,查体:腹部压痛、肌紧张,肝浊音界缩小,X线检查可见膈下游离气体,首先考虑

- A.急性阑尾炎穿孔
- B.胆囊炎穿孔
- C.急性胰腺炎
- D.溃疡病穿孔
- E.急性肠梗阻

50、(A1型题)支气管哮喘患者呼吸困难的特点是呼气比吸气更为困难,原因是

- A.吸气是被动的,呼气是主动的
- B.吸气时肺弹性阻力减小,呼气时肺弹性阻力增大

- C.吸气时胸廓弹性阻力增大，呼气时胸廓弹性阻力增大
- D.吸气时气道阻力减小，呼气时气道阻力增大
- E.呼气时胸内负压减小，吸气时胸内负压增大

51、(A1型题)对大量咯血的病人，护理措施不妥的是

- A.护士应守护在床旁
- B.烦躁不安者可用地西洋
- C.心理安慰
- D.屏气以止血
- E.保持呼吸道通畅

52、(A2型题)患者，男性，37岁。因支气管扩张合并感染入院，昨日出现大咯血，提示患者24小时咯血量超过

- A.100ml
- B.300ml
- C.500ml
- D.700ml
- E.1000ml

53、(A2型题)患者，男性，56岁。诊断为支气管扩张，咯血100ml后突然出现胸闷气促、张口瞪目、两手乱抓、大汗淋漓、牙关紧闭。此时患者应取

- A.头低足高位，头偏向一侧
- B.去枕平卧位
- C.平卧位，头偏向一侧
- D.端坐位
- E.患侧卧位

54、(A2型题)男性，40岁。因寒战、高热，咳嗽，胸痛，来院急诊。胸透右上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌(+)，该病人血象如何

- A.嗜酸粒细胞增加
- B.淋巴细胞增加
- C.中性粒细胞增加
- D.大单核细胞增加
- E.嗜碱性细胞增加

55、(A2型题)患者，男性，74岁。反复咳嗽、咳痰伴喘息30年，5年前出现逐渐加重的呼吸困难，诊断为COPD，当患者血气分析结果为 $PaO_2 55\text{mmHg}$ 、 $SaO_2 85\%$ ，氧疗护理措施正确的是

- A.高浓度、高流量持续吸氧
- B.高浓度、高流量间歇吸氧
- C.低浓度、低流量持续吸氧
- D.低浓度、低流量间歇吸氧
- E.高压氧舱

56、(A1型题)支气管哮喘的主要临床表现是

- A.吸气性呼吸困难伴“三凹征”
- B.发作性呼吸困难伴窒息感
- C.反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D.带哮鸣音的混合性呼吸困难
- E.呼吸困难伴哮鸣音

57、(A1型题)慢性肺心病长期氧疗，每日持续吸氧时间应超过

- A.7小时
- B.9小时
- C.19小时
- D.12小时
- E.15小时

- 58、(A1型题) 良性肿瘤的病理特点是
- A.生长迅速
 - B.与周围组织界限不清
 - C.细胞分化成熟
 - D.无包膜
 - E.疼痛不明显
- 59、(A1型题) 恶性肿瘤局部的一般表现是
- A.表面光滑
 - B.界限清楚
 - C.有完整包膜
 - D.晚期剧痛
 - E.质地软
- 60、(A1型题) 良性肿瘤的局部表现包括
- A.无包膜
 - B.形状规则
 - C.质地硬
 - D.活动度小
 - E.多发常见
- 61、(A1型题) 肿瘤定性诊断的检查是
- A.血常规
 - B.B超
 - C.血生化
 - D.X线造影
 - E.病理检查
- 62、(A1型题) 肝癌按组织细胞分型,最常见的类型是
- A.混合型
 - B.胆管细胞型
 - C.肝细胞型
 - D.结节型
 - E.弥漫型
- 63、(A1型题) 阿尔茨海默症患者首发的症状是
- A.妄想
 - B.人格改变
 - C.记忆障碍
 - D.语音功能障碍
 - E.视空间机能障碍
- 64、(A1型题) 对于化疗患者的护理,正确的是
- A.化疗前测1次体重即可
 - B.化疗前测体重,以后每半月1次
 - C.化疗前测体重,以后每2个月1次
 - D.化疗药应提前1天配置
 - E.化疗药配置后可在常温下放置2小时
- 65、(A1型题) 化疗药物不慎溢出血管外,处理不正确的是
- A.停止注药或输液
 - B.局部冷敷
 - C.热敷24小时
 - D.局部封闭

E.保留针头回抽药液

66、(A1型题)关于食管癌的早期表现,正确的描述是

- A.吞咽哽噎感
- B.呼吸困难
- C.失音
- D.持续性腹痛
- E.腹胀

67、(A1型题)痛经患者疼痛的性质主要是

- A.针刺样疼痛
- B.刀割样疼痛
- C.坠胀痛
- D.烧灼样疼痛
- E.牵扯痛

68、(A2型题)患者,女性,61岁,食管癌。拟行根治手术治疗,术前准备不包括

- A.备皮、皮试
- B.胃肠道准备
- C.呼吸道准备
- D.术前用药
- E.强心治疗

69、(A2型题)患者,女性,48岁,食管癌。拟行根治手术治疗。护士为患者行术前准备,不包括

- A.心理护理
- B.肠道准备
- C.放置胃管
- D.练习深呼吸、有效咳嗽
- E.术前3天每晚洗胃

70、(A1型题)胃癌的常发部位是

- A.胃体
- B.幽门部
- C.胃窦部
- D.胃底部
- E.胃后壁

71、(A1型题)提高胃癌治愈率的关键是

- A.早期诊断
- B.心情愉快
- C.积极化疗
- D.免疫治疗
- E.生物治疗

72、(A1型题)下列因素中,可能成为原发性肝癌促进因素的是

- A.油腻饮食
- B.乙型肝炎病毒
- C.亚硝胺类化学物质
- D.酒精肝
- E.吸烟

73、(A1型题)对原发性肝癌确诊率高而又简便的检查是

- A.甲胎蛋白测定
- B.乙肝五项
- C.CT检查

- D.肝功能
- E.磁共振

74、(A1型题)胰头癌最主要的临床表现是

- A.恶心、呕吐
- B.进行性黄疸
- C.腹胀
- D.低血糖
- E.乏力,消瘦

75、(A1型题)结肠癌发生血行转移的常见部位是

- A.骨
- B.胰
- C.肝
- D.肾
- E.脊椎

76、(A1型题)结肠癌最早出现的症状是

- A.排便习惯及粪便形状改变
- B.腹痛
- C.便秘
- D.低热
- E.消瘦

77、(A2型题)患儿,女,2岁。1天前出现发热、声音嘶哑、喉鸣和吸气性呼吸困难、双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音,心率加快。该患儿最可能的诊断是

- A.上呼吸道感染
- B.支气管哮喘
- C.支气管肺炎
- D.急性感染性喉炎
- E.肺炎合并心衰

78、(A2型题)患者,女性,60岁,因发热、头痛、恶心、呕吐三天来院收住。查体:T39.8℃,左下肺可闻及散在湿啰音,白细胞计数 $13 \times 10^9/L$ 。入院诊断:急性支气管炎。下列哪项可作为该病人的护理问题

- A.头痛难忍
- B.白细胞增高
- C.恶心、呕吐不适三天
- D.听诊肺部湿啰音
- E.体温过高

79、(A2型题)患者,女性。患急性上呼吸道感染。为防止交互感染,家属应做好

- A.多休息、多饮水
- B.用抗生素预防
- C.长期家庭氧疗
- D.室内食醋熏蒸
- E.呼吸道隔离

80、(A2型题)患者,男性,23岁。4天前出现频繁干咳,伴有胸骨后不适,乏力,未予重视。昨日出现咳嗽、咳吐黏液脓痰,痰中偶有血丝。体检:肺部散在干、湿啰音,X线示肺纹理增粗。该患者最可能的诊断是

- A.普通感冒
- B.急性病毒性支气管炎
- C.急性气管-支气管炎
- D.肺结核

E.支气管肺癌

81、(A2型题)患者,女性,46岁。咳嗽,咳痰,痰液黏稠,不易咳出。对此提出的护理诊断或问题是

- A.活动无耐力
- B.气体交换受损
- C.清理呼吸道无效
- D.低效性呼吸型态
- E.知识缺乏

82、(A3/A4型题)护士首先提出的护理问题应是

- A.营养失调
- B.体液不足
- C.体温过高
- D.活动无耐力
- E.清理呼吸道无效

83、(A3/A4型题)护士首先应给予的护理措施是

- A.立即降温
- B.少食多餐
- C.雾化吸入
- D.氧气吸入
- E.静脉补充高营养

84、(A2型题)老年病人因寒战、高热咳嗽一天而入院。诊断为肺炎球菌肺炎,次日体温骤降,伴四肢厥冷、大汗及意识模糊,血压 10.7/7.3kPa,下列哪项护理措施不妥

- A.去枕平卧位
- B.热水袋保暖
- C.迅速建立静脉通道
- D.快速滴入低分子右旋糖酐
- E.高流量吸氧

85、(A2型题)患儿,女,1岁。被诊断为肺炎,今日突然出现烦躁不安,呼吸困难,发绀,呼吸 65次/分,心率 160次/分,右肺叩诊鼓音,听诊呼吸音减低,肝肋下 2.5cm,X线示纵膈向左移位。该患儿最可能并发了

- A.脓胸
- B.肺不张
- C.心力衰竭
- D.气胸
- E.支气管异物

86、(A2型题)患儿,女,5个月。T37.9℃,呛奶,咳嗽,有痰咳不出,出现面色发绀,呼吸急促,双肺可闻及散在的干、湿啰音。该患儿目前最需要解决的护理问题是

- A.营养失调
- B.体液不足
- C.气体交换受损
- D.清理呼吸道无效
- E.低效性呼吸型态

87、(A2型题)患者,男性,25岁。因受凉后突然畏寒、高热伴右胸部疼痛 1天入院。胸部透视,见右中肺有大片浅淡的阴影。诊断为“右下肺炎”入院治疗,给予抗生素治疗。疗程一般为

- A.3天
- B.退热后就停药
- C.4天
- D.7天

E.1天

88、(A2型题)一休克患者,在抢救过程中出现呼吸困难、发绀,吸氧无效,PaO₂持续降低。诊断是休克肺,护理措施首先应采取

- A.呼气终末正压给氧
- B.持续吸纯氧
- C.快速输液
- D.给血管活性药物
- E.气管切开

89、(A2型题)患者,男性,62岁。因肺炎用抗生素连续治疗,近日发现口腔黏膜有白色附着物,用棉签拭去附着物可见出血。考虑口腔病变是

- A.维生素缺乏
- B.凝血功能障碍
- C.铜绿假单胞菌感染
- D.病毒感染
- E.真菌感染

90、(A2型题)患儿,女,1岁。3天前因受凉出现发热,咳嗽,轻度喘憋,食欲减退,查体:T37.5℃,心率140次/分,呼吸58次/分,口周发绀,鼻翼扇动,肺部听诊有中量湿罗音。护士为患儿鼻导管吸氧,氧流量应调节为

- A.0.5~1L/min
- B.1.5~2L/min
- C.2.0~3L/min
- D.3.0~4L/min
- E.4L/min以上

91、(A2型题)患者,女性,36岁。诊断为支气管扩张,咳嗽,咳痰,痰量60ml/d,最应采取的护理措施是

- A.提供通风良好的病室环境
- B.指导患者大量饮水
- C.采取体位引流
- D.机械吸痰
- E.鼓励患者使用祛痰药

92、(A3/A4型题)导致本病人支气管扩张的可能因素是幼年时患过

- A.百日咳
- B.猩红热
- C.水痘
- D.腮腺炎
- E.风疹

93、(A2型题)患者,男性,74岁。反复咳嗽、咳痰伴喘息30年,5年前出现逐渐加重的呼吸困难,诊断为COPD,当患者血气分析结果为PaO₂55mmHg、SaO₂85%,氧疗护理措施正确的是

- A.高浓度、高流量持续吸氧
- B.高浓度、高流量间歇吸氧
- C.低浓度、低流量持续吸氧
- D.低浓度、低流量间歇吸氧
- E.高压氧舱

94、(A2型题)患者,男性,64岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病,在发病的过程中,还出现了持续体重下降,呼吸进食时出现无力。针对此症状,最合适的护理问题是

- A.自理能力缺陷
- B.疲乏
- C.舒适的改变
- D.营养失调:低于机体需要量

E.潜在并发症:电解质紊乱

95、(A2型题)患者,男性,67岁。慢性肺气肿病史30多年,2周前感冒,后出现发热,咳嗽,咳大量黏液脓痰,近3日来咳嗽无力,痰不易咳出,气急、发绀。最主要的护理诊断是

- A.气体交换受损
- B.清理呼吸道无效
- C.有窒息的危险
- D.呼吸型态紊乱
- E.恐惧

96、(A2型题)患者,男性,80岁。慢支肺气肿病史30年,近1周来出现咳嗽,咳大量黏液脓痰,伴心悸、气喘,查体呼吸急促、发绀明显,颈静脉怒张、下肢水肿。该患者氧疗时,给氧浓度和氧流量应为

- A.29%,2L/min
- B.33%,3L/min
- C.37%,4L/min
- D.41%,5L/min
- E.45%,6L/min

97、(A2型题)患者,女性,22岁。哮喘发作,痰栓阻塞细支气管,大量脓痰不易咳出,心悸乏力,表情淡漠,嗜睡。首要的护理措施为

- A.高压氧治疗
- B.鼻导管低浓度、低流量吸氧
- C.体位引流
- D.机械吸痰
- E.湿化呼吸道

98、(A3/A4型题)如果对刘某进行预防性治疗常选用

- A.泼尼松
- B.茶碱类
- C.色甘酸钠
- D.氨哮素
- E.二丙酸倍氯米松气雾剂

99、(A3/A4型题)针对该患者的情况,护士应采取的主要护理措施是

- A.改善通气,缓解呼吸困难
- B.避免接触感染原
- C.加强饮食指导,增加营养
- D.消除恐惧
- E.预防哮喘复发

100、(A2型题)某慢性阻塞性肺气肿病人,剧烈咳嗽后突然出现右侧剧烈胸痛、呼吸困难加重,右胸叩诊鼓音。应考虑并发症为

- A.慢性肺心病
- B.肺炎
- C.自发性气胸
- D.肺不张
- E.胸膜炎

答案

1、正确答案: B

答案解析: 【解析】麦氏点是体表投影在脐与右髂前上棘连线中、外1/3交界处。

2、正确答案：C

答案解析：【解析】消化性溃疡的主要病因：幽门螺杆菌（HP）感染。

3、正确答案：E

答案解析：【解析】消化性溃疡的并发症：幽门梗阻：以“痛、呕、胀”为主，严重呕吐可致失水或低氯、低钾性碱中毒，大量呕吐后症状可暂缓解，呕吐物含发酵酸性宿食，不含胆汁。

4、正确答案：C

答案解析：【解析】消化性溃疡的并发症：上消化道出血。表现为呕血、黑便，出血量大于 800 ml 可致失血性休克。

5、正确答案：D

答案解析：【解析】低钾血症：血钾 $<3.5\text{mmol/L}$ ，主要表现为①神经肌肉兴奋性降低：精神不振、无力、腱反射减弱或消失，腹胀、肠鸣音减弱或消失；②心脏损害：心音低钝，心律失常，心电图出现 U 波等。

6、正确答案：B

答案解析：【解析】定输液种类（定性）：低渗性脱水补 2/3 张至等张含钠液，等渗性脱水补 1/2~2/3 张含钠液，高渗脱水补 1/3~1/4 张含钠液。

7、正确答案：A

答案解析：【解析】急性阑尾炎最常见的病因是阑尾腔阻塞，大多数病人是由于淋巴滤泡增生引起的，其次是粪石阻塞异物、炎性狭窄、寄生虫、肿瘤等引起。

8、正确答案：B

答案解析：【解析】二期便血加重，严重时呈喷射状，排便时痔块脱出，但便后可自行还纳。

9、正确答案：B

答案解析：【解析】各种肝硬化，特别是肝炎后肝硬化是引起肝性脑病的常见病因。

10、正确答案：D

答案解析：【解析】解痉止痛：诊断明确者可给予哌替啶或哌替啶+阿托品肌肉注射，禁用吗啡，以免引起 Oddi 括约肌痉挛。

11、正确答案：C

答案解析：

12、正确答案：B

答案解析：

13、正确答案：A

答案解析：

14、正确答案：C

答案解析：【解析】无。

15、正确答案：E

答案解析：

16、正确答案：D

答案解析：溃疡性结肠炎的治疗原则：柳氮磺吡啶。为氨基水杨酸制剂，是首选药物，适用于轻、中型或重型（腹泻次数 >6 次/日），经糖皮质激素治疗已有缓解者。

17、正确答案：D

答案解析：

18、正确答案：D

答案解析：

19、正确答案：B

答案解析：

20、正确答案：C

答案解析：

21、正确答案：B

答案解析：

22、正确答案：C

答案解析：

23、正确答案：E

答案解析：

24、正确答案：E

答案解析：

25、正确答案：C

答案解析：参见“2016年护士执业资格考试核心考点全攻略(上册)”P197：直肠指检：对直肠肛管周围脓肿有重要意义。

26、正确答案：D

答案解析：

27、正确答案：B

答案解析：

28、正确答案：E

答案解析：

29、正确答案：E

答案解析：

30、正确答案：D

答案解析：

31、正确答案：C

答案解析：

32、正确答案：E

答案解析：

33、正确答案：C

答案解析：

34、正确答案：C

答案解析：

35、正确答案：B

答案解析：

36、正确答案：D

答案解析：

37、正确答案：B

答案解析：

38、正确答案：A

答案解析：

39、正确答案：B

答案解析：

40、正确答案：C

答案解析：

41、正确答案：B

答案解析：

42、正确答案：C

答案解析：

43、正确答案：C

答案解析：

44、正确答案：E

答案解析：

45、正确答案：D

答案解析：

46、正确答案：A

答案解析：

47、正确答案：E

答案解析：

48、正确答案：D

答案解析：

49、正确答案：D

答案解析：

50、正确答案：D

答案解析：提示：呼气比吸气更为困难是因为吸气时气道阻力减小，呼气时气道阻力增大，所以呼气比吸气更为困难。

51、正确答案：D

答案解析：提示：屏气以止血易出现血块凝固，堵住呼吸道，出现窒息。

52、正确答案：C

答案解析：提示：咯血量 $<100\text{ mL/d}$ ，为小量咯血，当咯血量为 $100\sim 500\text{ mL/d}$ ，为中量咯血，当咯血量 $>500\text{ mL/d}$ 或1次咯血量 $>300\text{ mL}$ ，为大量咯血。

53、正确答案：A

答案解析：提示：体位引流：根据病变部位采取合适体位进行引流，进行头低脚高位引流时，应密切观察病人身体状况，以免发生意外。

54、正确答案：C

答案解析：提示：血象检查：白细胞计数增高，一般可达 $(10\sim 20) \times 10^9/L$ ，中性粒细胞多在 80% 以上，并有核左移，胞浆内可见中毒性颗粒。

55、正确答案：C

答案解析：提示：急性加重期的治疗，吸氧：低流量、低浓度吸氧，给氧浓度 $(\%) = 21 + 4X$ 氧流量 (L/min) ，一般为 28% ~ 30%。

56、正确答案：C

答案解析：提示：症状：发病前出现干咳、打喷嚏、流泪等先兆表现，发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难，或发作性胸闷、咳嗽、咳痰是哮喘的典型临床表现。

57、正确答案：E

答案解析：

58、正确答案：C

答案解析：提示：C 细胞分化成熟！为良性肿瘤特点。a, b d e 均为恶性肿瘤的特点。

59、正确答案：D

答案解析：提示：1.恶性肿瘤分化不好，异型性大，与原有组织的形态差别大。2.恶性肿瘤核分裂像多见，并可见病理核分裂像。3.生长速度：恶性肿瘤较快。4.恶性肿瘤为浸润性和外生性生长，与周围组织一般分界不清楚，故通常不能推动。5.晚期常伴有剧痛。

60、正确答案：B

答案解析：提示：良性肿瘤是指机体内某些组织的细胞发生异常增殖，呈膨胀性生长，似吹气球样逐渐膨大，生长比较缓慢。由于瘤体不断增大，可挤压周围组织，但并不侵入邻近的正常组织内，瘤体多呈球形、结节状。周围常形成包膜，因此与正常组织分界明显，用手触摸，推之可移动，手术时容易切除干净，摘除不转移，很少有复发。

61、正确答案：E

答案解析：提示：病理检查能够确定肿瘤的类型。

62、正确答案：C

答案解析：提示：病理类型大体有结节型、巨块型和弥漫型，以结节型多见，多伴有肝硬化，病理组织学类型分肝细胞型、胆管细胞型和混合型，我国以肝细胞型为主。

63、正确答案：C

答案解析：提示：记忆障碍是 A D 的早期突出症状或核心症状，其特点是近事遗忘先出现，记不住新近发生的事，对原有工作不能胜任。

64、正确答案：B

答案解析：提示：使用化疗药时，要注意观察体重，化疗前测体重，以后每半月 1 次。

65、正确答案：C

答案解析：提示：“热敷 24 小时”此观点错误，早期应冷敷。

66、正确答案：A

答案解析：提示：初期症状不明显，进食时有哽咽感、异物感，胸骨后或剑突下有刺痛、烧灼感、异物感等症状。

67、正确答案：C

答案解析：提示：主要症状是月经期下腹坠胀痛或痉挛痛，最早出现于经前 1 2 小时，行经第 1 天最剧烈，2 ~ 3 天后可缓解。

68、正确答案：E

答案解析：提示：1.加强营养：根据患者进食情况，提供高蛋白、高热量和富含维生素的流质或半流质饮食，长期不能进食或情况差者，可先行胃造瘘，补充营养。2.肠道准备：术前 3 天进流质饮食，食管梗阻者术

前3天每晚插胃管并用抗生素生理盐水冲洗胃管，术前3~5天口服肠道抗生素，术前2天给予无渣饮食，准备行结肠代食管者。应做好肠道准备。3.呼吸道准备：术前戒烟2周，教会患者深呼吸、有效咳嗽、咳痰。

69、正确答案：E

答案解析：提示：食管癌术前3天流质饮食，餐后漱口，冲洗食管。餐后、睡前口服新霉素或甲硝唑消炎。食管梗阻的患者，术前3天每晚用抗生素生理盐水冲洗食管，以减轻水肿，预防术后吻合口瘘的发生。手术日晨旋转胃管，梗阻部位不可强行插入。

70、正确答案：C

答案解析：提示：胃癌多见于胃窦部，其次为胃小弯和贲门。

71、正确答案：A

答案解析：提示：早期诊断是治愈胃癌的关键。

72、正确答案：B

答案解析：提示：病因：①病毒性肝炎：乙肝最常见。②肝硬化。③真菌及其毒素：黄曲霉毒素最重要。④亚硝胺类化合物。⑤化学致癌物。⑥酒精中毒等。

73、正确答案：A

答案解析：提示：甲胎蛋白(AFP)是肝癌的特异性指标，是目前诊断肝癌最常用、最重要的方法。

74、正确答案：B

答案解析：提示：由于胰头肿物压迫梗阻了胰、胆管的出路，所以临床上的主要表现是进行性无痛性黄疸。

75、正确答案：C

答案解析：提示：血行转移：一般癌细胞或癌栓子沿门静脉系统先达肝脏，后到肺、脑、骨等其它组织脏器。血行转移一般是结肠癌癌肿侵犯至毛细血管小静脉内，但也有由于体检时按压瘤块、手术时挤压瘤体所致，甚至梗阻时的强烈蠕动皆可促使癌细胞进入血行。

76、正确答案：A

答案解析：【解析】早期多无症状，随着病情的发展可出现排便习惯和粪便性状改变，是最早出现的症状。

77、正确答案：D

答案解析：提示：音嘶哑、喉鸣和吸气性呼吸困难提示大气道出现问题，应为急性感染性喉炎。

78、正确答案：E

答案解析：提示：患者T39.8℃，主要的护理问题是体温过高。

79、正确答案：E

答案解析：提示：急性上呼吸道感染应该进行呼吸道隔离。

80、正确答案：C

答案解析：提示：咳嗽是急性支气管炎的主要表现，开始为刺激性干咳，3~4天后鼻咽部症状减轻，咳嗽转为持续并成为突出症状，受凉、吸入冷空气、晨起晚睡或体力活动时咳嗽加剧。咳嗽可为阵发性或持续性，剧咳时可伴恶心、呕吐及胸、腹肌疼痛。咳嗽可持续2~3周左右，吸烟者则更长。半数病人有咳痰，痰为黏液性，随病程发展可转为脓性痰，偶可痰中带血。

81、正确答案：C

答案解析：提示：咳痰，痰液黏稠，不易咳出主要的护理诊断是清理呼吸道无效。

82、正确答案：C

答案解析：提示：患者发热，T39.5℃，首要的护理问题是体温过高。

83、正确答案：A

答案解析：提示：发热，T39.5℃应立即降温。

84、正确答案：B

答案解析：提示：患者四肢厥冷、大汗及意识模糊，血压低易出现休克应去枕平卧位，迅速建立静脉通道，快速滴入低分子右旋糖酐，吸氧。

85、正确答案：D

答案解析：提示：右肺叩诊鼓音，X线示纵膈向左移位，提示气胸。

86、正确答案：D

答案解析：提示：有痰咳不出出现面色发绀，呼吸急促首要的护理问题是清理呼吸道无效。

87、正确答案：D

答案解析：提示：抗生素疗程一般为7天，热退后3天即可停药。

88、正确答案：A

答案解析：提示：吸氧无效，PaO₂持续降低应呼气终末正压给氧。

89、正确答案：E

答案解析：提示：患者大量使用抗生素，口腔黏膜有白色附着物，提示真菌感染。

90、正确答案：A

答案解析：提示：患儿轻度喘憋，鼻导管吸氧，氧流量应调节为0.5~1L/min。

91、正确答案：C

答案解析：提示：支气管扩张，有痰应采取体位引流，进行头低脚高位引流时，应密切观察病人身体状况，以免发生意外。

92、正确答案：A

答案解析：提示：婴幼儿期支气管-肺组织感染是最常见原因，以婴幼儿期的麻疹、百日咳等多见。

93、正确答案：C

答案解析：提示：急性加重期的治疗，吸氧：低流量、低浓度吸氧，给氧浓度(%)=21+4×氧流量(L/min)，一般为28%~30%。

94、正确答案：D

答案解析：提示：患者出现了持续体重下降，呼吸进食时出现，最合适的护理问题是营养失调：低于机体需要量。

95、正确答案：B

答案解析：提示：咳嗽，咳大量黏液脓痰近3日来咳嗽无力，痰不易咳出，最主要的护理诊断是清理呼吸道无效。

96、正确答案：A

答案解析：提示：提示：大量黏液脓痰呼吸急促、发绀明显，颈静脉怒张、下肢水肿，证明在急性期，氧浓度和氧流量应为29%，2L/min。

97、正确答案：D

答案解析：提示：痰栓阻塞细支气管，大量脓痰不易咳出应保持呼吸道通畅进行机械吸痰。

98、正确答案：C

答案解析：对于预防运动性哮喘最有效的

99、正确答案：A

答案解析：提示：改善通气，缓解呼吸困难，解除支气管痉挛，保持呼吸道通畅。

100、正确答案：C

答案解析：提示：右侧剧烈胸痛、呼吸困难加重，右胸叩诊鼓音提示自发性气胸。

+ 微信YK23543