

眼科（中级）

〔专业代码:334〕

-
- 1、医务人员医德考评应当认定为较差的情形是**违反医疗服务和药品价格政策，多计费、多收费或者私自收取费用，情节严重的**
 - 2、医学道德评价的方式有**社会舆论、传统习俗和内心信念**
 - 3、专属于问诊中的道德要求的是**语言亲切、平易近人**
 - 4、医务人员医德考评的首要标准是**救死扶伤，全心全意为人民服务**
 - 5、《卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见》提出的八项行业纪律之一的是**医疗机构不准使用无生产批准文号的自制药品与制剂**
 - 6、医学行为是否有利于医学科学发展和揭示人类的生命奥秘是**医德评价的科学标准**
 - 7、严密观察、精心治疗属于**手术后的道德要求**
 - 8、医学道德监督的叙述：通过**法律监督**来约束医务人员职业行为
 - 9、影响医患关系的最次要因素是**患者所在单位的因素**
 - 10、临床诊疗工作中最基本的原则是**患者第一**
 - 11、医患关系遵循的最重要的道德原则是**医患平等关系**
 - 12、专属于体格检查中的道德要求的是**尊重病人、耐心细致**
 - 13、安全有效属于**药物治疗中的道德要求**
 - 14、同情和开导病人属于**心理治疗的道德要求**
 - 15、医德考评要坚持**实事求是、客观公正**的原则
 - 16、在**临床诊疗活动中**，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**
 - 17、医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是**医德评价的医疗标准**
 - 18、保持镇定、作风严谨属于**手术治疗中的道德要求**
 - 19、广义的医患关系是指**各类医务人员与患者及其家属的关系**

-
- 20、医师在执业活动中享有的权利是**在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯**
- 21、关于医疗机构从业人员行为规范的实施与监督，实施和执行本规范的情况，是**医疗机构年度考核和医师定期考核**的重要内容，但不影响**医疗机构等级评审、医务人员职称晋升**
- 22、《医疗机构从业人员行为规范》是**2012年6月26日**公布执行的
- 23、医疗机构从业人员既要遵守本文件所列**基本行为规范**又要遵守与**职业**相对应的分类行为规范
- 24、**卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局**共同参与组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》
- 25、《医疗机构从业人员行为规范》适用于**医疗机构内所有从业人员**
- 26、弘扬**高尚医德**，严格自律,不索取和非法收受患者财物不利用执业之便谋取不正当利益。
- 27、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 28、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指依法取得**执业医师资格或者执业助理医师资格**，经注册在**医疗、预防、保健机构中执业**的专业医务人员
- 29、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 30、“以人为本，践行宗旨”的行为规范，主要体现在**以病人为中心，全心全意为人民健康服务**
- 31 遵守**医学伦理道德**,尊重患者的**知情同意权和隐私权**，为患者保守**医疗秘密和健康隐私**,维护患者合法权益
- 32、医疗机构从业人员分为**6个**类别
- 33、医师在执业活动中应履行的义务是**遵守法律、法规，遵守技术规范**
- 34、**纪检监察纠风部门**负责对实施情况进行监督检查
- 35、“不索取和非法收受患者财物；不收受**医疗器械、药品、试剂**等生产、经营企业或人员以

各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了**廉洁自律，恪守医德**的基本行为规范

36、医师高度的责任心应**贯穿执业全过程**

37、**实验性临床医疗**应充分保障患者本人或其家属的知情同意权

38、**电脑自动验光仪检测**不适用于屈光间质混浊患者

39、**睑板腺囊肿**好发于**青少年**

40、对 X、Y 两个变量作线性回归分析的条件之一是**仅要求 Y 变量服从正态分布即可**

41、**临床疗效的随访资料**不适合用 Logistic 回归分析

42、10%糖尿病患者可发生眼底改变，出现的时间大约在病后**5~9 年**

43、相关系数 r 与决定系数 r^2 的意义表述： r^2 值接近于零表明**直线回归的贡献很小**

44、引起沙眼的病原体为**沙眼衣原体 A、B、C、Ba 型**

45、基因治疗中，可用做活体直接转移的基因载体是**腺病毒**

46、**头孢噻吩**治疗绿脓杆菌性角膜炎效果差

47、角膜上皮获得所消耗的氧主要来自**大气**

48、儿童原发眼眶恶性肿瘤首位是**眼眶横纹肌肉瘤**

49、抽样误差最大的抽样方法是**整群抽样**

50、动脉粥样硬化很少累及**眼动脉**

51、全身给药后，药物对眼内的通透性不受**药物的水溶性**因素影响

52、指标中，随着研究样本量的增加而减少的是**随机误差**

53、如果在处理定量资料时用多次 t 检验取代方差分析和两两比较，这样做将导致**假阳性错误率增大**

54、验证病因假设最可靠的方法是**干预研究**

-
- 55、关于 Goldmann 眼压计，每次测量所压平角膜的面积**相同**
- 56、反映一组性质相同的观测值的平均水平，常选用算数平均数和几何平均数。适合用几何平均数计算的资料应该是服从**对数正态分布**
- 57、**低温冷冻(-70°C)**不能使病毒灭活
- 58、睑结膜面局限充血、肿胀，有硬结、疼痛和压痛，2~3 天后其中心形成黄色脓点，多可自行穿破睑结膜面而痊愈。此病症为**内睑腺炎**
- 59、**去氧肾上腺素**无睫状肌麻痹作用
- 60、维生素 A 缺乏的最早期临床表现是**暗适应能力低下**
- 61、当药物浓度在一定范围增加时，药物在角膜的通透性**也随之增加**；当超过一定范围时，**虽然浓度增加但药物的角膜通透性并不增加，甚至减低**
- 62、真菌对**紫外线**耐受性较强
- 63、在视屏的各个选点上，由弱至强增加视标亮度的测量视野的方法属于**静态视野检查法**
- 64、对于真菌性角膜溃疡最有诊断价值的是**溃疡区刮片找到真菌菌丝**
- 65、关于眼底照相机，采用红外光作为**聚焦照明光源时可以不使用散瞳药**
- 66、视网膜母细胞瘤最常见的生长方式是**混合生长型**
- 67、遗传性疾病是由于**遗传物质改变**导致的疾病
- 68、视网膜母细胞瘤的发病机制是**抑癌基因 RB1 突变**所致
- 69、老年的睑板腺囊肿患者多次复发，要考虑**睑板腺癌**
- 70、**痤疮丙酸杆菌**是人工晶状体植入术后迟发性眼内炎致病菌
- 71、葡萄膜恶性黑色素瘤预后最好的类型是**梭形细胞型**
- 72、从前往后，泪膜的结构为**脂质层，水液层，黏蛋白层**
- 73、交界性肿瘤是指**肿瘤的形态和生物学行为介于良性和恶性之间**

-
- 74、化脓性角膜溃疡病灶内的主要炎性细胞是**中性粒细胞**
- 75、角膜内皮显微镜的基本原理是**利用角膜内皮细胞和房水界面产生的镜面反射**
- 76、眼科常见的 RNA 病毒是**肠道病毒 70**
- 77、我国真菌性眼部感染最多见的病原体是**镰刀菌属**
- 78、一般不会受到应答率高低的因素是**研究对象中合格的参加者人数**
- 79、眼部转移性肿瘤最常见的转移部位是**脉络膜**
- 80、Orbscan 角膜地形图系统，可用于**检测前房的深度及晶状体的厚度**
- 81、**春季性结膜炎**属于 I 型超敏反应
- 82、裂隙灯显微镜的描述：棱镜的作用是**倒转显微镜最后的倒置的像**
- 83、带状疱疹性睑皮炎的疱疹分布于下睑、颊部及上唇皮肤，但不超过中线，示病毒感染了**三叉神经的第 2 支**
- 84、检查某人视力，如果在 1m 处才能看清 0.1 行视标，则该眼视力为 **0.02**
- 85、检影距离为 67cm，影动为逆动，逐渐增加度数至 -2.00D 时影像中和，再增加负镜时影动变为顺动，则被检眼的实际度数为 **-3.50D**
- 86、**颅内占位性病变**多引起象限性视野缺损
- 87、用于测量眼球轴长，**最准确的是 A 超**
- 88、将马氏杆横置于患者右眼前，令其注视 33cm 点光源，患者诉光线在光点内侧，该患者眼位是**外斜位**
- 89、最适宜眼眶骨折的检查是 **CT**
- 90、患者女，20 岁，诉右眼自小常流泪，眼前段及眼底检查未见异常，为其冲洗泪道，左眼冲洗通畅，而冲洗右眼时冲洗液自下泪小点注入，由上泪小点返回，提示患眼**泪总管阻塞**
- 91、一被检者在遮盖试验中，交替遮盖试验时见眼球由外向内转动，而遮盖右眼时左眼由外向

内转动，去遮盖右眼后，左眼由内向外转动，则最可能的诊断是左眼持续性外斜视

92、角膜映光法检查时，如反光点位于瞳孔缘与角膜缘中间，提示斜视角约 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$

93、闪光视网膜电图对视网膜色素变性的早期诊断最有意义

94、压平式眼压计最不受眼球壁硬度和角膜弯曲度的影响

95、一般不用检眼镜检查的是虹膜

96、患者女，36岁，右眼被飞溅的碎玻璃击中致伤1天。检查：全身情况尚可，右眼视力：

手动，左眼视力：1.2；颞侧角膜可见贯通伤口。如果看不到异物，应对患者进行磁共振检查

97、患者男，15岁，摔伤后歪头视物半年，检查见视力 OD1.0，OS1.0，双眼前节及眼底检查未见异常，眼位角膜映光 OD+ 10° R/L 15° ，代偿头位，头向左肩倾，面向左转，下颌内收，右眼内转伴上转，Bielschowsky 征右侧(+)，最可能的诊断是右眼上斜肌麻痹

98、患儿女，9岁，右眼睑不慎被沸水烫伤，局部立即出现红、肿、痛，随之皮肤上起水泡，

其病变属于浆液性炎

99、先天性睑裂狭小综合征不应出现的表现是上睑内翻

100、带状疱疹性睑皮炎最常累及的神经是三叉神经

101、眼睑毛细血管瘤的首选治疗方法是局部激素治疗

102、瘢痕性睑内翻最常见的原因是沙眼

103、患儿男，2岁3个月，左眼眼球穿通伤行角膜伤口修补术后1天，因前房炎症反应重，瞳孔区渗出浓密，给予阿托品眼膏涂左眼，用药后半小时患儿哭闹，左眼睑红肿、局部皮温略高、球结膜轻度水肿，最可能的原因是阿托品眼膏过敏导致接触性皮炎，应立即停用

104、患儿男，2岁，左眼自出生起较右眼小，在咀嚼时左眼可睁大至右眼大小。检查：左眼睑裂高度7mm，上睑缘位于瞳孔上缘水平，提上睑肌肌力8mm，右眼睑裂高度9mm。左眼在咀嚼时可以睁大至右眼大小，是由于三叉神经和动眼神经存在异常联系

-
- 105、有关溃疡性睑缘炎，睫毛易脱落且不能再生
- 106、双行睫与乱睫的区别是双行睫生长的位置在灰线后、睑板腺开口处，乱睫的位置在灰线前
- 107、占我国眼睑恶性肿瘤第二位的是皮脂腺癌
- 108、引起睑腺炎最主要的细菌是金黄色葡萄球菌
- 109、婴幼儿时期最常见的眼睑血管瘤是毛细血管瘤
- 110、好发于睑缘皮肤黏膜移行处的是鳞状细胞癌
- 111、眼睑最常见的良性肿瘤病变是乳头状瘤
- 112、最常见的泪小管良性肿瘤是乳头状瘤
- 113、患者女，53岁，诉左眼溢泪2个月。查体：左眼视力正常，左侧泪道冲洗时有阻力，冲洗液部分返流，部分流入鼻腔，余未见异常。可考虑是鼻泪管狭窄
- 114、在泪腺原发性上皮瘤中，多形性腺瘤占50%
- 115、慢性泪囊炎常见于中老年妇女，是因为女性鼻泪管较细长
- 116、泪囊鼻腔吻合术使泪液流入中鼻道
- 117、患者女，56岁，左眼溢泪2个月余。查体：左眼视力1.0，左侧泪道冲洗时有阻力，冲洗液全部由另一泪点反流，伴黏性分泌物流出，余未见异常。考虑诊断为鼻泪管阻塞伴慢性泪囊炎
- 118、急性泪囊炎不会形成泪囊黏液囊肿
- 119、泪腺肿物压迫眼球移位的方向是向鼻下方移位
- 120、鳄鱼泪多见于Bell's麻痹面神经不全修复
- 121、判断泪道阻塞最常用的诊断方法是泪道冲洗
- 122、泪囊窝主要由2块骨共同组成

123、泪囊鼻腔吻合术前行泪囊碘油造影检查的目的是明确泪囊形态大小，排除手术禁忌证

124、急性泪囊炎的炎症期禁忌行泪道冲洗或泪道探通，以免导致感染扩散

125、上皮细胞不分泌泪液

126、泪囊不参与基础泪液分泌

127、患者男，22岁，诉双眼异物感、干涩1年，3个月前曾于外院做过右眼睑板腺囊肿刮除术。眼部检查：睑缘后唇出现自后向前的血管扩张，睑板腺开口阻塞突起变形，挤压睑板腺可见分泌物溢出，初步的诊断是干眼症

128、大泡性角膜病变与角膜缘干细胞衰竭无关

129、角、结膜重建的基础是泪膜的正常

130、大泡性角膜病变不会引起角膜缘干细胞缺乏

131、可引起干眼症发病的危险因素是：①基于免疫的眼表炎症反应、②泪腺细胞凋亡、③睑板腺功能障碍、④性激素水平的降低

132、患者女，65岁，诉双眼干涩、眼红3年，伴进食吞咽困难及关节痛等全身症状，首先需考虑的诊断为 Sjögren 综合征

133、患者，男，24岁，双眼异物感伴畏光1年余，眼科检查：结膜轻度充血，角膜透明，荧光素染色(-)，睑板腺开口堵塞，挤压后无分泌物溢出。该患者最可能的诊断是睑板腺功能异常

134、成人包涵体结膜炎可引起结膜瘢痕，但无角膜瘢痕，极少引起虹膜睫状体炎

135、患儿男，7岁，双眼异物感伴黏脓性分泌物增多4天，起病前有体温升高、身体不适等全身症状，体征为结膜充血、水肿、小片状球结膜下出血，穹隆部见黏液脓性分泌物，抗生素治疗有效。该患者首先考虑的诊断是流感嗜血杆菌性结膜炎

136、白喉杆菌性结膜炎不易形成假膜

137、患者，男性，5岁。右眼红3天就诊。检查：右眼颞下方球结膜充血，相应部位的角膜缘处可见2个实性疱疹，角膜透明，诊断为**泡性结膜炎**

138、角结膜上皮原位癌的最佳治疗方案是**手术切除联合板层角膜移植**

139、患者男，35岁，颞侧近外眦部球结膜下，见黄色、质软的光滑肿块，活检见疏松结缔组织和脂肪组织，最可能的诊断是**结膜皮样脂肪瘤**

140、**泡性结膜炎**属于细胞免疫介导的迟发型过敏性结膜炎