

2022 年《中药学专业知识二》教材变化明细

第二十二章 内科常用中成药1.

双黄连合剂【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

风寒感冒禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。服药期间，忌服滋补性中药，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。

2. 黄连上清丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

脾胃虚寒者禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者、孕妇、老人、儿童、阴虚火旺者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

3. 六味地黄丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

对本品及所含成分过敏者禁用。体实、阳虚、感冒、脾虚、气滞、食少纳呆者慎用。服药期间忌食辛辣、油腻食物。

4. 复方丹参片【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。孕妇慎用。寒凝血瘀胸痹心痛者不宜使用，脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌烟酒、浓茶。治疗期间，如心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时送医院救治。个别人服药后胃脘不适，宜饭后服用。

5. 血府逐瘀口服液【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。脾胃虚弱者、气虚血瘀者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻食物。治疗期间，若心痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

6. 速效救心丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。气阴两虚、心肾阴虚之胸痹心痛者（删除“、有过敏史者”），以及伴中重度心力衰竭的心肌缺血者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟饮酒、喝浓茶。治疗期间，心绞痛持续发作宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。

7. 冠心苏合滴丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。阴虚血瘀之胸痹忌用。胃炎患者、胃弱患者、胃溃疡患者、食管炎患者及肾脏疾病患者慎用。阴虚火旺者慎用；有出血倾向、行经期妇女，使用抗凝、抗血小板治疗的患者慎用；哺乳期妇女慎用；过敏体质者慎用。其辛香走窜，易耗气伤阴，故不宜长期服用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟、饮酒、喝浓茶。治疗期间，若心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。

8. 麝香保心丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。哺乳期妇女慎用。脾胃虚弱者慎用。不宜与洋地黄类药物同用。若心绞痛持续发作，服药后不能缓解时，应加用硝酸甘油等药物。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

9. 华佗再造丸【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁服。对本品及所含成分过敏者禁用。肝肾功能异常者慎用。中风痰热雍盛证，表现为面红目赤、大便秘结者不宜用。平素大便干燥者慎用。服药期间忌辛辣、生冷、油腻食物。

10. 癉闭舒胶囊【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。出血者、有肝肾功能损害者禁用。肺热壅盛、肝郁气滞、脾虚气陷的癉闭慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物，忌饮酒。有慢性肝脏疾病者慎用。

服用本品如出现尿黄及目黄、皮肤黄染或肝生化指标异常，应立即停药，并及时就医。长期用药应注意监测肝生化指标。

第二十五章 儿科常用中成药

1. 小儿热速清口服液【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

风寒感冒者禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。以及脾虚、大便稀薄者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣食物。病情较重或服用 24 小时后疗效不明显者，可酌情增加剂量。若高热持续不退者应去医院诊治。

2. 小儿咽扁颗粒【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

对本品及所含成分过敏者禁用。虚火乳蛾、喉痹者慎用。过敏体质者慎用。脾虚易腹泻者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物。服药期间症状加剧、高热不退、呼吸困难时，应及时到医院诊治。

第二十七章 耳鼻喉、口腔科常用中成药

鼻炎康片【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

对本品及所含成分过敏者禁用。过敏性鼻炎属虚寒症者慎用。肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。运动员慎用。服药期间，戒烟酒，忌辛辣食物。所含苍耳子有小毒，故不宜过量或持久服用。又含马来酸氯苯那敏，易引起嗜睡，服药期间不得驾驶车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器等；又因其对 H1 受体阻断作用，故膀胱颈梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、高血压和前列腺肥大者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用。

第二十八章 骨伤科常用中成药

舒筋活血片【注意事项】（2022 增，红色字体为新增）

孕妇忌服。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。妇女月经期慎服。因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量服用或持久服用，禁与含强心苷类的西药同用。