

1. (A1 型题) 新生儿食管狭窄部位共有
- A. 1 个
  - B. 2 个
  - C. 3 个
  - D. 4 个
  - E. 5 个

1. 答案: C

解析: 食管共有三处狭窄: 第一处位于食道的起端; 第二个处在食道入口以下 7cm 处; 第三处是食道通过膈肌的裂孔处。

2. (A1 型题) 人体食管的长度约为
- A. 25cm
  - B. 28cm
  - C. 30cm
  - D. 45cm
  - E. 50cm

2. 答案: A

解析: 食管是连接咽和胃的通道, 全长约 25cm。食管的功能是把食物和唾液等运送到胃内。

3. (A1 型题) (2014~专业实务) 肝脏组织基本的功能单位是
- A. 肝细胞
  - B. 肝小叶
  - C. 肝窦
  - D. 肝段
  - E. 门脉系统

3. 答案: B

解析: 肝是人体最大的腺体器官, 基本的结构和功能单位是肝小叶。

4. (A1 型题) 临床上区分直肠和肛管的解剖标志是
- A. 肛瓣
  - B. 齿状线
  - C. 直肠柱
  - D. 肛柱
  - E. 肛乳头

4. 答案: B

解析: 直肠与肛管交界处由肛瓣边缘与肛柱下端共同形成一条锯齿形的环行线, 称齿状线。故临床上区分直肠和肛管的解剖标志是齿状线。

5. (A1 型题) 溃疡性口腔炎清洗时宜选用的漱口液是
- A. 3%过氧化氢溶液
  - B. 金霉素鱼肝油
  - C. 2%碳酸氢钠溶液
  - D. 蒸馏水
  - E. 2%利多卡因溶液

5. 答案: A

解析: 溃疡性口腔炎用 3%过氧化氢溶液或 0.1%利凡诺溶液清洗溃疡面, 鹅口疮患者用 2%碳酸氢钠溶液清洁口腔。疱疹性口腔炎局部处理局部可涂疱疹净抑制病毒,

亦可喷西瓜霜、锡类散等中药；疼痛重者进食前在局部涂 2%利多卡因。为预防继发感染可涂 2.5%~5%金霉素鱼肝油。故正确答案为 A。

6. (A1 型题) 鹅口疮的临床表现是

- A. 口腔黏膜弥漫性充血
- B. 溃疡表面有黄白色渗出物
- C. 有发热等全身中毒症状
- D. 因疼痛出现拒乳和流涎
- E. 口腔黏膜有乳凝块样物

6. 答案: E

解析: 溃疡性口炎开始时口腔黏膜充血水肿。疱疹性口炎起病时发热, 体温达 38℃~40℃, 浅表溃疡面覆盖黄白色纤维素性分泌物。局部疼痛、流涎、拒食、烦躁, 鹅口疮是在口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物。故正确答案为 E。

7. (A1 型题) 患儿, 6 个月。患鹅口疮 5 天, 其首要的护理诊断/问题是

- A. 疼痛, 与口腔黏膜炎症有关
- B. 营养失调, 与拒食有关
- C. 体温过高, 与感染有关
- D. 口腔黏膜改变, 与感染有关
- E. 皮肤完整性受损, 与感染有关

7. 答案: D

解析: 鹅口疮为白色念珠菌感染所致, 特征是口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物, 略高于黏膜表面, 粗糙无光, 起初呈点状和小片状, 可逐渐融合成片, 形似乳凝块, 不易拭去。因此护理首要问题为口腔黏膜改变, 与感染有关。故选 D。

8. (A1 型题) 患儿, 1 岁半。因拒食、啼哭就诊, 查体: 颊黏膜、牙龈、舌面处出现成簇小水疱, 部分破溃成溃疡, 下颌下淋巴结肿大, 咽充血, 诊断为疱疹性口腔炎, 护士健康指导不正确的是

- A. 勤喂水
- B. 其病原体为白假丝酵母菌 (白念珠菌)
- C. 饮食以微凉流质或半流质为宜
- D. 养成良好的卫生习惯
- E. 注意隔离

8. 答案: B

解析: 小儿鹅口疮的病原是白色念珠菌, 疱疹性口炎的病原是单纯疱疹病毒 I 型, 溃疡性口炎致病菌为链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌。故 B 不正确

解析: 9. (A1 型题) 患儿女, 出生后 20 天。因发热应用抗生素治疗 10 余天, 查体时护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物, 不易擦掉。应考虑为

- A. 疱疹性口腔炎
- B. 溃疡性口腔炎
- C. 单纯性口腔炎
- D. 鹅口疮
- E. 口角炎

9. 答案: D

解析: 鹅口疮的临床表现口腔黏膜表面白色乳凝块样小点或小片状物; 不痛、不流涎, 不影响吃奶; 颊黏膜最常见。疱疹性口炎表现为发热, 口腔黏膜小疱疹,

破溃后有黄白色纤维素性分泌物覆盖；疱疹常见于齿龈、口唇、舌。疼痛，拒食、流涎，常有颌下淋巴结肿大。溃疡性口炎表现为口腔黏膜充血水肿，形成糜烂或溃疡，上有灰白色假膜；疼痛、流涎、拒食，有发热，局部淋巴结肿大。根据患儿表现，应考虑为鹅口疮。

10. (A1 型题) (2015~实践能力) 患儿女，1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

10. 答案：B

解析：涂药后嘱患儿闭口 10 分钟后取出纱布或棉球（2015），并嘱患儿不可立即漱口、饮水或进食。

11. (A1 型题) 下列慢性胃炎保健指导中，不妥的是

- A. 养成细嚼慢咽的进食习惯
- B. 戒烟忌酒
- C. 腹痛时口服阿司匹林
- D. 上腹饱胀、反酸时口服多潘立酮（吗丁啉）
- E. 避免使用泼尼松及利血平

11. 答案：C

解析：慢性胃炎患者指导病人加强饮食卫生和饮食营养，养成有规律的饮食习惯；避免过冷、过热、辛辣等刺激性食物及浓茶、咖啡等饮料；养成细嚼慢咽的进食习惯嗜酒者应戒酒，防止乙醇损伤胃黏膜；注意饮食卫生。避免使用对胃黏膜有刺激的药物，最常引起胃黏膜炎症的药物是非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等，其机制可能是通过抑制胃黏膜生理性前列腺素的合成，削弱其对胃黏膜的保护作用。故答案为 C。

12. (A1 型题) 慢性胃炎临床表现一般不包括

- A. 食欲不振
- B. 餐后腹胀
- C. 恶心呕吐
- D. 反酸暖气
- E. 规律性上腹痛

12. 答案：E

解析：慢性胃炎无规律性上腹痛。慢性胃炎病程迁延，进展缓慢，缺乏特异性症状。大多无明显症状，部分表现为反复或持续性上腹不适、饱胀、钝、烧灼痛，无明显节律性，一般进食后较重，其次为食欲下降、暖气、反酸、恶心等消化不良症状。这些症状用抗酸剂及解痉剂不能缓解。有部分患者无临床症状。所以，慢性胃炎的疼痛不具规律性，故选 E。

13. (A2 型题) 慢性胃炎患者应避免口服

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 泼尼松
- D. 多潘立酮（吗丁啉）

E. 甲氧氯普胺（胃复安）

13. 答案：C

解析：链霉素、庆大霉素损害听力。多潘立酮是胃肠动力药加速胃排空。甲氧氯普胺可止吐，主要副反应为镇静作用，可有倦怠、嗜睡、头晕等。其他有便秘、腹泻、皮疹及溢乳、男子乳房发育等。泼尼松长期大量服用引起柯兴氏征，诱发神经精神症状以及消化系统溃疡、骨质疏松、生长发育受抑制、并发和加重感染，故答案为C。

14. (A1 型题) 慢性胃炎用多潘立酮最佳时间是

- A. 晨起时
- B. 饭前
- C. 饭后
- D. 饭中
- E. 睡前

14. 答案：B

解析：对胃黏膜有刺激的药物或助消化药宜在饭后服用。促进睡眠的如安定等在睡前服用，利尿药物宜晨起服用。胃肠动力药如多潘立酮，加速胃排空，应在饭前服。故正确答案为B。

15. (A1 型题) 自身免疫性胃炎的病变部位多见于

- A. 胃窦部
- B. 胃体部
- C. 胃底部
- D. 胃大弯
- E. 胃小弯

15. 答案：B

解析：自身免疫所致胃炎以富含壁细胞的胃体黏膜萎缩为主。

16. (A1 型题) 血清中抗内因子抗体阳性提示

- A. 胃泌素瘤
- B. 浅表性胃炎
- C. 多灶性萎缩性胃炎
- D. 自身免疫性胃炎
- E. 消化性溃疡

16. 答案：D

解析：自身免疫性胃炎时，抗壁细胞抗体和抗内因子抗体可呈阳性，血清促胃液素水平明显升高。多灶萎缩性胃炎时，血清促胃液素水平正常或偏低。

17. (A1 型题) 确诊慢性胃炎最可靠的依据是

- A. 胃液分析
- B. 消化道症状
- C. 胃脱落细胞检查
- D. 纤维胃镜检查
- E. 胃肠钡餐 X 线检查

17. 答案：D

解析：胃镜及胃黏膜活组织检查是最可靠的诊断方法。通过胃镜在直视下观察黏膜病损。慢性浅表性胃炎可见红斑（点、片状或条状）、黏膜粗糙不平、出血点

/斑；慢性萎缩性胃炎可见黏膜呈颗粒状、黏膜血管显露、色泽灰暗、皱襞细小。故正确答案为D。X线钡餐检查对消化性溃疡诊断有确诊价值。

18. (A2型题) 患者男, 38岁。因上腹部胀痛、饭后暖气及反酸明显来诊。胃镜报告示慢性胃炎。下列食物适合患者食用的有

- A. 浓茶
- B. 咖啡
- C. 纯牛奶
- D. 面条
- E. 油条

18. 答案: D

解析: 慢性胃炎患者给予高热量、高维生素、及易消化的饮食。故排除A、B、E答案, 纯牛奶中的钙质可使刺激胃酸分泌, 不宜多饮, 故排除C答案。故选D。

19. (A2型题) 患者, 女, 34岁, 反复中上腹饱胀不适6年, 无黑便和贫血。胃镜检查提示慢性胃窦胃炎伴糜烂。询问护士为明确诊断还需做哪项检查, 正确的是

- A. 大便潜血试验
- B. 幽门螺杆菌检查
- C. 胃液检查
- D. 内因子抗体检查
- E. 壁细胞抗体检查

19. 答案: B

解析: 幽门螺杆菌感染是慢性胃炎主要的病因。胃镜提示慢性胃窦胃炎伴糜烂, 再进行幽门螺杆菌检查可确定致病菌。

20. (A1型题) 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 十二指肠球部
- B. 十二指肠降部
- C. 十二指肠乳头处
- D. 十二指肠水平部
- E. 十二指肠升部

20. 答案: A

解析: 十二指肠溃疡是消化道的常见病, 一般认为是由于大脑皮质接受外界的不良刺激后, 导致胃和十二指肠壁血管和肌肉发生痉挛, 使胃肠壁细胞营养发生障碍和胃肠粘膜的抵抗力降低, 致使胃肠粘膜易受胃液消化而形成溃疡。典型的十二指肠溃疡发生在十二指肠球部(A正确), 十二指肠溃疡一般不发生恶变。十二指肠溃疡发生在球部远端是很少见的, 因此B、C、D、E均不正确。

21. (A1型题) 以下哪项是胃溃疡的特点

- A. 发病年龄多见于老年人
- B. 好发于胃大弯
- C. 上腹压痛点常在上腹偏右
- D. 疼痛多在饭后3~4小时发生
- E. X线钡餐检查龛影

21. 答案: E

解析: 胃溃疡多见于中老年人, A不正确。胃溃疡多发于胃小弯和胃角, B不正确。胃溃疡压痛点多位于中上腹偏高处, 或剑突下和剑突下偏左处, C不正确。

疼痛多在餐后 1 小时内发生，经 1~2 小时后缓解，D 不正确。X 线钡餐检查龛影是胃溃疡的特点，故选 E。

22. (A2 型题) 消化性溃疡患者服用制酸剂宜在

- A. 饭前 1~2 小时
- B. 饭后 1~2 小时
- C. 两餐之间
- D. 每日清晨一次
- E. 进餐时与食物同服

22. 答案: B

解析: 制酸剂如氢氧化铝凝胶等, 应在饭后 1h 和睡前服用。服用片剂时应嚼服故正确答案为 B。药物应在餐中或餐后即刻服用 H<sub>2</sub>受体拮抗剂。硫糖铝片宜在进餐前 1h 服用。

23. (A1 型题) 以下因素中对消化性溃疡起决定性作用的是

- A. 胃酸、胃蛋白酶增高
- B. 吸烟
- C. 饮食不当
- D. O 型血型者
- E. 全身性疾病

23. 答案: A

解析: 溃疡的形成是胃壁或十二指肠壁组织被胃酸和胃蛋白酶消化的结果。这种自我消化过程是溃疡形成的直接原因。故选 A。

24. (A1 型题) 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

24. 答案: C

解析: 现已公认幽门螺杆菌感染为消化性溃疡的一个重要发病原因。Hp 感染破坏了胃的粘膜屏障, 使氢离子和胃蛋白酶渗入粘膜, 发生自身消化作用, 形成溃疡。因此, 本题的正确答案是 C。

25. (A1 型题) 毕 II 式胃大部切除术, 与残胃吻合的器官是

- A. 空肠近端
- B. 空肠远端
- C. 十二指肠
- D. 回肠远端
- E. 结肠远端

25. 答案: A

解析: 胃空肠吻合术有两种: 其一是毕 II 式胃大部切除术, 即切除远端胃后缝闭十二指肠残端, 残胃和空肠上段吻合。故本题选 A。

26. (A1 型题) 关于消化性溃疡的发病因素, 应除外

- A. 胃酸和胃蛋白酶
- B. 非甾体类消炎药
- C. 遗传因素

- D. 持久或过度精神紧张
- E. 前列腺素

26. 答案: E

解析: 消化性溃疡的发病因素: ①幽门螺杆菌感染: 主要病因; ②非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等; ③胃酸和胃蛋白酶: 胃酸在其中起决定性作用, 是溃疡形成的直接原因; ④其他因素: 吸烟、遗传、胃十二指肠运动异常、应激如长期精神紧张、焦虑或情绪容易波动。故本题选 E。

27. (A1 型题) 消化性溃疡最主要的发病因素是

- A. 十二指肠肠壁薄弱
- B. 习惯性便秘
- C. 先天畸形
- D. 黏膜萎缩
- E. 幽门螺杆菌感染

27. 答案: E

解析: 消化性溃疡最主要的发病因素是幽门螺杆菌感染。因此在治疗中要抑制其感染。故本题选 E。

28. (A1 型题) 胃、十二指肠溃疡急性大出血的主要表现是

- A. 剧烈上腹痛
- B. 上腹部反跳痛
- C. 大量呕血或黑便
- D. 肠鸣音活跃
- E. 血细胞比容下降

28. 答案: C

解析: 胃十二指肠溃疡大出血时, 可表现为大量呕血与黑粪, 并有周围循环衰竭表现。故本题选 C。

29. (A2 型题) 消化道手术后, 提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A. 听诊有肠鸣音
- B. 肛门排气
- C. 患者有饥饿感
- D. 患者有便意
- E. 胃管的引流量较前减少

29. 答案: B

解析: 在伴有消化道的手术时, 肛门排气及肠鸣音正常时提示肠蠕动恢复。可以开始进食水和流质食物。故本题选 B。

30. (A1 型题) 消化性溃疡特征性的临床表现是

- A. 黄疸
- B. 食欲下降
- C. 食欲下降
- D. 反酸、嗝气
- E. 节律性和周期性上腹痛

30. 答案: E

解析: 消化性溃疡以慢性病程、周期性发作、节律性上腹痛为特点。故本题选 E。

31. (A2 型题) 消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失, 常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

31. 答案: D

解析: ABCE 均加重疼痛, 如果疼痛失去了上述规律性, 变为不定时发作, 或成为持续性隐痛, 或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变, 则应警惕为癌变的先兆。故本题选 D。

32. (A1 型题) 关于消化性溃疡用药的叙述, 不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕, 用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

32. 答案: E

解析: 氢氧化铝凝胶等应在餐后 1 小时或睡前服用, A 正确; 西咪替丁不良反应引起头晕皮疹, B 正确; 硫糖铝在酸性环境下起作用, 应在餐前 1 小时给药, C 正确; 奥美拉唑可引起头晕, 特别是用药初期, 因此初次服用应减少活动, D 正确。甲硝唑饭后半小时服用, 故本题选 E。

33. (A1 型题) 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

33. 答案: D

解析: 服用硫糖铝后, 抑制肠道运动增加水分吸收, 引起便秘, 故本题选 D。

34. (A2 型题) 执行慢性胃炎患者的医嘱时, 使用前应着重与医生进行沟通的药物是

- A. 消胆胺
- B. 山莨菪碱
- C. 雷尼替丁
- D. 强的松
- E. 多潘立酮

34. 答案: D

解析: 强的松片最主要的副作用是降低免疫力, 其次是对胃肠道有刺激, 容易造成上消化道出血、大剂量易引起糖尿病。故本题选 D。

35. (A1 型题) 下列不是外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证的是

- A. 并发急性穿孔
- B. 并发急性大出血
- C. 胃溃疡恶变
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 并发瘢痕性幽门梗阻



35. 答案：D

解析：外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证：①胃溃疡经过短期（4~6周）内科治疗无效或愈合后复发者，应在第二次复发前手术；②年龄已超过45岁的胃溃疡患者；③经X线或胃镜证实为较大溃疡（直径2.5cm以上）或高位溃疡；④不能排除或已证实有恶变者。⑤以往有一次急性穿孔或大出血病史者。所以选项D是错误的。

36. (A1型题) 消化性溃疡病在何种条件下疼痛节律会改变或消失

- A. 疲劳时
- B. 饮酒时
- C. 受凉时
- D. 焦虑时
- E. 癌变时

36. 答案：E

解析：消化性溃疡在癌变时疼痛节律会改变或消失，疼痛常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、饮酒、药物影响、气候变化等因素诱发或加重；因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。而溃疡疼痛节律性改变或消失可能是癌变的征兆，故选E。

37. (A2型题) 胃溃疡合并幽门梗阻患者的术前准备，下列哪项可减轻胃黏膜水肿

- A. 术前数日每晚用温等渗盐水洗胃
- B. 纠正脱水
- C. 纠正碱中毒
- D. 术前给予流质饮食
- E. 术前晚灌肠

37. 答案：A

解析：合并幽门梗阻病人的护理：非完全性梗阻者可进无渣半流质，输液、输血，纠正营养不良及低氯、低钾性碱中毒。持续性胃肠减压和温生理盐水洗胃有助于减轻胃组织水肿，利于术后愈合。故本题A是正确的。

38. (A2型题) 消化性溃疡患者，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。此时最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

38. 答案：A

解析：幽门梗阻使胃排空延迟，病人可感上腹饱胀不适，疼痛于餐后力重，且有反复大量呕吐，呕吐物为酸腐味的宿食，大量呕吐后疼痛可暂缓解。故正确答案为A。

39. (A2型题) 患者，男，34岁，饮酒后中上腹部闷痛不适，排柏油样大便1次。为进一步明确病情，宜选择哪项检查

- A. 血常规检查
- B. 大便常规和隐血试验
- C. 钡餐X线检查

- D. 急诊胃镜检查
- E. 插胃管，取胃液检查

39. 答案：D

解析：患者上腹不适，且排柏油样便，提示有上消化道出血。而胃镜检查是上消化道出血定位、定性诊断的首选检查方法。故本题选D。

40. (A2型题) 患者男，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑

- A. 氢氧化铝凝胶
- B. 口服补液盐
- C. 奥美拉唑
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 克拉霉素

40. 答案：B

解析：氢氧化铝是碱性药物，可中和胃酸，A正确；奥美拉唑是质子泵抑制剂，C正确；枸橼酸铋剂可保护黏膜，D正确，克拉霉素是抗生素，E正确；口服补液盐是世界卫生组织推荐的治疗急性腹泻脱水的药物，而幽门梗阻者应禁食，输血、输液、胃肠减压。故本题选B。

41. (A2型题) 患者男，36岁。胃溃疡5年，规律用药但依然反复发作。护士在收集资料时发现患者饮食极不规律，常暴饮暴食，每日饮酒量约500ml。在进行健康指导时应着重给患者讲解的是

- A. 药物的不良反应
- B. 胃溃疡的并发症
- C. 合理饮食的重要性
- D. 胃溃疡的发病机制
- E. 保持情绪稳定的重要性

41. 答案：C

解析：刺激性饮料，烈性酒除直接损伤黏膜外，还能促进胃酸过度分泌。对嗜烟酒者，劝其戒除，但应注意突然戒断烟酒可引起焦虑、烦躁，反过来也会刺激胃酸分泌，故应与病人共同制定切实可行的戒烟酒计划，并督促其执行。故本题选C。

42. (A2型题) 患者，男，35岁。十二指肠溃疡病史3年余，急性发作2天。今中午饱餐后突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。该患者最可能并发了

- A. 急性胃扩张
- B. 幽门梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性穿孔
- E. 大出血

42. 答案：D

解析：急性胃扩张主要引起反复呕吐，A错误；幽门梗阻引起胃痛渐加重，嗝气、反胃等，B错误；急性胰腺炎腹痛，恶心，呕吐，发热，血胰酶增高等，C错误；十二指肠溃疡易造成穿孔，突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。故本题选D。

43. (A2 型题) 患者男, 58 岁。行动不便。3 天来反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 伴反酸嗝气。电话咨询社区护士其应进行哪项检查, 社区护士的建议是

- A. 腹部平片
- B. B 超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

43. 答案: D

解析: 病人反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 考虑可能为胃溃疡, 确诊消化性溃疡的首选检查方法是胃镜。故本题选 D。

44. (A2 型题) 患者, 女, 47 岁, 因十二指肠溃疡发作急诊入院, 经治疗后症状好转出院, 对该患者进行出院健康教育, 下列哪项是错误的

- A. 养成良好的饮食习惯和卫生习惯
- B. 保持清洁、均衡饮食
- C. 腹痛发作应立即服止痛药缓解
- D. 定时服药
- E. 避免剧烈运动

44. 答案: C

解析: 腹痛发作未明确诊断前不应使用止痛药物, 可能会掩盖患者的真实病情。故本题选 C。

45. (A2 型题) 患者女, 50 岁, 确认为胃溃疡活动期, 其最可能的腹痛特点是

- A. 夜间腹痛明显
- B. 空腹时腹痛明显
- C. 餐后 1/2~1 小时腹痛明显
- D. 餐后即刻腹痛明显
- E. 进餐时腹痛明显

45. 答案: C

解析: 胃溃疡疼痛多于餐后半小时至 2 小时出现, 持续 1~2 小时, 在下次进餐前疼痛已消失, 即所谓“餐后痛”, 本题选 C。而十二指肠溃疡疼痛多于餐后 3~4 小时出现, 持续至下次进餐, 进食后疼痛可减轻或缓解, 故叫“空腹痛”, 有的也可在夜间出现疼痛, 又叫“夜间痛。”

46. (A2 型题) 患者男, 22 岁, 消化性溃疡患者, 给予胶体次枸橼酸铋+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便, 担心病情加重, 行粪便隐血试验, 报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋不良反应

46. 答案: E

解析: 选项 A、B 化验便隐血试验结果是阳性, 但本患者粪便隐血试验阴性, 排除 A、B; 而 C、D 是不会影响大便的颜色的, 选项 E 在服用期间会出现大便颜色呈灰褐色便, 一般停药后会恢复正常的, 故本题选 E。

47. (A2 型题) 患者女, 63 岁。胃穿孔修补术后, 为预防发生粘连性肠梗阻, 应指导患者

- A. 早期取半卧位
- B. 早期离床活动
- C. 早期进食
- D. 保持排便通畅
- E. 多饮水

47. 答案: B

解析: 肠道手术后鼓励患者早期下床活动, 促进肠蠕动恢复, 防止肠粘连, 也可预防下肢静脉血栓的形成。故本题选 B。

48. (A2 型题) 患者, 女性, 56 岁, 胃窦部多发溃疡, 今日患者在硬膜外麻醉下行胃大部切除术, 术后安返病房。病区护士在术后的 12 小时内, 应注意观察的并发症是

- A. 吻合口瘘
- B. 吻合口炎症
- C. 吻合口出血
- D. 近侧空肠段梗阻
- E. 十二指肠残端瘘

48. 答案: C

解析: 胃大部切除术的术后并发症包括吻合口出血、十二指肠残端破裂、吻合口破裂或吻合口瘘、胃排空障碍、术后梗阻、倾倒综合征等, 但 12 小时内会出现的并发症多是吻合口出血, 短期内从胃管不断引流出新鲜血液, 甚至出现呕血和黑便。故本题选 C。

49. (A2 型题) 患者, 女性, 47 岁, 胃十二指肠溃疡, 手术后第 7 天护士发现患者出现高热、寒战, 右上腹疼痛, 伴有呃逆, 该护士首先考虑患者并发了

- A. 膈下脓肿
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 吻合口瘘
- E. 切口感染

49. 答案: A

解析: 上述的术后并发症虽然都会出现高热、寒战等表现, 但伴有呃逆是膈下脓肿所特有的表现, 因此考虑并发膈下脓肿。故本题选 A。

50. (A2 型题) 患者, 男性, 42 岁, 十二指肠溃疡病 10 年。近 2 个月来, 上腹胀满不适, 伴反复呕吐酸臭味宿食。术前诊断最可靠的检查是

- A. X 线钡剂造影
- B. 血培养
- C. MRI
- D. 纤维胃镜
- E. 腹部 CT

50. 答案: D

解析: 胃镜检查是确诊消化性溃疡的首选检查方法。胃镜检查可直接观察溃疡部位、病变大小、性质。同时, 患者反复呕吐酸臭味宿食, 可能并发幽门梗阻, 胃镜检查可见胃内大量潴留的胃液和食物残渣。故本题选 D。

51. (A2 型题) 患者, 男性, 47 岁, 胃大部切除术后 4 天。观察发现: 患者体温 38.6℃, 切口红肿、疼痛。该患者最可能出现的情况是

- A. 切口裂开
- B. 切口感染
- C. 膈下脓肿
- D. 肺部感染
- E. 吻合口破裂

51. 答案: B

解析: 患者体温升高, 局部红肿、疼痛皆属于感染症状, 由于是在切口处发生红肿、疼痛, 考虑为切口感染。故本题选 B。

52. (A2 型题) 患者男, 患消化性溃疡 10 余年, 饮酒 30 分钟后出现剧烈上腹部疼痛。诊断为急性胃穿孔, 首要护理措施为

- A. 立即应用镇痛剂
- B. 立即输血
- C. 禁食和胃肠减压
- D. 安慰并陪伴病人
- E. 立即补液

52. 答案: C

解析: 消化道溃疡并发穿孔时, 应立即禁食并予以胃肠减压, 以减少对胃的刺激。急性穿孔是消化性溃疡最严重的并发症之一, 溃疡深达浆膜层时, 可突然穿透而发生急性穿孔, 以胃窦小弯及十二指肠球部前壁溃疡多见。故选 C。

53. (A2 型题) 患者, 女性, 37 岁, 胃大部切除术后第 3 天, 肠蠕动未恢复, 护士查体发现患者腹胀仍非常明显, 该护士给予患者最有效的护理措施是

- A. 增加床上活动
- B. 胃肠减压
- C. 腹部热敷
- D. 肛管排气
- E. 环行按摩腹部

53. 答案: B

解析: 术后患者肠蠕动尚未恢复, 出现腹胀, 首先进行胃肠减压, 将胃肠道内的气体和液体吸出, 可有效减轻腹胀、降低肠腔内压力。故本题选 B。

54. (A2 型题) 患者, 男性, 53 岁, 患有胃溃疡出血, 经治疗出血停止, 病情缓解, 粪便隐血试验阴性。如果患者再次发生呕血时, 护士应为其采取的体位是

- A. 平卧位, 头偏向一侧
- B. 头低足高位
- C. 截石位
- D. 平卧屈膝位
- E. 半坐卧位

54. 答案: A

解析: 发生呕血时, 应嘱患者平卧位, 头偏一侧, 防止窒息或误吸, 同时, 要清除气道内的异物, 保持呼吸道通畅。故本题选 A。

55. (A2 型题) 患者, 女性, 48 岁, 毕 II 式胃大部切除术后 36 小时, 突发右上腹剧烈疼痛伴腹膜刺激征。外科护士应首先考虑

- A. 术后胃出血

- B. 输入襻梗阻
- C. 低血糖综合征
- D. 碱性反流性胃炎
- E. 十二指肠残端破裂

55. 答案: E

解析: 十二指肠残端破裂多发生在术后 24~48 小时, 临床表现为突发性上腹部剧痛、发热和腹膜刺激征, 该患者的临床表现符合十二指肠残端破裂。故本题选 E。

56. (A2 型题) 患者, 女, 50 岁, 胃大部切除术后 2 周。进食 10~20 分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发了

- A. 吻合口炎症
- B. 吻合口梗阻
- C. 倾倒综合征
- D. 低钾血症
- E. 代谢性酸中毒

56. 答案: C

解析: 倾倒综合征是指在胃部手术后病人有时会在饭后 10~30 分钟出现上腹部胀痛, 恶心, 呕吐, 肠鸣, 有排便感, 腹泻, 病人可同时出现眩晕、头昏、大量出汗, 面色潮红或苍白, 极度软弱, 心动过速, 甚至血压下降。多出现于术后 1~3 周, 多在病人进食半流质饮食时出现, 特别是进食加糖的牛奶时更易出现, 症状多持续 1 小时, 然后自行缓解。与患者的症状符合, 所以选择 C。

57. (A2 型题) 患者, 男性, 34 岁, 因十二指肠溃疡行毕氏 II 式手术。术后 8 天进食, 进食后出现上腹部饱胀感, 后出现呕吐, 呕吐物为食物和胆汁。护士根据患者的情况, 考虑其出现了

- A. 幽门梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输入段梗阻
- D. 输出段梗阻
- E. 十二指肠溃疡复发

57. 答案: D

解析: 胃大部切除术后梗阻包括输入段梗阻、输出段梗阻和吻合口梗阻, 前两者常见于毕氏 II 式手术。输入段梗阻呕吐物不含胆汁; 吻合口梗阻呕吐物为食物, 不含胆汁; 输出段梗阻呕吐食物和胆汁。故本题选 D。

58. (A2 型题) 患者, 男性, 60 岁, 2 年前无明显诱因出现柏油样便, 伴头晕、乏力, 给予奥美拉唑治疗, 每次发作时伴有上腹胀痛, 多在餐后半小时发生, 近 3 个月来食欲较差, 体重下降, 上腹痛时轻时重, 疼痛逐渐加重, 不易缓解, 可考虑

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡伴出血
- C. 胃溃疡癌变
- D. 胰腺癌
- E. 胃穿孔

58. 答案: C

解析：上腹胀痛多在餐后半小时发生，可考虑为胃溃疡，现患者体重下降，食欲较差，且疼痛不已缓解，符合进展期胃癌的表现。故本题选 C。

59. (A2 型题) 患者男，35 岁。胃肠道术后第 1 天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 告知其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

59. 答案：C

解析：胃肠道术后尚未排气不可进食，但应告知患者其原因。排气是肠蠕动恢复的标志，排气之后可拔除胃管，饮少量水或米汤。肠蠕动未恢复前进食会加重病情。故本题选 C。

60. (A1 型题) 溃疡性结肠炎最常见的临床表现为

- A. 腹痛
- B. 腹泻
- C. 腹水
- D. 腹胀
- E. 发热

60. 答案：B

解析：溃疡性结肠炎起病缓慢，腹泻是最常见症状、便血是溃疡性结肠炎最初的主要症状之一。腹痛，轻型和缓解期患者可无此症状，慢性反复发作的患者常有腹痛。伴食欲不振与恶心呕吐，可有腹部体征。故本题答案为 B。

61. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的好发部位

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 乙状结肠
- E. 盲肠

61. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎病变呈连续非节段性分布，主要位于直肠和乙状结肠。故本题选 D。

62. (A1 型题) 溃疡性结肠炎病变常见的累及部位是

- A. 直肠和结肠
- B. 回盲部
- C. 盲肠
- D. 结肠
- E. 升结肠

62. 答案：A

解析：溃疡性结肠炎病变主要累及直肠和乙状结肠，可扩展至降结肠、横结肠，少数可累及全结肠。故本题选 A。

63. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的临床表现应除外

- A. 腹痛-便意-便后缓解
- B. 左下腹有压痛

- C. 易形成肠腔狭窄
- D. 易形成肠瘘
- E. 少数可癌变

63. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎腹痛位于左下腹或下腹，B 正确。有疼痛-便意-排便后缓解的规律；A 正确。病变一般仅局限于黏膜和黏膜下层，溃疡愈合形成瘢痕，结肠变形缩短、结肠袋消失，甚至结肠变窄；C 正确。少数病例可有结肠癌变，以恶性程度高的未分化型多见。E 正确。克罗恩病易形成肠瘘，故本题选 D。

64. (A2 型题) 患者，男，49 岁，溃疡性结肠炎病史 11 年余，近 1 周来腹痛加剧，每天排便 20 余次，呈血水样。下列饮食指导哪项正确

- A. 多喝牛奶
- B. 多吃新鲜水果
- C. 多吃含纤维素蔬菜
- D. 暂禁食
- E. 多喝果汁

64. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎急性发作期病人，应进流质或半流质饮食，病情严重者应禁食，按患者每天排便 20 余次，呈血水样，属重型溃疡性结肠炎，病情严重应暂禁食。故本题选 D。

65. (A2 型题) 患者，男，30 岁，黏液脓血便伴里急后重 2 年，诊断为溃疡性结肠炎。近 1 周腹痛加重伴发热入院治疗。护士遵医嘱为患者保留灌肠治疗，患者应采取的体位是

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位
- E. 半卧位

65. 答案：B

解析：因溃疡性结肠炎病变部位一般为直肠和乙状结肠，所以选择左侧卧位，更有利于疾病的治疗，灌肠治疗时全身不良反应较少。故本题选 B。

66. (A2 型题) 患者，女，40 岁，反复排黏液便 2 年，曾确诊溃疡性结肠炎，不规则治疗，症状间断出现。近 1 个月再发，日排便 2~3 次，入院时体温 36.5℃，脉搏 72 次/分，腹软，左下腹轻压痛。血沉 15mm/h，血红蛋白 98g/L。根据病程经过，本患者分型属于

- A. 初发型
- B. 慢性复发型
- C. 慢性持续型
- D. 急性暴发型
- E. 急性复发型

66. 答案：B

解析：慢性复发型症状较轻，临床上最多见，发作期与缓解期交替。患者反复排黏液便 2 年，不规则治疗，症状间断出现，近 1 月再发，排便 2~3 次，故判断为慢性复发型。故本题选 B。



67. (A2 型题) 患者女, 32 岁。患溃疡性结肠炎 3 年, 急性加重 2 周入院。入院后护士评估患者的粪便形态最可能发现的是

- A. 米泔水样便
- B. 柏油便
- C. 粘液脓血便
- D. 白陶土样便
- E. 黄色软便

67. 答案: C

解析: 粘液脓性或脓血便常见于溃疡性结肠炎的病人, 故 C 正确。米泔水样便常见于霍乱, 故 A 不正确。柏油便常见于各种原因导致的上消化道出血, 如消化性溃疡、肝硬化等, 故 B 不正确。白陶土样便常见于梗阻性黄疸的病人, 故 D 不正确。黄色软便是正常粪便, 故不选 E。

68. (A1 型题) 婴儿腹泻的病因, 下列哪项是错误的

- A. 肠道内感染
- B. 喂养不当
- C. 消化系统发育不成熟
- D. 血液中 IgG 偏低
- E. 肠道外感染

68. 答案: D

解析: 小儿腹泻的病因包括: ①婴幼儿消化系统发育尚未成熟, 不能适应食物量和量的较大变化, 容易发生消化道功能紊乱 (C 正确); ②生长发育快, 胃肠道负担重; ③机体防御功能差: a. 婴儿胃酸偏低, 胃排空较快, 对进入胃内的细菌杀灭能力较弱; b. 血清免疫球蛋白 (尤其是 IgM、IgA) 和胃肠道分泌型 IgA 均较低 (D 错误); ④肠道菌群失调: 新生儿生后尚未建立正常肠道菌群时, 改变饮食使肠道内环境改变时、或滥用广谱抗生素时, 均可使肠道正常菌群的平衡失调, 而患肠道感染 (A 正确); ⑤人工喂养不当 (B 正确)。故本题 A、B、C、E 均正确, 错误的是 D。

69. (A1 型题) 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是

- A. 空肠弯曲菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 埃可病毒
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

69. 答案: D

解析: 病毒感染。寒冷季节的婴幼儿腹泻 80% 由病毒感染引起。小儿病毒性肠炎的主要病原是引起秋季腹泻的轮状病毒, 其次有诺沃克病毒、腺病毒等。因此, 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是轮状病毒。

70. (A1 型题) 区别轻、重型婴儿腹泻的主要指标是

- A. 病程长短
- B. 热度高低
- C. 排便次数
- D. 呕吐次数
- E. 有无水、电解质紊乱

70. 答案: E

解析：重型腹泻多为肠道内感染所致。起病常比较急，也可由轻型逐渐加重而致。除有较重的胃肠道症状外，还有明显的脱水、电解质紊乱及全身中毒症状，如发热、烦躁、精神萎靡、嗜睡甚至昏迷、休克。故正确答案为 E。

71. (A1 型题) 下列哪项符合婴儿腹泻中度脱水的临床表现

- A. 昏睡或昏迷
- B. 眼窝凹陷
- C. 皮肤弹性极差
- D. 四肢厥冷，无尿
- E. 体重下降 10% 以上

71. 答案：B

解析：昏睡或昏迷、皮肤弹性极差、四肢厥冷，无尿、体重下降 10% 以上属于重度脱水的临床表现；符合婴儿腹泻中度脱水的是烦躁或萎靡、眼窝凹陷、皮肤弹性差、尿量少、体重下降 5%~10%。故本题选 B。

72. (A1 型题) 轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点不包括

- A. 多发生在秋、冬季
- B. 常伴上呼吸道感染症状
- C. 常伴腹痛、里急后重
- D. 全身感染中毒症状不明显
- E. 大便无腥臭味

72. 答案：C

解析：轮状病毒肠炎又称秋季腹泻，其临床特点是常伴有上呼吸道感染症状，全身中毒症状不明显，大便黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味。腹痛、里急后重不属于轮状病毒肠炎临床特点，故选 C。其余答案均属于轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点。

73. (A1 型题) 10 月龄患儿患病毒性肠炎入院，不宜进食的食物有

- A. 母乳
- B. 纯牛乳
- C. 发酵乳
- D. 去乳糖配方乳
- E. 豆制代乳品

73. 答案：B

解析：病毒性肠炎多继发双糖酶（主要为乳糖酶）缺乏不宜用蔗糖，应暂停乳类喂养，改为豆制代乳品、去乳糖配方奶或发酵奶喂养。故本题选 B。

74. (A1 型题) 护士为腹泻小儿采取的饮食疗法，不包括

- A. 脱水患儿需禁食 2 天
- B. 严重呕吐者暂禁食 4~6 小时，不禁水
- C. 停喂不消化和脂肪类食物
- D. 人工喂养者可喂米汤、酸奶等
- E. 病毒性肠炎者以豆制代乳品，可减轻腹泻

74. 答案：A

解析：小儿腹泻应控制腹泻次数，预防继续失水；调整饮食、继续进食是必要的治疗与护理措施。不需要禁食，故本题选 A。

75. (A1 型题) 小儿腹泻伴严重脱水的主要表现是

- A. 发热

- B. 水样便
- C. 频繁呕吐
- D. 大便次数明显增多
- E. 有水、电解质紊乱

75. 答案: E

解析: 小儿腹泻典型表现为大便次数增多, 大便性状改变, 但伴严重脱水, 水电解质紊乱是其主要表现, 故本题选 E。

76. (A1 型题) 疝修补术后病人护理错误的是

- A. 及时处理粪便秘结
- B. 切口部位压沙袋
- C. 咳嗽时注意保护切口
- D. 术后 3 个月内避免重体力劳动
- E. 鼓励病人早期下床活动

76. 答案: E

解析: 疝修补术后病人护理: 体位与活动: 平卧 3 日, 膝下垫一软枕, 使髋关节微屈, 减少腹壁张力。一般于术后 3~5 天可考虑离床活动。防止剧烈咳嗽: 术后剧烈咳嗽可引起腹内压升高, 不利于愈合。因此术后需注意保暖, 防止受凉而引起咳嗽; 指导病人在咳嗽时用手掌按压、保护切口, 以免缝线撕脱造成手术失败。保持排便通畅: 给予便秘者通便药物, 嘱病人避免用力排便。积极处理尿潴留。病人出院后逐渐增加活动量, 3 个月内应避免重体力劳动或提举重物。故答案为 E。

77. (A1 型题) 对于小儿脱水补液的正确方法应除外

- A. 轻、中度脱水可口服补液
- B. 中、重度脱水应选静脉补液
- C. 重度伴休克者先扩容
- D. 补充累积丢失量, 滴速为  $5\text{ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$
- E. 继续损失量和生理需要量在 12~16 小时滴完

77. 答案: D

解析: 补充累积丢失量补液的速度取决于脱水的程度, 原则上先快后慢。累计损失量应在 8~12 小时内补足, 滴速约为每小时  $8\sim 10\text{ml}/\text{kg}$ 。故本题选 D。

78. (A1 型题) 小儿补钾时每日补钾总量静脉滴注时间不应短于

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时
- E. 12 小时

78. 答案: C

解析: 重症患儿需静脉补钾, 每日剂量  $4\sim 6\text{mmol}/\text{kg}$ , 浓度  $\leq 40\text{mmol}/\text{L}$ , 静脉补钾时间不少于 8 小时, 见尿补钾。故本题选 C。

79. (A1 型题) 小儿低渗性脱水多见于

- A. 饮水不足
- B. 腹泻伴高热
- C. 腹泻时口服大量盐水
- D. 输入电解质溶液过多

E. 营养不良伴长期腹泻者

79. 答案: E

解析: 低渗性脱水, 电解质的丢失大于水的丢失, 血浆渗透压低于正常, 营养不良伴慢性腹泻、腹泻时补充非电解质溶液过多等情况时容易发生。故本题选 E。

80. (A1 型题) 属于 1/2 张的液体是

- A. 1: 1 溶液
- B. 1: 2 溶液
- C. 1: 2: 3 溶液
- D. ORS 溶液
- E. 9%氯化钠溶液

80. 答案: A

解析: 1 份生理盐水和 1 份 5%~10%的葡萄糖混合液的张力为 1/2, 应用于轻中度的等渗性脱水。故本题选 A。

81. (A1 型题) 小儿高渗性脱水发生惊厥的原因是

- A. 休克
- B. 脑水肿
- C. 循环衰竭
- D. 细胞内脱水
- E. 细胞外脱水

81. 答案: D

解析: 高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失, 血浆渗透压高于正常, 细胞外液渗透压高, 水从细胞内进入细胞外, 细胞内缺水, 表现为剧烈口渴、高热、烦躁不安、肌张力增高, 甚至发生惊厥。故本题选 D。

82. (A1 型题) 下列哪项不是生理性腹泻的临床特点

- A. 多见于出生 6 个月以内婴儿
- B. 大便次数增多
- C. 添加辅食后大便多逐渐转为正常
- D. 生长发育低于正常
- E. 小儿虚胖, 常伴湿疹

82. 答案: D

解析: 生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿, 外观虚胖, 常伴湿疹, 生后不久即出现腹泻。一般无其他症状, 食欲好, 生长发育正常, 添加辅食后, 大便即逐渐转为正常。不符合生理性腹泻的是生长发育低于正常, 故本题选 D。

83. (A1 型题) 以下哪项不是小儿低血钾的临床表现

- A. 腹胀
- B. 全身乏力
- C. 心率减慢
- D. 心音低钝
- E. 肠鸣音减弱

83. 答案: C

解析: 低血钾表现: 精神萎靡、全身无力、腱反射减弱或消失、腹胀、肠鸣音减弱或消失、心肌收缩无力、心音低钝、血压降低、肾脏损害。故本题选 C。

84. (A1 型题) 高渗性脱水血清钠的浓度为

- A. 90mmol/L

- B. 100mmol/L
- C. 110mmol/L
- D. 120mmol/L
- E. 150mmol/L

84. 答案：E

解析：高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失，血清钠的浓度 150mmol/L，血浆渗透液高于正常。故本题选 E。

85. (A1 型题) 对于腹泻并伴脱水的患儿，首选的检查项目是

- A. B 超
- B. 血常规
- C. 心电图
- D. 血电解质
- E. 胸部 X 线检查

85. 答案：D

解析：小儿腹泻并伴脱水，应重点查血电解质，进行血液生化检查，血钠测定可提示脱水的性质，血钾测定可反应体内缺钾的程度，碳酸氢盐测定可了解酸碱失衡性质和程度。故首选的检查项目为血电解质。故本题选 D。

86. (A1 型题) 护理腹泻患儿时，哪项措施不正确

- A. 详细记录出入量
- B. 加强臀部护理
- C. 腹胀时应注意有无低钾血症
- D. 急性腹泻早期应使用止泻剂
- E. 呕吐频繁者应禁食、补液

86. 答案：D

解析：腹泻患儿由于腹泻、呕吐和摄入不足导致体液不足，因详细记录出入量，呕吐频繁者禁食，进行补液。低血钾可引起胃肠道蠕动缓慢，出现腹胀。腹泻患儿应加强臀部皮肤的护理。约 70% 的患儿表现为病毒及非侵袭性细菌所致的水样便腹泻，一般不用抗生素，应合理使用液体疗法，选用微生态制剂和粘膜保护剂；另外约占 30% 的患儿为侵袭性细菌感染所致的粘液、脓血便患者，应根据临床特点，结合大便细菌培养和药敏试验结果选用针对病原菌的抗生素，并随时进行调整。避免用止泻剂。故答案为 D。

87. (A1 型题) 腹泻患儿“有皮肤完整性受损的危险”，其下列护理哪项不妥

- A. 会阴褶皱处不能经常清洗
- B. 便后用温水清洗臀部并拭干
- C. 选用柔软、清洁的尿布
- D. 更换尿布时动作轻柔
- E. 避免使用塑料布包裹

87. 答案：A

解析：腹泻患儿排便次数明显增多，会阴部污染也明显加重，腹泻时排出的粪便对皮肤刺激较大，若皮肤完整性受损则更易导致微生物进人体内引发感染危险。因此，要经常清洗会阴褶皱处。故本题 A 错误，其余选项均为正确的护理原则，本题选 A。

88. (A1 型题) 重型腹泻患儿呕吐频繁时，禁食的时间一般为

- A. 6 小时

- B. 8 小时
- C. 10 小时
- D. 12 小时
- E. 14 小时

88. 答案: B

解析: 限制饮食过严或禁食过久常造成营养不良, 并发酸中毒, 造成病情迁延不愈而影响生长发育, 故脱水患儿除严重呕吐者暂禁食 8 小时(不禁水)外均应继续进食。因此禁食时间为 8 小时, 本题应选 B。

89. (A1 型题) 需配置 1:1 液 200ml, 其配制方法为 5%葡萄糖液 100ml 中应加入生理盐水多少毫升

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 250ml

89. 答案: B

解析: 1:1 含钠液的配置方法是一份 5%或 10%葡萄糖中加入一份 0.9%氯化钠, 因此 200ml 的 1:1 液 200ml 应在 100ml 5%葡萄糖液中应加入生理盐水 100ml。故本题正确答案为 B。

90. (A1 型题) 患儿, 女, 15 个月, 发热、腹泻 1 天, 尿少半天, 院外补液治疗, 护士对患儿家长的用药指导正确的是服用

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 葡萄糖溶液
- D. 口服补液盐
- E. 2:1 等张含钠液

90. 答案: D

解析: 口服补液盐是 WHO 推荐用以治疗急性腹泻合并脱水的口服液, 适用于轻、中度脱水的患儿。由本题知, 患儿腹泻 1 天, 尿少, 患儿属于轻、中度腹泻, 故本题选 D。

91. (A1 型题) 某 9 个月男婴, 腹泻 2 天, 大便每日 15~16 次, 蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括

- A. 精神状态
- B. 尿量
- C. 肠鸣音
- D. 皮肤弹性
- E. 前囟

91. 答案: C

解析: 脱水程度一般从神志, 眼窝及前囟, 皮肤弹性, 尿量, 口腔黏膜, 休克症状, 失水量占体重比例等几个方面进行评估, 不包括肠鸣音。故本题选 C。

92. (A1 型题) 患儿女, 3 个月, 轻型腹泻, 家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的

- A. 体温
- B. 呼吸

- C. 尿量
- D. 肛周皮肤
- E. 每日大便次数

92. 答案: D

解析: 患儿轻型腹泻, 应指导家长保持患儿臀部的清洁干燥, 勤换尿布, 每次便后用温水清洗臀部及会阴部并吸干; 评估患儿的皮肤情况, 观察皮肤的颜色及表皮有无破损。故本题选 D。

93. (A1 型题) 患儿女, 3 岁。半年来“感冒”反复发作, 家长多次自行给予“阿司匹林”、“头孢拉定”、“阿莫西林”、“罗红霉素”等药物治疗。5 天前患金黄色葡萄球菌肠炎入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调

- A. 合理喂养
- B. 注意饮食卫生
- C. 多进行户外活动
- D. 注意儿童个人卫生
- E. 滥用抗生素的严重后果

93. 答案: E

解析: 滥用抗生素在杀死有害细菌的同时, 也会杀死人体内的有益菌群, 最终导致菌群失调、二重感染或者真菌感染, 患者出现腹泻。故选 E。

94. (A1 型题) 患儿, 男, 7 个月, 诊断“婴儿腹泻”, 在脱水酸中毒纠正后, 出现手足抽搐, 遵医嘱首选下列哪种药物治疗

- A. 生理盐水
- B. 地塞米松
- C. 10%氯化钾
- D. 静脉给地西洋
- E. 10%葡萄糖酸钙

94. 答案: E

解析: 患儿在纠正脱水酸中毒的同时应注意补钾、补钙。在脱水、酸中毒时, 由于血液浓缩和钙离子增加, 可不出现低钙表现; 在脱水、酸中毒纠正后, 离子钙减少, 出现低钙症状, 表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

95. (A1 型题) 患儿, 女, 4 个月。出生后不久开始腹泻, 大便每天 5~6 次, 神志清楚, 营养中等, 面部见湿疹, 大便常规正常。患儿最可能发生了

- A. 婴儿腹泻
- B. 迁延性肠炎
- C. 病毒性肠炎
- D. 生理性腹泻
- E. 真菌性肠炎

95. 答案: D

解析: 生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿, 患儿外观虚胖, 常伴湿疹, 出生后不久开始腹泻, 食欲好, 生长发育正常。本题患儿表现符合生理性腹泻的表现, 故本题选 D。

96. (A1 型题) 患儿, 1 岁, 因小儿腹泻, 中度脱水入院。经 2 日的补液治疗后脱水得到纠正, 今日突然出现惊厥, 护士首先应考虑的原因是

- A. 脑炎
- B. 低血糖

- C. 低钠血症
- D. 维生素 D 缺乏
- E. 低钙血症

96. 答案: E

解析: 在脱水、酸中毒时, 由于血液浓缩和钙离子增加, 可不出现低钙表现; 在脱水、酸中毒纠正后, 离子钙减少, 出现低钙症状, 表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

97. (A1 型题) 患儿, 男, 4 岁, 因腹泻, 呕吐 2 天入院。经 6 小时补液后, 护士发现患儿眼睑水肿明显, 判断可能的原因是

- A. 酸中毒未改善
- B. 碱中毒未改善
- C. 补液量不足
- D. 输入葡萄糖注射液过多
- E. 输入电解质溶液过多

97. 答案: E

解析: 补液后若患儿出现眼睑水肿, 可能是电解质溶液比例过高, 应及时通知医生调整补液。故本题选 E。

98. (A1 型题) 单纯性机械性肠梗阻的临床特点是

- A. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进
- B. 持续性绞痛, 频繁呕吐
- C. 持续性剧痛, 腹胀不对称
- D. 持续性胀痛, 肠鸣音消失
- E. 腹胀明显, 肛门停止排气

98. 答案: A

解析: 单纯性机械性肠梗阻指各种机械性原因引起的肠腔变窄, 肠内容通过受阻。因此单纯性机械性肠梗阻的临床表现主要为阵发性绞痛, 体检出现肠型与蠕动波, 压痛, 无腹膜刺激征, 肠鸣音亢进, 出现气过水声或金属声。故本题对于单纯性机械性肠梗阻的临床特点应选择 A。

99. (A1 型题) 肠梗阻时, 胃肠减压的液体为血性时, 首先考虑

- A. 肝破裂
- B. 肠管绞窄坏死
- C. 并发胆道出血
- D. 胃肠减压管刺破胃黏膜
- E. 凝血机制的障碍

99. 答案: B

解析: 胃肠减压: 清除肠腔内积气、积液, 有效缓解腹胀、腹痛。胃肠减压期间应注意保持负压吸引通畅, 密切观察并记录引流液的性状及量, 若抽出血性液体, 应高度怀疑绞窄性肠梗阻。故正确答案为 B。

100. (A1 型题) 肠梗阻的表现不包括

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 停止排气、排便
- D. 腹泻
- E. 呕吐



100. 答案: D

解析: 肠梗阻的共性表现有: 腹痛、呕吐、腹胀及停止排便排气。因此答案为 D。

101. (A1 型题) 高位小肠梗阻除腹痛外最主要症状是

- A. 腹胀明显
- B. 呕吐频繁
- C. 叩诊呈鼓音
- D. 停止排便排气
- E. 腹部包块

101. 答案: B

解析: 高位小肠梗阻呕吐出现早且频繁, 呕吐物为胃十二指肠内容物, 腹胀表现不明显, 由于梗阻位置较高, 大量胃肠道内容物聚集于胃内, 有时可见胃型。由于梗阻位置较高, 下段肠道内仍有功能, 早期可不出现肛门停止排气排便。故本题选择 B, 而 A、C、D、E 均是错误的。

102. (A1 型题) 需紧急手术的肠梗阻是

- A. 粘连性
- B. 蛔虫性
- C. 麻痹性
- D. 急性肠扭转
- E. 早期肠套叠

102. 答案: D

解析: 急性肠扭转是最严重的肠梗阻, 常在短时间内发生肠绞窄、肠坏死, 如不能及时诊断治疗很易发生休克, 所以需要紧急手术。其他选项采取非手术治疗。

103. (A1 型题) 最常见的肠梗阻是

- A. 机械性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 血运性肠梗阻
- E. 动力性肠梗阻

103. 答案: A

解析: 按肠梗阻的基本原因可以分为三类: 机械性肠梗阻为最常见的梗阻原因, 是因各种原因引起肠腔狭窄, 使肠内容物通过发生障碍, 多由于肠壁病变如先天性肠道闭锁、炎症性狭窄、肿瘤等引起肠管受压, 肠腔堵塞, 因此选择 A。

104. (A1 型题) 下列属于机械性肠梗阻的是

- A. 慢性铅中毒引起的肠梗阻
- B. 神经反射引起的肠梗阻
- C. 急性腹膜炎引起的肠梗阻
- D. 先天性肠道闭锁引起的肠梗阻
- E. 肠系膜血管栓塞引起的肠梗阻

104. 答案: D

解析: 机械性肠梗阻多由于肠壁病变如先天性肠道闭锁、炎症性狭窄、肿瘤等引起的肠管受压如粘连带、腹腔内脓肿、肿瘤、嵌顿、肠扭转等引起机械性肠梗阻。所以选择 D 是正确的。

105. (A1 型题) 肠梗阻非手术治疗期间, 梗阻解除的标志是

- A. 胃肠减压后腹痛减轻

- B. 呕吐后腹胀减轻
- C. 轻度压痛无肌紧张
- D. 肛门排便、排气
- E. 肠鸣音亢进转为消失

105. 答案: D

解析: 肠梗阻是指肠内容物由于各种原因不能正常运行、顺利通过肠道。不同肠梗阻的共性表现有: 腹痛、呕吐、腹胀及停止排便排气。肠鸣音亢进转为消失, 为肠梗阻加重的表现。而非手术治疗期间肛门排便、排气说明胃肠功能恢复梗阻解除。故正确答案为 D。

106. (A1 型题) 预防肠扭转最重要的措施是避免

- A. 腹部受凉
- B. 进食高脂饮食
- C. 进食辛辣饮食
- D. 进食高蛋白饮食
- E. 饱餐后剧烈运动

106. 答案: E

解析: 肠扭转是一段肠袢沿其肠系膜长轴旋转造成闭袢性肠梗阻, 常在饱食后剧烈活动而发病, 避免在饱餐后立即进行重体力劳动, 尤其是需要身体前俯和旋转的劳动, 对预防肠扭转有一定意义, 故本题选 E。

107. (A1 型题) 发生单纯性机械性肠梗阻时, 典型的局部病理生理变化是

- A. 梗阻以上肠段蠕动减弱或消失
- B. 低位肠梗阻的肠腔扩张多不明显
- C. 肠管内积气多源于细菌分解
- D. 不存在肠管血运障碍
- E. 梗阻以上部位肠腔扩张、梗阻以下肠管瘪陷

107. 答案: E

解析: 单纯性机械性肠梗阻主要原因包括: ①肠腔内堵塞②肠管外受压③肠壁病变, 表现为阵发性绞痛伴肠鸣音亢进, 腹胀限于梗阻以上部位, 无肠管血运障碍, 典型的局部病理生理变化是梗阻以上部位肠腔扩张、梗阻以下肠管瘪陷, 故本题选 E。

108. (A1 型题) 下列因素中, 最有可能导致粘连性肠梗阻的是

- A. 肠系膜栓塞
- B. 阑尾炎手术后
- C. 肠套叠
- D. 肠扭转
- E. 低钾血症

108. 答案: B

解析: 肠系膜栓塞易导致血运性肠梗阻, 肠套叠、肠扭转易导致机械性肠梗阻, 低钾血症易导致麻痹性肠梗阻, 阑尾炎手术后患者活动减少, 肠道蠕动减少, 极易导致肠道粘连, 故本题选 B。

109. (A1 型题) 肠梗阻共有的临床特点是

- A. 腹痛、呕吐、腹胀、停止排气排便
- B. 腹痛、呕吐、腹胀、肠鸣音消失
- C. 腹胀、呕吐、排黏液血便、肠鸣音消失

- D. 腹部压痛、反跳痛、腹肌紧张、腹胀
- E. 腹胀、溢出性呕吐、肠鸣音消失、排黏液血便

109. 答案: A

解析: 肠梗阻患者主要临床表现“痛、吐、胀、闭”, 即腹痛、呕吐、腹胀、停止排便排气, 故本题选 A。

110. (A1 型题) 单纯性机械性肠梗阻时, 梗阻以上肠管的病理生理变化哪项除外

- A. 肠蠕动增强
- B. 肠腔内大量积气、积液
- C. 肠腔扩张
- D. 肠壁大量液体渗出
- E. 肠管缺血、坏死

110. 答案: E

解析: 单纯机械性肠梗阻只有肠内容物通过受阻, 而无肠管血运障碍, E 选项肠管缺血、坏死易导致血运行、绞窄性肠梗阻, 故本题选 E。

111. (A1 型题) 单纯性机械性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的最主要区别在于

- A. 梗阻发生的时间
- B. 有无发生血运障碍
- C. 肠蠕动的快慢
- D. 梗阻的部位
- E. 梗阻的程度

111. 答案: B

解析: 单纯性肠梗阻只有肠内容物通过受阻, 而无肠管血运障碍; 绞窄性肠梗阻伴肠管血运障碍, 两者最主要的区别即有无发生血运障碍, 故本题选 B。

112. (A2 型题) 肠梗阻患者最重要的非手术措施是

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 纠正水电解质失衡
- C. 加强营养
- D. 腹部按摩
- E. 阿托品解痉

112. 答案: A

解析: 胃肠减压可以减少肠道积液、积气, 利于肠壁血运恢复, 还可以降低腹内压, 改善因膈肌抬高而导致的呼吸障碍, 故本题选 A。

113. (A2 型题) 术后应鼓励患者早期活动, 其作用不包括

- A. 预防尿潴留
- B. 预防术后出血
- C. 促进肠蠕动
- D. 预防深静脉血栓
- E. 减少肺部并发症

113. 答案: B

解析: 术后早期下床活动①利于排尿, 防止尿潴留; ②促进肠蠕动, 防止肠粘连; ③促进血液循环, 防止血栓; ④增加肺通气量, 防止肺部感染; ⑤防止肌肉废用性萎缩, 故本题选 B。

114. (A2 型题) 患者, 男性, 28 岁, 饱餐后剧烈运动, 突发脐周剧烈绞痛, 中腹部触及局限性压痛包块, 全腹有腹膜刺激征, 为

- A. 肠套叠
- B. 肠扭转
- C. 梗阻性肠痉挛
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 蛔虫性肠梗阻

114. 答案: B

解析: 肠扭转青壮年及儿童多见。发病突然, 腹痛剧烈, 脐周绞痛常涉及腰背部, 常为持续阵发性加重。患者弯腰蜷曲可减轻疼痛, 腹部可扪及胀大的肠襻。根据患者的体征考虑是肠扭转。

115. (A2 型题) 患者, 女, 因腹痛、腹胀, 呕吐宿食 1 小时入院, 诊断为粘连性肠梗阻, 下列相关因素中, 与该疾病无关的是

- A. 腹腔手术
- B. 腹腔炎症
- C. 习惯性便秘
- D. 腹腔内出血
- E. 腹腔内异物

115. 答案: C

解析: 粘连性肠梗阻常见原因为腹腔炎症、损伤、出血、腹腔异物, 多见于腹部手术或腹腔炎症以后, 而长期便秘使肠道内容物增加易导致机械性肠梗阻, 与题干不符, 故本题选 C。

116. (A2 型题) 患儿, 男, 5 岁, 蛔虫性肠梗阻, 该患者不会出现下列哪项临床表现

- A. 阵发性腹痛和呕吐
- B. 腹部可扪及变形的条索状团块
- C. 明显腹膜刺激征
- D. 症状的严重程度与体征不相符
- E. 可呕吐出虫体

116. 答案: C

解析: 蛔虫性肠梗阻表现为阵发性腹痛、腹胀、呕吐、有时吐出或便出蛔虫等, 腹肌紧张不明显, 多数病人在脐周或右下腹摸到条索状或香肠样肿块, 故本题选 C。

117. (A2 型题) 患者, 女, 46 岁, 突发上腹部阵发性绞痛伴恶心呕吐 5 小时来院急诊。体检: 腹稍胀, 未见肠型及蠕动波, 腹式呼吸减弱, 下腹部轻度压痛, 叩诊鼓音, 移动性浊音阴性, 听诊肠鸣音亢进。血白细胞计数轻度升高, X 线检查示肠袢胀气及多个气液平面。首先考虑的疾病是

- A. 急性胃穿孔
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性阑尾炎

117. 答案: C

解析：从患者的腹痛、腹胀、呕吐及肠鸣音等症状，可初步判断患者为机械性肠梗阻，X线检查示肠袢胀气及多个气液平面，更加确定患者发生了急性肠梗阻。故本题选C。

118. (A2型题) 患者，男，34岁，麻痹性肠梗阻，以下哪项临床特点与该患者不符

- A. 持续性腹部胀痛
- B. 呕吐呈溢出性
- C. 肠鸣音亢进
- D. 均匀性全腹胀
- E. 停止排气排便

118. 答案：C

解析：麻痹性肠梗阻属于动力性肠梗阻，肠蠕动消失，肠内容物无法正常通行，肠鸣音减弱或消失，故本题选C。

119. (A2型题) 患者，女性，40岁，因肠梗阻入院。采用非手术治疗期间，护士发现腹部出现固定性压痛及腹膜刺激征，提示肠梗阻的性质演变为

- A. 血运性
- B. 机械性
- C. 粘连性
- D. 绞窄性
- E. 单纯性

119. 答案：D

解析：机械性肠梗阻可见肠型和肠蠕动波，表现为阵发性绞痛。绞窄性肠梗阻可有固定压痛及腹膜刺激征，麻痹性肠梗阻时为肠鸣音减弱或消失。所以选择D是正确的。

120. (A2型题) 患者，女性，55岁，胃穿孔术后4天，持续腹胀，无排气、排便。查体：腹部膨隆，全腹轻压痛及反跳痛，肠鸣音消失；X线腹片示小肠、结肠充气。考虑为

- A. 粘连性肠梗阻
- B. 急性肠套叠
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 急性肠扭转
- E. 痉挛性肠梗阻

120. 答案：C

解析：急性腹膜炎、低钾血症及某些腹部手术后等易引起麻痹性肠梗阻，表现为肠蠕动消失，肠鸣音减弱或消失，X线检查胃泡影增大，小肠、结肠全部胀气。故本题选C。

121. (A2型题) 患者，女性，41岁，阵发性腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排气1天，诊断粘连性肠梗阻。能减轻腹胀、改善肠壁血液循环的措施是

- A. 止痛，半卧位
- B. 禁食、胃肠减压
- C. 肠外营养支持
- D. 纠正水、电解质失衡
- E. 腹部环行按摩

121. 答案：B

解析：胃肠减压可以减少肠道积液、积气，减轻肠腔膨胀，利于肠壁血运恢复，还可以降低腹内压，改善因膈肌抬高而导致的呼吸障碍，故本题选 B。

122. (A1 型题) 护理阑尾切除术后的病人，嘱咐早期起床活动，主要是为了防止

- A. 内出血
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠粘连
- D. 切口感染
- E. 肠痿

122. 答案：C

解析：护理阑尾切除术后的病人，嘱咐早期下床活动能促进胃肠蠕动的恢复，防止肠粘连，增进血液循环，促进伤口愈合。所以选择 C

123. (A1 型题) 急性阑尾炎非手术治疗期间，体温升高，全腹疼痛，腹肌紧张，其病情判断为

- A. 并发腹腔脓肿
- B. 阑尾穿孔腹膜炎
- C. 阑尾坏疽
- D. 并发门静脉炎
- E. 形成阑尾周围脓肿

123. 答案：B

解析：急性阑尾炎非手术治疗期间，出现腹膜刺激症阳性考虑发生腹膜炎。因此选择 B 是正确的。

124. (A1 型题) 阑尾周围脓肿消退后做阑尾切除的最佳时间是

- A. 立即手术切除
- B. 两周后手术切除
- C. 3 个月后手术切除
- D. 数年后手术切除
- E. 无须手术切除

124. 答案：C

解析：腹腔脓肿是急性阑尾炎的最常见并发症，由于麻痹性肠梗阻所致腹胀，表现为压痛性肿块，全，身中毒感染症状。一经诊断立即在超声引导下穿刺抽脓，冲洗或置引流管，必要时手术切开引流。由于炎症粘连较重，非手术方法复发率很高，应在炎症消退后 3 个月择期行阑尾切除。故本题答案为 C。

125. (A2 型题) 急性阑尾炎患者最典型的症状是

- A. 转移性脐周疼痛
- B. 转移性右下腹痛
- C. 固定的脐周疼痛
- D. 固定的右下腹痛
- E. 腹痛位置无规律

125. 答案：B

解析：阑尾炎患者腹痛典型表现为转移性右下腹痛。疼痛发作始于上腹部，逐渐移向脐周，之后转移并局限于右下腹，呈持续性。故本题选 B。

126. (A1 型题) 下列急性阑尾炎中，可行非手术治疗的是

- A. 早期急性单纯性阑尾炎

- B. 急性化脓性阑尾炎
- C. 穿孔性阑尾炎
- D. 坏疽性阑尾炎
- E. 老年急性阑尾炎

126. 答案: A

解析: 非手术治疗适用于不同意手术的单纯性阑尾炎或诊断未确定、病程超过72小时、炎症肿块和阑尾周围脓肿已形成等有手术禁忌者。故本题选A。

127. (A1型题) 急性阑尾炎早期脐周或上腹疼痛的原因是

- A. 胃肠功能紊乱
- B. 内脏神经反射
- C. 躯体神经反射
- D. 阑尾位置变动
- E. 阑尾管壁充血

127. 答案: B

解析: 阑尾炎早期, 炎症侵及黏膜及黏膜下层, 内脏神经受累, 定位不准确, 出现脐周或上腹疼痛, 故本题选B。

128. (A1型题) 急性阑尾炎易出现坏死穿孔的最重要的解剖因素是

- A. 阑尾是一盲管, 呈蚯蚓状
- B. 阑尾系膜短易扭曲
- C. 阑尾开口狭小
- D. 阑尾动脉为终末血管
- E. 阑尾管壁淋巴组织丰富

128. 答案: D

解析: 因为阑尾的血液供应为回结动脉的终末分支动脉, 没有侧枝循环, 一旦受压就容易缺血坏死穿孔。

129. (A1型题) 护理阑尾切除术后病人, 第1天应注意观察的并发症是

- A. 内出血
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠粘连
- D. 门静脉炎
- E. 切口感染

129. 答案: A

解析: 术后5~7天病人体温下降后又升高, 且伴腹痛、腹胀、腹肌紧张或腹部包块等, 常提示腹腔感染或脓肿。若术后2~3天, 切口部位出现红肿、压痛、波动感, 且伴体温升高, 应考虑切口感染。肠粘连是晚期并发症。阑尾炎术后第一天最主要的并发症是内出血。故正确答案为A。

130. (A2型题) 患者, 男性, 32岁, 转移性右下腹疼痛12小时, 右下腹固定压痛点, 腹肌紧张及反跳痛, 诊断为化脓性阑尾炎。患者出现腹肌紧张说明炎症刺激了

- A. 阑尾肌层
- B. 阑尾腔黏膜
- C. 壁腹膜
- D. 脏腹膜
- E. 盲肠

130. 答案: C

解析: 患者出现腹肌紧张说明炎症刺激了阑尾壁, 导致有小脓肿形成, 粘膜有溃疡及坏死, 浆膜面多量纤维性渗出, 腔内充满脓性液体, 称为化脓性蜂窝织炎性阑尾炎。

131. (A2 型题) 患者, 女, 38 岁, 转移性右下腹痛 4 小时, 伴恶心、呕吐、发热。护理评估时, 最能提示该病人患有阑尾炎的体征是

- A. 移动性浊音
- B. 右下腹固定压痛
- C. 肠鸣音亢进
- D. 肠型、蠕动波
- E. 肝浊音界缩小

131. 答案: B

解析: 阑尾根部在体表的投影, 一般在右髂前上棘到脐连线的右 1/3 处, 此处称阑尾点, 又叫麦氏点, 阑尾炎时, 此处常有明显压痛。因此右下腹固定压痛是阑尾炎特有体征。

132. (A2 型题) 患者, 男性, 阑尾穿孔腹膜炎。腹部手术后 6 天, T39°C, 伤口无红肿, 伴呃逆。最可能发生了

- A. 膈下脓肿
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 肺脓肿
- E. 胸膜腔积液

132. 答案: A

解析: 脓肿刺激膈肌可引起呃逆。膈下感染可通过淋巴引起胸膜、肺反应, 出现胸水, 咳嗽、胸痛。结合患者的症状考虑为膈下脓肿。故选 A。

133. (A2 型题) 患者男, 急性阑尾炎穿孔致腹膜炎。手术后第 5 天体温升高达 39°C, 伴大便次数增多, 里急后重, 黏液便, 伤口不痛, 无咳嗽。考虑哪项可能性最大

- A. 切口感染
- B. 菌痢
- C. 肠炎
- D. 盆腔脓肿
- E. 肺炎、肺不张

133. 答案: D

解析: 腹腔脓肿常发生于术后 5~7 天, 表现为体温升高或下降后反复升高, 伴有腹痛、腹胀、腹部包块及直肠膀胱刺激征。故选择 D。患者伤口不痛, 暂不考虑切口感染。无明显肠道感染病史及既往相关病史, 暂不考虑菌痢, 肠炎。患者无咳嗽, 暂不考虑肺炎。

134. (A2 型题) 患者男, 33 岁, 转移性右下腹痛 8 小时。体查: 体温 38°C, 血压正常, 右下腹固定的压痛, 无腹肌紧张, 临床诊断为急性阑尾炎。该病人的阑尾病变属于

- A. 单纯性阑尾炎
- B. 化脓性阑尾炎
- C. 坏疽性阑尾炎



D. 阑尾周围脓肿

E. 慢性阑尾炎

134. 答案：A

解析：急性阑尾炎分为四种病理类型：①急性单纯性阑尾炎，病变只限于黏膜和黏膜下层，临床症状和体征较轻；②急性化脓性阑尾炎，病变扩展致阑尾壁各层并有小脓肿形成，表面覆以脓性渗出物，可形成局限性腹膜炎；③坏疽性及穿孔性阑尾炎，阑尾腔内积脓，压力不断升高致阑尾壁血液循环障碍，容易发生穿孔，穿孔如未被包裹可引起急性弥漫性腹膜炎；④阑尾周围脓肿，急性阑尾炎化脓、坏疽、穿孔的过程较慢时，大网膜将阑尾包裹并粘连形成炎性肿块或阑尾周围脓肿。转移性右下腹痛，可以诊断为阑尾炎。体温轻度增高，一般情况良好，无腹膜炎，考虑为单纯性阑尾炎。故选A。

135. (A2型题) 患者，男，70岁，2天前因急性阑尾炎行阑尾切除术，现诉腹胀，未排气、排便，下列护理措施错误的是

A. 评估患者腹胀情况

B. 给予阿托品肌注

C. 鼓励患者床上多翻身

D. 必要时给予肛管排气

E. 鼓励患者下地活动

135. 答案：B

解析：阑尾切除术后患者，出现腹胀，未排气、排便，应考虑胃肠功能未恢复，应评估患者腹胀情况，鼓励患者早期下地活动，腹胀严重时可给予肛管排气。阿托品可抑制胃肠蠕动，故本题选B。

136. (A2型题) 患者，男，50岁，坏疽性阑尾术后第7天，局部伤口红肿，触之有波动感，穿刺抽到脓液，其最佳处理方法是

A. 伤口用酒精纱布湿敷

B. 局部理疗

C. 全身应用抗菌药

D. 拆去缝线，伤口敞开引流

E. 外敷鱼石脂药膏

136. 答案：D

解析：根据题干可以推断患者发生了切口感染，主要处理措施为感染伤口先行试穿出脓液，或在波动处拆除缝线敞开引流，排出脓液，定期换药。故本题选D。

137. (A2型题) 患者，男，56岁，1天前右下腹有转移性腹痛，麦氏点有固定的压痛，现腹痛突然加重，范围扩大，下腹部有肌紧张，应考虑是

A. 单纯性阑尾炎

B. 化脓性阑尾炎

C. 坏疽性阑尾炎

D. 阑尾周围脓肿

E. 阑尾穿孔

137. 答案：E

解析：右下腹压痛是急性阑尾炎最常见的重要体征。压痛点通常位于麦氏点，发病早期腹痛尚未转移至右下腹时，右下腹便可出现固定性痛，与患者情况相符合。另外当阑尾炎穿孔时，疼痛和压痛的范围可波及全腹，但仍以阑尾所在位置压痛最明显，同时会有腹膜刺激征，表现为反跳痛、腹肌紧张、肠鸣音减弱或消失等。

腹膜炎范围扩大，说明局部腹腔内有渗出或阑尾穿孔，本题选 E 项最合适。A、B、C、D 均属于急性阑尾炎的病理分型，单纯性阑尾炎症状较轻，与患者情况不符合。化脓性阑尾炎的腹痛呈阵发性胀痛和剧痛，与患者情况也不符合。坏疽性阑尾炎阑尾管壁坏死或部分坏死，呈暗紫色或黑色，与患者情况不符合，阑尾周围脓肿的形成需要一定时间，与患者疾病的进展速度不相符合。

138. (A1 型题) 老年男性容易发生的疝是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 脐疝
- D. 易复疝
- E. 股疝

138. 答案: B

解析: 腹股沟直疝系指腹内器官经直疝三角突出而形成的疝，以老年男性多见。直疝三角处腹壁缺乏完整的腹肌覆盖，且腹横筋膜也比周围部分为薄，故易发生疝。老年人由于肌组织发生退行性变而使肌组织更加薄弱，故双侧多见。因此正确答案为 B。

139. (A1 型题) 腹外疝内容物最常见的是

- A. 小肠
- B. 盲肠
- C. 大网膜
- D. 阑尾
- E. 膀胱

139. 答案: A

解析: 疝内容物是指进入疝囊的腹内脏器或组织，小肠最为多见，大网膜次之，包括盲肠、阑尾、乙状结肠、横结肠、膀胱等均可进入疝囊，但较少见。因此本题选择 A。

140. (A1 型题) 表示容易回纳的疝是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 脐疝
- D. 易复性疝
- E. 股疝

140. 答案: D

解析: 腹外疝按其性质分为易复性疝、难复性疝、嵌顿性疝、绞窄性疝等。凡疝内容很容易回纳入腹腔的，称为易复性疝。故选 D。

141. (A1 型题) 切口疝最主要的发病原因是

- A. 应用皮质激素类药物
- B. 切口感染
- C. 切口裂开
- D. 术后咳嗽，腹胀
- E. 有其他合并症

141. 答案: B

解析：切口疝是指腹腔内器官或组织自腹壁手术切口突出形成的疝，腹内压过高、切口愈合不良、手术操作不当等都是引起切口疝的原因，其中切口感染是最主要的原因，故本题选 B。

142. (A1 型题) 嵌顿性疝与绞窄性疝的主要区别是

- A. 疝内容物与疝囊有无粘连
- B. 疝内容物能否回纳
- C. 是否出现肠梗阻
- D. 疝内容物有无血运障碍
- E. 疝块有无压痛

142. 答案：D

解析：嵌顿性疝疝环较小而腹内压骤然增高时，疝内容物强行扩张而进入疝囊，随后由于囊颈的弹性回缩，阻止疝内容物回纳腹腔。嵌顿如不能及时解除，肠管及其系膜受压情况不断加重使动脉血流减少，最后导致完全阻断，即为绞窄性疝，故本题选 D。

143. (A1 型题) 引起腹外疝的两个主要原因为

- A. 妊娠与重体力劳动
- B. 腹水与便秘
- C. 腹壁强度低与腹内高压
- D. 外伤与感染造成腹壁缺损
- E. 腹股沟管与股管宽大

143. 答案：C

解析：腹壁强度降低和腹内压力增高是腹外疝发病的两个主要原因。妊娠与重体力劳动、腹水与便秘导致腹内压力增高，外伤与感染造成腹壁缺损、腹股沟管与股管宽大可导致腹壁强度降低。因此正确答案为 C。

144. (A1 型题) 腹股沟斜疝与直疝的最主要鉴别点是

- A. 发病年龄
- B. 有无咳嗽冲击感
- C. 疝块外形
- D. 平卧后肿块能否自行回纳
- E. 压迫内环后疝是否再突出

144. 答案：E

解析：腹股沟斜疝回纳疝块后压住深环疝块不再突出，而直疝疝块仍可突出，压迫内环后疝是否再突出成为直疝和斜疝的主要鉴别点。故本题选 E。

145. (A1 型题) 疝内容物与疝囊发生粘连而不能完全回纳入腹腔的疝是指

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

145. 答案：C

解析：疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔者，称为难复性疝。疝内容物反复突出，致疝囊颈受摩擦损伤，并产生粘连是导致内容物不能回纳的常见原因。故本题选 C。

146. (A1 型题) 下列外科手术后，不应采取半卧位的是

- A. 阑尾炎手术后
- B. 血胸闭式引流术后
- C. 气胸闭式引流术后
- D. 腹股沟疝手术后
- E. 胃大部切除术后

146. 答案: D

解析: 腹股沟疝手术后早期取平卧位, 膝下垫一软枕, 使髋关节微屈, 以降低腹股沟区切口张力和减少腹腔内压力, 利于切口愈合和减轻切口疼痛。故本题选 D。

147. (A1 型题) 脐疝的疝环是

- A. 脐环
- B. 腹股沟管
- C. 阴囊
- D. 外环
- E. 直疝三角

147. 答案: A

解析: 疝环是疝突出体表的门户, 是腹壁薄弱区或缺损区所在, 其中脐疝的脐环处有脐血管穿过, 是腹壁的薄弱点。故本题选 A。

148. (A1 型题) 用于治疗腹股沟疝的最常用方法是

- A. 疝成形术
- B. 疝囊低位结扎术
- C. 疝修补术
- D. 暂不手术
- E. 疝环填补术

148. 答案: C

解析: 腹股沟疝早期手术效果好、复发率低, 除少数特殊情况外, 腹股沟疝一般均应尽早施行手术治疗, 最有效的治疗方法是手术修补。故本题选 C。

149. (A1 型题) 在腹外疝发病的诸多因素中, 最重要的因素是

- A. 妊娠
- B. 举重
- C. 慢性腹水
- D. 慢性咳嗽
- E. 腹壁强度降低

149. 答案: E

解析: 腹壁强度降低和腹内压升高是腹外疝发病的两个主要原因, 其中腹壁薄弱或缺损: 有先天性或后天性薄弱或缺损, 是腹外疝的发病基础。故本题选 E。

150. (A1 型题) 绞窄性疝的处理原则为

- A. 紧急手术
- B. 手法复位
- C. 补液
- D. 胃肠减压
- E. 解痉镇痛

150. 答案: A

解析: 绞窄性疝的内容物已坏死, 需要紧急手术治疗, 防止肠梗阻和腹膜炎。故本题选 A。