

2022年中西医医师资格执业押题

第二单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 不属于肝细胞性黄疸的特点是
 - 尿胆红素阳性
 - 尿胆原常增多
 - 血清结合型、非结合型胆红素均增高
 - 血清仅结合型胆红素增高
 - 大便颜色正常或变深
- 一严重脑出血病人,急性期间出现呕吐咖啡色胃内容物,应考虑
 - 急性胃炎
 - 既往有消化性溃疡
 - 既往有肝硬化
 - 应激性溃疡
 - 伴发急性胆囊炎
- 肠鸣音亢进,呈金属音者见于
 - 急性肠炎
 - 消化道出血
 - 机械性肠梗阻
 - 麻痹性肠梗阻
 - 急性胃炎
- 下列选项中,除哪项均可出现P2增强
 - 肺心病
 - 动脉导管未闭
 - 肺动脉瓣狭窄
 - 左心衰竭
 - 二尖瓣狭窄
- 鼻梁塌陷而致鼻外形似马鞍状见于
 - 鼻中隔偏曲
 - 肥大鼻息肉
 - 鼻窦炎
 - 先天性梅毒
 - 红斑狼疮
- 正常人支气管肺泡呼吸音不应该出现在
 - 胸骨角附近
 - 胸骨上窝
 - 肩胛间区的第3胸椎水平
 - 右肺尖
 - 肩胛间区的第4胸椎水平
- 胃肠道穿孔应采用的检查方法是
 - 卧位腹平片
 - 立位腹平片
 - 卧位腹透
 - 盆腔像
 - 全消化道造影
- 下列描述为右上肺中心型肺癌的典型X线的是
 - 两上肺锁骨下区的片状阴影
 - 左心缘影呈直线状斜向外下方
 - 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行"S"状的下缘
 - 肺内有多发的薄壁空洞
 - 肺内有多发的肿块影
- 下列关于左心室肥大的心电图的说法,错误的是
 - $Rv5$ 或 $Rv6 > 2.5mV$
 - $Rv5$ 或 $Rv6 + Sv1 > 4.0mV$ (男)
 - 心电轴左偏
 - 以R波为主的导联中,S-T段下移 $0.05mV$
 - T波高尖
- CK-MB在急性心肌梗死(AMI)发生后多久开始升高
 - 4~10小时
 - 12~36小时
 - 3~8小时
 - 9~30小时
 - 3~6小时
- 中性粒细胞核左移不见于
 - 急性大出血
 - 急性溶血反应
 - 感染
 - 一氧化碳中毒
 - 恶性贫血
- 急性型再障患者的骨髓增生程度是

- A. 极度活跃
B. 明显活跃
C. 活跃
D. 减低
E. 极度减低
13. 脊柱前凸多见于
A. 脊髓灰质炎
B. 强直性脊柱炎
C. 脊柱结核
D. 佝偻病
E. 髌关节结核
14. 下列哪项不会出现肺下界上移
A. 膈肌麻痹
B. 腹腔积液
C. 腹内压升高
D. 肺不张
E. 肺气肿
15. 落日现象可见于
A. 小颅
B. 尖颅
C. 方颅
D. 巨颅
E. 长颅
16. 胃肠病变时常用的触诊方法是
A. 浅部触诊法
B. 深部滑行触诊法
C. 双手触诊法
D. 深压触诊法
E. 冲击触诊法
17. 遗传病史属于
A. 现病史
B. 既往史
C. 个人史
D. 婚姻史
E. 家族史
18. 在诊断中排在第三位的应是
A. 主要疾病
B. 曾患过的疾病
C. 家族主要成员所患的疾病
D. 并发症
E. 伴发病
19. 下列选项中,属于呼气性呼吸困难的是
A. 急性喉炎
B. 支气管哮喘
C. 气管异物
D. 支气管肿瘤
E. 大面积肺不张
20. 先出现意识障碍,后出现发热常见于
A. 流脑
B. 伤寒
C. 流行性出血热
D. 脑出血
E. 休克型肺炎
21. 病侧呼吸动度减弱伴叩诊为鼓音、呼吸音消失者,见于
A. 肺实变
B. 肺气肿
C. 肺不张
D. 气胸
E. 胸膜增厚
22. 肠套叠可见腹痛,并伴有
A. 急性发热
B. 黄疸
C. 呕吐
D. 腹泻
E. 血便
23. 黏液脓血便,多见于
A. 阿米巴痢疾
B. 细菌性痢疾
C. 急性胃肠炎
D. 疟疾
E. 霍乱
24. 对于过敏性鼻炎患者,增高的是
A. IgG
B. IgA
C. IgM
D. IgD
E. IgE
25. 药物对机体作用的两重性是指
A. 过敏反应和毒性反应
B. 预防作用和不良反应
C. 治疗作用和不良反应
D. 副作用和毒性反应
E. 治疗作用和毒性反应
26. 存在首过效应的是哪种给药途径
A. 直肠给药
B. 肌内注射
C. 舌下给药
D. 静脉注射
E. 口服

27. 下列哪项是不同给药途径吸收快慢的顺序
- A. 吸入>舌下>静脉滴注>皮下注射>口服>直肠>皮肤
- B. 吸入>肌内注射>皮下注射>舌下>口服>直肠>皮肤
- C. 皮肤>直肠>口服>皮下注射>肌内注射>舌下>吸入
- D. 舌下>静脉注射>肌内注射>皮下注射>口服>直肠>皮肤
- E. 静脉滴注>肌内注射>皮下注射>舌下>口服>直肠>皮肤
28. 毛果芸香碱的叙述, 不正确的是
- A. 常用制剂为1%滴眼液
- B. 可使眼内压升高
- C. 可用于治疗青光眼
- D. 能直接激动M受体, 产生M样作用
- E. 可使汗腺和唾液腺的分泌明显增加
29. 有机磷酸酯类中毒常见的死亡原因是
- A. 败血症
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 呼吸麻痹
- D. 感染性休克
- E. 心力衰竭
30. 下列哪项药物用于麻醉前, 可抑制腺体分泌, 保持呼吸道通畅
- A. 毒扁豆碱
- B. 毛果芸香碱
- C. 新斯的明
- D. 山莨菪碱
- E. 阿托品
31. 治疗支气管哮喘的拟肾上腺素药物是
- A. 去甲肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 多巴胺
- D. 甲氧明
- E. 氨茶碱
32. 间羟胺对肾上腺素能神经受体的作用是
- A. 直接兴奋 α 受体, 对 β 受体作用较弱
- B. 直接兴奋 β 受体, 对 α 受体作用较弱
- C. 直接兴奋 α 受体, 对 β 受体作用较弱
- D. 直接兴奋 β 受体, 对 α 受体作用较弱
- E. 直接兴奋 α 受体, 对 β 受体无作用
33. 卡马西平即可以用于治疗癫痫, 还可以治疗
- A. 心律失常
- B. 心绞痛
- C. 失眠
- D. 外周神经痛
- E. 帕金森病
34. 阿司匹林的不良反应是
- A. 水杨酸反应
- B. 诱发溃疡出血
- C. 诱发哮喘
- D. 凝血障碍
- E. 以上均是
35. 抗结核病的合理化疗原则是
- A. 早期、大剂量、联合、规律及全程用药
- B. 早期、适量、联合、规律及全程用药
- C. 早期、小剂量、联合、全程用药
- D. 早期、适量、联合、全程用药
- E. 早期、大剂量、联合、全程用药
36. 主要用于治疗敏感菌引起的深部感染的是
- A. 氟胞嘧啶
- B. 咪康唑
- C. 特比萘芬
- D. 氟康唑
- E. 制霉菌素
37. 对于高血压合并心肌梗死者应选用哪种药物
- A. 尼卡地平
- B. 硝苯地平
- C. 地尔硫卓
- D. 维拉帕米
- E. 尼莫地平
38. 磺胺类药物作用机制是与细菌竞争
- A. 叶酸还原酶
- B. 四氢叶酸还原酶
- C. 二氢叶酸还原酶
- D. 一碳单位转移酶
- E. 二氢叶酸合成酶
39. 对于双胍类药物的描述, 错误的是
- A. 降低胰岛素与其受体的结合
- B. 尤适用于肥胖性、饮食控制无效的糖尿病
- C. 用于轻症糖尿病
- D. 减慢葡萄糖在肠道的吸收
- E. 不依赖于胰岛 β 细胞
40. 既是腑会穴, 又是胃之募穴的是

- A. 胃俞
- B. 天枢
- C. 足三里
- D. 上巨虚
- E. 中脘

41. 足阳明经和足太阴经交接于

- A. 足大趾内端
- B. 足大趾外侧
- C. 足小趾内侧
- D. 足小趾外侧
- E. 足中指内侧

42. (助理不考) 在八会穴中, 髓会是

- A. 膻中
- B. 阳陵泉
- C. 太渊
- D. 大杼
- E. 绝骨

43. 位于下肢外侧中线的经脉是

- A. 胆经
- B. 脾经
- C. 胃经
- D. 膀胱经
- E. 三焦经

44. 隔盐灸的作用是

- A. 清热、解毒、消肿
- B. 回阳、救逆、固脱
- C. 解表、散寒、温中
- D. 防病、保健、益寿
- E. 温肾、壮阳、通脉

45. 下列灸法中, 属于艾炷灸的是

- A. 温针灸
- B. 隔附子饼灸
- C. 回旋灸
- D. 温和灸
- E. 蒜泥灸

46. 中风闭证针刺水沟的刺法

- A. 斜向上刺
- B. 斜向下刺
- C. 平刺
- D. 提插捻转
- E. 平补平泻

47. 悬钟的定位

- A. 外踝前下方凹陷处
- B. 在小腿外侧, 当外踝尖上3寸, 腓骨后缘
- C. 在小腿外侧, 当外踝尖上3寸, 腓骨前缘

D. 外踝上8寸, 相当外膝眼与外踝尖连线处的中点

E. 足背第二三趾缝间, 趾蹼缘厚5分处

48. 手少阴心经与手太阳小肠经的交接部位是

- A. 无名指端
- B. 食指端
- C. 中指端
- D. 小指端
- E. 拇指端

49. 位于内踝尖下一寸, 内踝下缘边缘凹陷中的是

- A. 申脉
- B. 照海
- C. 丘墟
- D. 太溪
- E. 昆仑

50. 患者, 女, 45岁. 头痛多年, 后头部疼痛固定不移, 痛如椎刺, 舌暗, 脉细涩. 针灸治疗除百会、风池外, 宜加用下列哪组腧穴

- A. 列缺、曲池
- B. 申脉、悬钟
- C. 肝俞、脾俞
- D. 太溪、侠溪
- E. 血海、膈俞

51. 患者, 长久以来低头工作, 项背部强痛, 低头加重, 颈项后枕部疼痛, 颈部僵紧不舒, 针刺选用

- A. 督脉、太阳经
- B. 督脉、少阳经
- C. 任脉、太阳经
- D. 督脉、厥阴经
- E. 督脉、太阴经

52. 痛痹除选用阿是穴和局部经穴外, 主要配下列哪组经穴

- A. 肾俞、关元
- B. 大椎、曲池
- C. 肝俞、太冲
- D. 膈俞、血海
- E. 阴陵泉、足三里

53. 治疗饮食伤胃型胃痛, 除足三里、中脘、内关等主穴外, 还应加用

- A. 三阴交、内庭
- B. 膈俞、胃俞
- C. 胃俞、脾俞
- D. 下脘、梁门
- E. 气海、关元

54. 下列发疹性传染病按皮疹出现的先后次序排列, 依次为

- A. 猩红热、天花、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- B. 猩红热、风疹、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- C. 天花、水痘、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- D. 水痘、猩红热、天花、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- E. 水痘、天花、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒

55. 甲型肝炎和戊型肝炎共有的主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 母婴传播
- C. 血液传播
- D. 体液传播
- E. 性传播

56. 病原体侵入人体后,引起机体发生免疫应答,同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应,导致组织损伤,引起病理改变与临床表现,此种情况是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏感染
- E. 机会性感染

57. 流行性出血热的"三痛"是指

- A. 头痛、腰痛和身痛
- B. 头痛、腰痛和关节痛
- C. 头痛、腰痛和腓肠肌痛
- D. 头痛、腰痛和眼眶痛
- E. 头痛、腰痛和腹痛

58. 关于志贺菌属,下列哪项说法是正确的

- A. 为革兰阴性杆菌,有鞭毛
- B. 对化学消毒剂不敏感
- C. 在外界生存时间甚短期
- D. 对理化因素抵抗力强
- E. 产生外毒素和内毒素

59. 确诊伤寒的依据是

- A. 发热中毒症状,周围白细胞减低
- B. 大便培养阳性
- C. 血培养阳性
- D. 肥达反应"H" "O" 滴度增高
- E. 嗜酸性粒细胞减少

60. HIV主要感染的细胞是

- A. 单核巨噬细胞
- B. 小神经胶质细胞
- C. 骨髓干细胞
- D. B细胞
- E. CD4+淋巴细胞

61. 艾滋病患者在艾滋病期常见的呼吸系统并发症为

- A. 巨细胞病毒引起的病毒性肺炎

B. 肺炎链球菌肺炎

C. 卡氏肺孢子菌肺炎

D. 葡萄球菌肺炎

E. 念珠菌引起的肺真菌病

62. 流行性乙型脑炎病变最严重的区域通常是

- A. 大脑皮质
- B. 脊髓
- C. 脑桥
- D. 小脑
- E. 延髓

63. 暴发型流脑的临床特点是

- A. 高热、出血、肾损害
- B. 高热、惊厥、休克、呼吸衰竭
- C. 心悸、气促、相对缓脉
- D. 高热、瘀斑、休克、呼吸衰竭
- E. 高热、皮疹、脾大

64. 下列关于布鲁菌病的说法不正确的是

- A. 主要传染源是牛、猪、羊
- B. 病理变化广泛,其中以以骨骼肌肉系统最常见
- C. 急性感染症状包括发热、多汗、乏力、肌肉和关节疼痛等
- D. 成人患病治疗首选多西环素联合利福平
- E. 免疫学检查包括平板凝集试验、试管凝集试验等

65. 下列流感实验室检查结果,不符合单纯型流感的是

- A. 白细胞总数减少
- B. 中性粒细胞数减少
- C. 淋巴细胞数相对增加
- D. 血小板减少
- E. 单核细胞数正常

66. 《素问·阴阳应象大论》说: "壮火之气衰,少火之气壮",其中"壮火""少火"的本义是

- A. 药食气味纯阳与温和之别
- B. 人体阳气亢盛与平和之别
- C. 病理之火与生理之火的区别
- D. 邪火与正气之别
- E. 相火与君火之别

67. 据《素问·评热病论》,下列除哪项外,均为"劳风"的症状

- A. 头项强急不舒
- B. 唾出若涕
- C. 目眩不明
- D. 腰脊强痛
- E. 恶风而振寒

68. 《素问·至真要大论》认为"皆属于火"的病证为

- A. 诸病有声,鼓之如鼓

- B. 诸痛痒疮
C. 诸胀腹大
D. 诸转反戾,水液浑浊
E. 诸病肘肿,疼酸惊骇
69. 《素问·痿论》关于痿证的治疗原则,下列哪一项除外
A. 独取阳明
B. 补其荣
C. 通其俞
D. 补益五脏
E. 因时制宜
70. 小结胸病的主脉是
A. 浮数
B. 浮缓
C. 浮大
D. 浮滑
E. 浮而动数
71. 生姜泻心汤证的病机是
A. 邪热聚结心下,气机阻滞,兼阳虚不固
B. 误下损伤脾胃,寒热错杂于中,升降失常
C. 脾胃不和,寒热错杂,水饮食滞
D. 脾胃重虚,寒热错杂,水谷不化
E. 胃虚痰阻,胃气不和,虚气上逆
72. 关于通脉四逆汤的加减法,下列哪项论述是错误的
A. 面色赤加葱九茎
B. 腹中痛,去甘草加芍药二两
C. 呕者加生姜二两
D. 咽痛者去芍药加桔梗一两
E. 利止脉不出者去桔梗加人参二两
73. 原文"自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也……"中,不渴是因为
A. 脾虚失运,寒湿弥漫
B. 太阴虚寒,里有寒饮
C. 里无热邪,津液未伤
D. 脾肾阳虚,水湿内生
E. 下利后饮水过多
74. 百合病的病位在
A. 心
B. 胸膈
C. 心肺
D. 心肾
E. 肺肾
75. 桂枝加龙骨牡蛎汤证的病机是
A. 阴阳两虚
B. 肝肾阴虚
C. 心肾阳虚
D. 心脾气虚
E. 心肺气虚
76. 关于厚朴七物汤证的临床表现,以下哪项不是
A. 下利
B. 腹满
C. 发热
D. 脉浮数
E. 饮食如故
77. "诸有水者,腰以下肿,当利小便,腰以上肿,当发汗乃愈",出自《金匮要略》哪一篇
A. 《水气病脉证并治》
B. 《痰饮咳嗽病脉证并治》
C. 《消渴小便不利淋病脉证并治》
D. 《黄疸病脉证并治》
E. 《呕吐啰下利病脉证治》
78. 《温热论》中提到"湿与温合"的情况,以下哪项不是其病机变化
A. 湿郁热蒸
B. 清窍为之壅塞
C. 水主之气不能上荣
D. 蒙蔽于上
E. 浊邪害清
79. 关于其邪始终在气分流连的治疗,以下哪项不确切
A. 可冀其战汗透邪
B. 法宜甘温益胃
C. 疏瀹枢机,灌溉汤水,使邪气松达,与汗偕行
D. 汗后宜身凉脉静
E. 更有邪盛正虚,不能一战而解,停一二日再战汗而愈者
80. 温病战汗后,若出现气脱,叶氏认为临床表现是
A. 汗出肤冷,倦卧不语,脉虚和缓
B. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉弦而数
C. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉象急疾
D. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉虚而细
E. 汗出肤冷,倦卧不语,脉象细数
81. 违背了不伤害原则的是
A. 用无可辩驳的语气证明,临床死亡即将来临且病人痛苦时,允许病人死亡
B. 糖尿病人腿部有严重溃疡,有发生败血症的危险,予以截肢
C. 在化疗中,导致造血和免疫系统不良影响
D. 对病人的呼叫或提问置之不理
E. 病人要求撤消或终止治疗而允许病人死亡
82. 下列医患关系中,属于技术内容的是

- A. 医务人员对病人良好的服务态度
- B. 医务人员对病人高度的责任心
- C. 医务人员对病人的同情和尊重
- D. 医务人员以精湛的医术为病人服务
- E. 病人对医务人员的尊重

83. 下列不属于医德品质内容的是

- A. 仁爱
- B. 诚挚
- C. 严谨
- D. 公正
- E. 专业

84. 分工明确、相互依赖是现代医疗活动的鲜明特点,体现的道德原则是

- A. 互相尊重
- B. 互相爱护

- C. 互相支持
- D. 互相监督
- E. 互相学习

85. 下列属于现代医学目的的是

- A. 重治疗轻预防
- B. 提高生命质量
- C. 过度追求技术发展
- D. 克服疾病
- E. 避免死亡

86. 下列不是辅助检查应遵循的道德要求的是

- A. 目的明确, 诊治需要.
- B. 知情同意, 尽职尽责.
- C. 综合分析, 切忌片面.
- D. 密切联系, 加强协作.
- E. 全面系统, 认真细致.

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

87. 李某, 男性, 25岁. 服用大量地西泮导致昏迷收入院. 诊断为: 地西泮急性中毒. 除洗胃及其他支持疗法外, 应给予特异性的解毒药是

- A. 阿托品
- B. 解磷定
- C. 尼可刹米
- D. 贝美格
- E. 氟马西尼

88. 张某, 女性, 48岁. 有甲状腺功能亢进病史, 经内科治疗好转, 近日因感冒又出现胸闷、心慌, 睡眠差, 心电图示为窦性心动过速. 对该病人选用抗心律失常药是

- A. 普罗帕酮
- B. 利多卡因
- C. 维拉帕米
- D. 苯妥英钠
- E. 美托洛尔

89. 某女, 49岁, 由于劳累、过度兴奋而突发心绞痛, 服用下列哪种药效果好

- A. 口服硫酸奎尼丁
- B. 舌下含服硝酸甘油
- C. 注射盐酸利多卡因
- D. 口服盐酸普鲁卡因胺
- E. 注射苯妥英钠

90. 患者, 男, 41岁. 大面积烧伤合并严重铜绿假单胞菌感染, 生化检查血肌酐及尿素氮值异常. 应选用的抗感染药物是

- A. 复方新诺明
- B. 头孢氨苄
- C. 丁胺卡那霉素
- D. 庆大霉素
- E. 头孢三嗪

91. 男, 39岁. 双眼睑下垂7~8天, 渐加重, 近一两天四肢或活动无力, 晨起轻, 下午重, 休息后减轻, 活动后加重. 诊断: 重症肌无力. 对该病人最好用哪种药物

- A. 新斯的明
- B. 毒扁豆碱
- C. 阿托品
- D. 毛果芸香碱
- E. 加兰他敏

92. 患者, 女, 58岁. 因全身关节疼痛, 长期服用某药, 昨日出现自发性骨折. 导致该不良反应的药物是

- A. 保泰松
- B. 阿司匹林
- C. 消炎痛
- D. 强的松
- E. 布洛芬

93. 患者, 女, 62岁. 因心力衰竭入院, 拟用地高辛口

服治疗,每日0.25mg.已知地高辛半衰期为36小时,达稳定的血药浓度约需几天

- A. 2~3天
- B. 6~7天
- C. 9~10天
- D. 12~14天
- E. 16~18天

94. 患者,34岁,自觉有气从少腹上冲胸咽,诊断为奔豚气,治疗穴位为

- A. 地机
- B. 血海
- C. 公孙
- D. 太白
- E. 隐白

95. 患者,59岁,自感午后及夜间低热,有热自骨内向外透发,若治疗选用背俞穴,首选穴位

- A. 肝俞
- B. 肺俞
- C. 脾俞
- D. 三焦俞
- E. 心俞

96. 患者,男,29岁,恶寒发热,,鼻塞流涕,咳嗽头痛,周身酸楚不适,恶寒重发热轻,无汗喷嚏,苔薄白,脉浮紧,除主穴外,还需要选择的配穴是

- A. 尺泽、委中
- B. 大椎、风门
- C. 风门、肺俞
- D. 少商、商阳
- E. 曲池、尺泽

97. 患者,男,56岁,腰痛半个月,腰部冷痛重着,拘挛不可俯仰,舌淡,苔白,脉紧,治疗除选取阿是穴、大肠俞、委中外,应配用下列哪组腧穴

- A. 膈俞
- B. 腰阳关
- C. 足三里
- D. 志室
- E. 悬钟

98. 何某,女,24岁,2天前感冒后出现左侧额纹鼻唇沟变浅,眼裂变大,口角歪向右侧.舌红,苔薄黄,脉浮数.治疗除主穴外,还应加用

- A. 攒竹、丝竹空
- B. 气海、足三里
- C. 外关、关冲
- D. 风池、风府
- E. 足三里、内庭

99. 谢某,男,63岁,中风半身不遂,舌强语蹇,口眼歪斜,兼见目赤面红,心烦,口苦,舌红苔黄,脉弦.除水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中外,还应选取哪些配穴

- A. 丰隆、合谷
- B. 内庭、风池
- C. 太冲、太溪
- D. 足三里、气海
- E. 曲池、内庭

100. 王某,男,43岁,1天前受寒后出现关节疼痛较剧痛处固定,得热痛缓,关节屈伸不利,局部皮肤有寒冷感,舌质淡,舌苔薄白,脉弦紧.针灸治疗除主穴外,应加取

- A. 膈俞、血海
- B. 曲池、尺泽
- C. 曲池、大椎
- D. 肾俞、关元
- E. 足三里、阴陵泉

101. 刘某,女,45岁,2天前突然出现耳鸣,自觉耳中胀痛,耳鸣如潮,鸣声隆隆不断,按之不减.兼见头胀,目赤,咽干,脉弦.该患者除上述主穴外,还应选取的配穴为

- A. 外关、合谷
- B. 行间、丘墟
- C. 太冲、行间
- D. 太冲、太溪
- E. 丰隆、丘墟

102. 耿某,女,24岁,食海鲜后皮肤出现大小不等,形状不一的风团,高起皮肤,边界清楚,色红,瘙痒,伴恶心,肠鸣泄泻,舌红,苔黄腻,脉滑数.除曲池、合谷、血海、膈俞、委中、三阴交外,应加取

- A. 外关、风池
- B. 足三里、天枢
- C. 三阴交、天枢
- D. 足三里、大横
- E. 三阴交、风池

103. 患者,女,29岁.受凉后感冒,现恶寒发热3天,伴头身疼痛,无汗,喘咳,痰涎清稀量多,胸痞,舌苔白滑,脉浮,该患者的病因病机是

- A. 风寒束表,阳郁化热,表寒里热
- B. 风寒束表,水饮内停,表寒里饮
- C. 风寒犯表,营卫不和,卫闭营郁
- D. 风寒袭表,营卫不和,卫强营弱
- E. 素有郁热,复感风寒,外寒内热

104. 患者,女,60岁,年老体弱,身肿日久,腰以下为

甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳减便溏,面色不华,神疲乏力,四肢倦怠,小便短少,舌质淡,苔白滑,脉沉弱.据《素问·汤液醪醴论》所述,该病的治疗原则主要是

- A.平治于权衡
- B.缪刺其处,以复其形
- C.微动四极
- D.温衣
- E.开鬼门,洁净府

105.患者,女,28岁,产后第4天,症见脉微弱,呕不能食,大便反坚,但头汗出,眩晕头昏者,此属

- A.痙病
- B.郁冒
- C.大便难
- D.产后中风
- E.产后胃实

106.患者,女,42岁,现处于温病后期,症见夜晚发热,

白天退热,热退后无汗出,就诊后确定热自阴来,治宜选用

- A.加减复脉汤
- B.三甲复脉汤
- C.大定风珠
- D.青蒿鳖甲汤
- E.黄连阿胶汤

107.患者,女,31岁,患流感3天,现身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉细数,舌绛而干.治宜清营汤,患者"反不渴"是因为

- A.邪热不甚
- B.兼有痰邪
- C.兼有瘀血
- D.邪热蒸腾营阴上泛
- E.热扰心神而不觉

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(108~110题共用题干)

何某,女,47岁.头部空痛10年,头痛隐隐,遇劳发作,兼头晕,神疲乏力,面色不华,舌淡,脉细弱.

108.其辨证为

- A.肾虚头痛
- B.血虚头痛
- C.痰浊头痛
- D.瘀血头痛
- E.肝阳上亢头痛

109.除阿是穴外,该患者应选取的主穴为

- A.合谷、风池、外关

B.率谷、风池、外关

C.足临泣、后溪、外关

D.百会、风池、合谷

E.合谷、风府、百会

110.应加选的配穴为

A.太溪、太冲

B.太冲、内关

C.关元、气海

D.脾俞、足三里

E.脾俞、胃俞

B型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(111~112题共用备选答案)

A.TSH

B.TT、TTa

C.FT₁、FT₂

D.TPOAb、TGAb

E.TRAb

11.诊断甲亢的首选指标是

112.反应甲状腺功能最敏感的指标是

(113~114题共用备选答案)

A. P波与QRS波毫无关系, P-P间隔与R-R间隔各有其固定规律

B. PR间期恒定, 部分P波后无QRS波群

C. PR间期逐渐延长, 直到1个P波后脱落1个QRS波群

D. PR间期 >0.20 秒; 每个P波后, 均有QRS波群

E. P波增宽 0.12 s, 出现双峰, 切迹间距 0.04 s

13. 二度I型房室传导阻滞的心电图表现是

114. 三度房室传导阻滞的心电图表现是

(115~116题共用备选答案)

A. V1-V6

B. V1-V3

C. II、III、aVF

D. V3-V5

E. I、aVL

115. 高侧壁特征性心电图改变出现在() 导联

116. 下壁特征性心电图改变出现在() 导联

(117~118题共用备选答案)

A. 稽留热

B. 弛张热

C. 间歇热

D. 回归热

E. 不规则热

17. 斑疹伤寒所致的发热热型通常为

118. 霍奇金病所致的发热热型通常为

(119~120题共用备选答案)

A. 咳声嘶哑

B. 犬吠样咳嗽

C. 无声咳嗽

D. 鸡鸣样咳嗽

E. 金属调咳嗽

119. 纵隔肿瘤的咳嗽声的特点为

120. 百日咳的咳嗽声的特点为

(121~122题共用备选答案)

A. 痉挛性偏瘫步态

B. 醉酒步态

C. 慌张步态

D. 蹒跚步态

E. 剪刀步态

121. 小脑病变患者出现的步态是

122. 脑瘫患者出现的步态是

(123~124题共用备选答案)

A. 血清尿素氮检查

B. 血 2-微球蛋白

C. 血肌酐检查

D. 尿 2-微球蛋白

E. 内生肌酐清除率

123. 肾功能检查中, 反应近端肾小管重吸收功能的是

124. 肾功能检查中, 肾小球损伤的敏感指标是

(125~126题共用备选答案)

A. QRS波群

B. PR间期

C. QT间期

D. ST段

E. P波

125. 心电图上, 反映心室早期缓慢复极的波段是

126. 心电图上, 心房的除极波是

(127~128题共用备选答案)

A. 普萘洛尔

B. 酚妥拉明

C. 哌唑嗪

D. 美托洛尔

E. 阿托品

127. 选择性阻断 α_1 受体的药物是

128. 能阻断 α_1 和 α_2 受体的药物是

(129~130题共用备选答案)

A. 组胺

B. 雷尼替丁

C. 氯丙嗪

D. 氢氯噻嗪

E. 异丙嗪

129. 抑制胃酸分泌的药物是

130. 促进胃酸分泌的药物是

(131~132题共用备选答案)

A. 作用于远曲小管和集合管, 竞争醛固酮受体, 对抗醛固酮的作用

B. 作用于近曲小管, 抑制碳酸酐酶, 减少 H^+ - Na^+ 交换

C. 作用于远曲小管近端, 阻滞 Na^+ 通道, 减少 Na^+ 的重吸收

D. 作用于髓袢升支粗段皮质部, 抑制 Na^+ - K^+ - $2Cl^-$ 共同转运系统

E. 作用于髓袢升支粗段的髓质和皮质部, 抑制 Na^+ - K^+ - $2Cl^-$ 共同转运系统

131. 呋塞米的利尿作用机制是

132. 螺内酯的利尿作用机制是

(133~134题共用备选答案)

A. 红霉素

B. 阿奇霉素

C. 氯霉素

D. 青霉素

E. 土霉素

133. 治疗回归热的的首选是

134. 可产生"灰婴综合征"的是

(135~136题共用备选答案)

A. 6寸

B. 4寸

C. 0.5寸

D. 1寸

E. 2寸

135. 足少阴肾经循行到腹部距任脉

136. 足太阴脾经循行到腹部距任脉

(137~138题共用备选答案)

A. 肾俞

B. 肺俞

C. 风门

D. 命门

E. 次髂

137. 第2腰椎棘突下,旁开1.5寸的腧穴是

138. 在骶区,正对第2骶后孔中的是

(139~140题共用备选答案)

A. 干扰素

B. 利巴韦林

C. 奥司他韦

D. 拉米夫定

E. 沙奎那韦

139. 流行性出血热抗病毒治疗首选的药物是

140. 流感抗病毒治疗首选的药物是

(141~142题共用备选答案)

A. HBsAg

B. 抗-HBs

C. HBeAg

D. 抗-HBe

E. 抗-HBc

141. 感染HBV后最早出现的血清学标志是

142. 表示病毒复制活跃的是

(143~144题共用备选答案)

A. 钩端螺旋体

B. 奈瑟菌

C. HIV

D. 汉坦病毒

E. 黄病毒

143. 引发肾综合征出血热的病原体是

144. 引发流行性脑脊髓膜炎的病原体是

(145~146题共用备选答案)

A. 传染病患者进入恢复期后,已稳定退热一段时间,潜伏于组织内的病原体再度繁殖,,使发热等初发症状再度出现

B. 传染病患者在恢复期,体温未稳定下降至正常,又再度升高

C. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体

D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体

E. 传染病痊愈以后再次感染病原体发病

145. 复发是指

146. 再燃是指

(147~148题共用备选答案)

A. 严防商品化原则

B. 维护社会公益原则

C. 互盲和保密原则

D. 维护供受双方和后代利益的原则

E. 知情同意原则

147. 在人工辅助生殖技术中,医疗机构与医务人员对捐赠者和受者的有关信息保密,体现了

148. 供精、供卵、供胚胎应以捐赠助人为目的,禁止买卖。这体现了人工辅助生殖技术中的

(149~150题共用备选答案)

A. 尊重患者原则

B. 生命价值原则

C. 知情同意原则

D. 保密原则

E. 最优化原则

149. 临床诊疗的道德原则中,最普通、最基本的治疗原则是

150. 临床诊疗的道德原则中,医疗行为原则的重要伦理依据是

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元 西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
第三单元 中西医内科150
第四单元 中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
第二单元 中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25

