

2022年中西医医师资格助理押题

第二单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列选项为饮食不洁同时感受外邪最易发生的是
A.漏
B.痢
C.岩
D.痰
E.癆
B.大补元煎加减
C.五汁安中饮加味
D.启膈散合逍遥散加减
E.桃红四物汤合犀角地黄汤加减
- 除以下哪项外,均是血管瘤的治疗方法
A.穿刺
B.手术
C.放射
D.冷冻
E.硬化剂注射
7.以下不属于子宫在中医中的称谓的是
A.胞宫
B.子脏
C.子处
D.女子胞
E.龙门
- 以下情况属于补托法的适应症的是
A.气血生化不及而致其功能失常
B.身体经络的局部虚弱
C.毒气虽盛而正气未衰
D.正虚毒盛,正气不能托毒外达
E.肿疡邪毒不致结聚成脓而得到消散
8.胎儿附属物不包括
A.羊水
B.胎膜
C.胎盘
D.脐带
E.蜕膜
- 适用于肿疡、溃疡、皮肤病糜烂结痂渗液不多的是
A.箍围药
B.油膏
C.膏药
D.掺药
E.草药
9.卵泡早期分泌量少,其后逐渐增高,排卵前达高峰,以后降低,黄体期再度增高.符合上述变化的激素是
A.促卵泡素
B.促黄体素
C.雌激素
D.泌乳素
E.孕激素
- 对于高血压患者,术前应将血压维持在
A.140/90mmHg 以下
B.130/80mmHg 以下
C.130-140/80-90mmHg
D.160/100mmHg 以下
E.140/80mmHg 以下
10.在产后三审中,验津液之盛衰的是
A.乳汁的多少
B.饮食的多少
C.小腹的痛与不痛
D.大便的通与不通
E.小便的利与不利
- 下列哪项属于食管癌津亏热结证用方的是
A.二陈汤加减
11.以下哪项是异位妊娠的基本病机
A.肾气亏虚
B.湿热下注

C.瘀血阻滞冲任胞宫

D.冲任不固,带脉失约

E.少腹血瘀实证

12. 以下属于外阴阴道假丝酵母菌病的西医治疗是

A.口服甲硝唑

B.2%克林霉素软膏

C.口服己烯雌酚

D.口服伊曲康唑、氟康唑

E.口服尼尔雌醇

13. 正常8个月小儿体重约

A.9kg

B.8kg

C.7kg

D.10kg

E.11kg

14. 鹅口疮的病原体是

A.柯萨奇病毒

B.白色念珠菌

C.葡萄球菌

D.流感杆菌

E.链球菌

15. 下列脏腑与厌食关系密切的是

A.肾与膀胱

B.肝胆

C.脾胃

D.心与小肠

E.肺与大肠

16. 关于望诊的说法错误的是

A.面呈黑色,主寒证、肾虚、痛证、瘀证、水饮内停

B.头方发少、囟门迟闭,可见于佝偻病

C.肛门瘙痒,入夜尤甚,多为蛲虫侵扰

D.端坐喘促,痰鸣哮喘,多为哮喘

E.口腔、舌部黏膜破溃糜烂,满口白屑,状如雪花,多见于麻疹黏膜斑

17. 小儿发生壮热、昏迷、抽搐之惊风、疫毒痢、暑温等疾病,多与下列那些脏腑关系最密切

A.肝、肾

B.肺、脾

C.脾、肾

D.心、肝

E.肺、脾、肾

18. 关于病毒性心肌炎的中医病因病机,说法错误的是

A.小儿素体正气亏虚是发病之内因

B.耗气伤阴、血脉阻滞为主要病理变化

C.病理产物为瘀血、痰浊

D.病变部位主要在心,常涉及脾、肾

E.发病外因为温热邪毒侵袭

19. 慢性支气管炎的诊断要点是

A.咳嗽、咳痰每年持续1个月,持续2年以上者

B.咳嗽、咳痰每年持续2个月,持续2年以上者

C.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续2年以上者

D.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续3年以上者

E.咳嗽、咳痰每年持续3个月,持续1年以上者

20. 下列降压药中,适用于于高血压伴前列腺增生患者的是

A.α受体阻滞剂

B.β受体阻滞剂

C.ACEI类

D.CCB

E.利尿剂

21. 消化性溃疡最主要的症状是

A.食欲减退

B.呕吐,黑便

C.恶心,呕吐

D.上腹疼痛

E.嗝气,反酸

22. 尿路感染最常见的感染途径是

A.血行感染

B.直接感染

C.淋巴道感染

D.上行感染

E.下行感染

23. 缺铁性贫血在应用铁剂治疗多久后血红蛋白浓度可恢复正常

A.1周

B.1月

C.2月

D.6月

E.4月

24. 反映甲状腺功能最重要的指标是

A.血清甲状腺激素的测定

B.血清TSH测定

- C. T抑制试验
 D. 甲状腺摄¹³¹I率测定
 E. 促甲状腺激素释放激素(TRH) 兴奋试验
25. 鉴别1型和2型糖尿病的主要指标是
 A. 血浆胰岛素测定
 B. 糖化血红蛋白
 C. 葡萄糖耐量试验
 D. 空腹血糖
 E. 尿糖
26. 痛风诊断的金标准为
 A. 关节液穿刺或痛风石活检证实为尿酸盐结晶
 B. X线检查发现软组织肿胀
 C. 超声检查发现结石显影
 D. 四肢近端小关节呈对称性梭形肿胀畸形
 E. 关节囊液可培养出细菌
27. 系统性红斑狼疮最常见的脏器损害是
 A. 肺
 B. 肾
 C. 心
 D. 脾
 E. 肝
28. 对于有机磷杀虫药中毒,目前临床上首选的胆碱酯酶复能药为
 A. 高锰酸钾
 B. 双复磷
 C. 氯磷定
 D. 阿托品
 E. 东莨菪碱
29. 不寐的病理变化总属

- A. 阴盛阳衰,阴阳不和
 B. 阴虚火旺
 C. 阳盛阴衰,阴阳失交
 D. 卫气不固
 E. 营卫不和
30. 葛根芩连汤可治疗的泄泻证型是
 A. 寒湿内盛证
 B. 食滞肠胃证
 C. 湿热伤中证
 D. 脾胃虚弱证
 E. 肾阳虚衰证
31. 便秘气秘证需应用以下哪种方剂治疗
 A. 麻子仁丸
 B. 温脾汤
 C. 黄芪汤
 D. 六磨汤
 E. 润肠丸
32. 胁痛的基本治则是
 A. 疏肝和络止痛
 B. 活血化瘀
 C. 疏肝健脾补肾
 D. 补益肺气
 E. 理气化痰
33. 积证与鼓胀的鉴别关键点在于
 A. 有无腹胀
 B. 有无包块
 C. 有无脉络暴露
 D. 有无疼痛
 E. 有无水液停聚

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

34. 患者,女,28岁,因重度贫血输入大量库存血,后出现四肢乏力、手足麻木,伴心律减慢,听诊心音遥远而弱,心电图早期T波高尖,基底变窄,该症状属于
 A. 重度脱水
 B. 中度脱水
 C. 轻度脱水
 D. 高钾血症
 E. 低钾血症
35. 患者,女,20岁,发现颈前区单一肿块4个月,随

- 吞咽上下活动,边界清楚,B超示: 甲状腺B超: 左侧甲状腺内见一0.15*0.2cm低回声结节,边界清楚,包膜完整.现症: 颈部肿块不红、不热、不痛;伴烦躁易怒,胸胁胀满;舌苔白,脉弦.应首先考虑的诊断是
 A. 甲状腺功能减退症 肝郁气滞证
 B. 单纯性甲状腺肿 痰凝血瘀证
 C. 甲状腺腺瘤 痰凝血瘀证
 D. 甲状腺癌 气滞痰凝证
 E. 甲状腺腺瘤 肝郁气滞证

36. 患者,女,54岁,面部出现有红、肿、热、痛的小结节,逐渐肿大并隆起,出现脓栓,应诊断为

- A. 痰核
- B. 疔
- C. 痈
- D. 丹毒
- E. 疽

37. 患者,女,35岁,不慎被热水烫伤双足,患处现有水疱,创面微湿,红白相间,痛觉较迟钝.初步估计烫伤面积和烧伤深度为

- A. 6%浅II°
- B. 7% I°
- C. 6% 浅II°
- D. 7% 深II°
- E. 8% III°

38. 患者,女性,26岁,初产妇,产后3周双乳出现红肿热痛,可触及包块,现症: 肿块逐渐增大,皮肤烦红灼热,疼痛剧烈,呈持续性搏动性疼痛,壮热不退,口渴喜饮,患部拒按,按之应指.舌质红,苔黄腻,脉滑数.首选治疗为

- A. 瓜蒌牛蒡汤 维生素E
- B. 五味消毒饮合透脓散 青霉素
- C. 托里消毒散 青霉素
- D. 逍遥散 切开排脓
- E. 五味消毒饮合透脓散 切开排脓

39. 患者,男,53岁,消化性溃疡反复发作17年,近1周有溃疡病活动症状,今日突然出现持续性上腹部剧烈疼痛、恶心呕吐,伴轻度休克症状,查体: 腹部压痛及腹肌强直,腹腔内积气积液,为明确诊断需进行的检查为

- A. 腹部 CT
- B. 腹部B超发现包块
- C. 立位腹部透视
- D. 血常规
- E. 血淀粉酶测定

40. 患者,女,31岁,妊娠中晚期出现肢体面目肿胀可能诊断为

- A. 子冒
- B. 子晕
- C. 子痫
- D. 子肿

E. 晕厥

41. 患者,女,61岁.近2年劳动、行走或咳嗽时阴道内有物脱出,妇科检查发现: 子宫颈已脱出阴道口,但宫体仍在阴道内.现症: 阴中有物脱出,腰酸腿软,头晕耳鸣,小便频数,小腹下坠;舌质淡,苔薄,脉沉弱.治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 大补元煎
- D. 八珍汤
- E. 举元煎

42. 患者,女,33岁.近2年经前小腹疼痛,有灼热感,拒按,遇热痛增,月经先期、量多、经色深红、质黏稠夹血块,心烦口渴,溲黄便结,性交疼痛,盆腔结节包块触痛明显;舌红有瘀点,苔黄,脉弦数,诊断为子宫内膜异位症.治疗首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 理冲汤
- E. 清热调血汤

43. 患者,女,26岁,孕51天,近3天出现阴道下血,腰酸腹痛下坠,色暗红;舌边有瘀点,脉弦滑.B超示宫内胚胎存活.治疗选用的方剂是

- A. 寿胎丸
- B. 胎元饮
- C. 桂枝茯苓丸合寿胎丸
- D. 补肾固冲丸
- E. 当归散

44. 张某,女,18岁,月经停闭,第二性征已发育,但月经尚未来潮,现症: 小腹冷痛拒按,得热痛减,面色青白、形寒肢冷;舌紫黯,苔白,脉沉紧.治法是

- A. 温经散寒,活血通经
- B. 益气健脾,养血调经
- C. 燥湿化痰,活血通经
- D. 养阴清热,养血调经
- E. 行气活血,祛瘀通经

45. 张某,初产妇,29岁,产后小便不通,小腹胀急疼痛,伴腰膝酸软,面色晦暗,舌淡,苔润,脉沉细迟弱.可辨证为

- A. 气滞证

- B. 肺脾气虚证
- C. 肾阳亏虚证
- D. 血瘀证
- E. 气虚证

46. 男婴, 足月产, 先天性胆道闭锁, 出生后6小时即出现身黄、目黄、哭闹不安、呕吐、乳食不思, 3周后仍未消退, 血清总胆红素 133.4 μ mol/L. 现症: 面目皮肤发黄, 色泽晦暗, 精神倦怠, 四肢欠温, 不欲吮乳, 时时啼哭, 大便溏薄, 小便短少, 舌质偏淡, 舌苔白腻. 诊断为

- A. 生理性黄疸 寒湿阻滞证
- B. 病理性黄疸 湿热蕴蒸证
- C. 生理性黄疸 气滞血瘀证
- D. 病理性黄疸 寒湿阻滞证
- E. 病理性黄疸 气滞血瘀证

47. 患儿, 4岁. 于秋季, 发热咽痛2天, 体温达39.1 $^{\circ}$ C, 遂就诊, 检查发现: 咽部充血, 软腭上有2~4mm大小的疱疹, 疱疹周围有红晕. 心肺听诊正常. 可能的诊断是

- A. 咽结合膜
- B. 疱疹性咽峡炎
- C. 急性化脓性扁桃体炎
- D. 支气管炎
- E. 支气管肺炎

48. 赵某, 女, 5岁, 1周前出现上呼吸道感染症状. 现头痛2天, 呕吐伴血压增高1天, 嗜睡. 脑膜刺激征阳性. 现症: 表情淡漠, 目光呆滞, 喃喃自语, 神识不清, 口角流涎, 纳差乏力, 舌质胖嫩, 苔白, 脉弦滑. 治法是

- A. 涤痰开窍
- B. 豁痰化痰
- C. 健脾化痰
- D. 泻火涤痰
- E. 涤痰通络

49. 纪某, 女, 2岁. 平素喜食米饭等以碳水化合物为主的食物, 外表似"泥膏样", 四肢水肿. 现症: 四肢浮肿, 按之凹陷, 面色无华, 神疲乏力, 四肢欠温, 小便短少, 舌质淡嫩, 苔薄白, 脉沉缓无力. 治疗方剂为

- A. 肥儿丸
- B. 防己黄芪汤合五苓散
- C. 参苓白术散

- D. 资生健脾丸
- E. 石斛夜光丸

50. 刘某, 男, 4岁. 1周前出现结膜充血、流泪、畏光, 口腔颊黏膜近臼齿处出现直径约0.5~1mm的灰白色斑点, 周围有红晕. 3天前开始出疹, 出疹时热象高达38.6 $^{\circ}$ C, 皮疹先见于耳后、发际, 最后在手心、足心及鼻准部见疹点. 现症: 高热不退, 咳嗽气急, 鼻翼扇动, 口渴烦躁, 疹点密集色暗, 舌红苔黄, 脉数. 可辨证为

- A. 麻疹顺证, 初热期
- B. 风疹逆证, 邪毒闭肺证
- C. 麻疹逆证, 热毒攻喉证
- D. 风疹逆证, 邪陷心肝证
- E. 麻疹逆证, 邪毒闭肺证

51. 患儿, 男, 7岁, 上课时动作过多、注意力不集中. 平素情绪易冲动, 做事不顾后果, 检查发现智力正常. 现症: 多动多语, 烦躁不宁, 冲动任性, 难以制约, 兴趣多变, 注意力不集中, 胸闷烦热, 懊慌不眠, 口苦食少, 溲赤便结, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数. 该患儿治疗选方为

- A. 杞菊地黄丸
- B. 甘麦大枣汤
- C. 清瘟败毒饮
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连温胆汤

52. 王某, 女性, 28岁, 3天前确诊为急性支气管炎. 现症: 声重气急, 咳嗽咽痒, 痰稀色白, 骨节酸痛, 头痛鼻塞, 流清涕, 发热, 恶寒, 无汗, 苔薄白, 脉浮紧. 该患者的中医治法为

- A. 疏风清热, 宣肺止咳
- B. 疏风清肺, 润燥止咳
- C. 轻宣凉燥, 润肺止咳
- D. 疏风散寒, 宣肺止咳
- E. 温肺化饮, 散寒止咳

53. 吕某, 女, 55岁, 由于近期劳累, 1周前胸骨中上段突发压榨性疼痛, 波及心前区, 放射至左肩, 疼痛持续5分钟左右, 休息后自行缓解. 今日疼痛再次发作, 为缓解症状, 应首选下列哪种药

- A. 口服硫酸奎尼丁
- B. 舌下含服硝酸甘油
- C. 注射盐酸利多卡因
- D. 口服盐酸普鲁卡因胺

E. 注射苯妥英钠

54. 王某, 男, 55岁. 原发性高血压病史3年, 现症: 头晕头痛, 口干口苦, 面红目赤, 烦躁易怒, 大便秘结, 小便黄赤, 舌红苔黄, 脉弦. 其治疗方法是

- A. 平肝潜阳
- B. 祛痰降浊
- C. 活血化瘀
- D. 滋补肝肾, 平潜肝阳
- E. 温补肾阳

55. 于某, 男性, 48岁, 患者1年来中上腹隐隐作痛, 时作时止, 消瘦15斤左右. 近2周来中上腹疼痛加重遂来就诊. 查体: 左锁骨上可触及一直径约1.5cm淋巴结, 质硬. 腹平软, 中上腹部压痛, 无肌紧张及反跳痛, 肝脾肋下未及. 辅助检查: 上消化道钡餐检查示: 胃黏膜皱襞消失, 胃壁僵硬, 未见蠕动波, 胃腔明显缩小. 胃镜示: 皮革胃. 该患者应考虑为

- A. 肝癌
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 慢性胃炎
- E. 慢性肝炎

56. 患者, 男, 46岁. 反复右胁腹疼痛10年. 现症见胁下积块坚实, 痛定不移, 脘腹胀满, 甚则腹大如鼓, 面目发黄晦暗, 肌肤甲错, 高热烦渴, 小便黄赤, 大便干黑, 舌红有瘀斑, 苔黄腻, 脉弦数. 经诊断为"原发性肝细胞癌". 其选用方药为:

- A. 柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- B. 实脾饮加减
- C. 逍遥散合桃红四物汤加减
- D. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- E. 滋水清肝饮合鳖甲煎丸加减

57. 马某, 女, 32岁. 患者3年前因生气出现腹痛、腹泻, 夹有脓血, 泻后痛减, 经服用柳氮磺吡啶及激素灌肠治疗半年后症状控制, 但仍反复发作迁延未愈. 现腹痛喜温喜按, 腹胀, 腰膝酸软, 食少, 形寒肢冷, 神疲懒言, 舌质淡有齿痕, 脉沉细. 肠镜结果示: 乙状结肠、降结肠、直肠黏膜血管纹理模糊紊乱, 黏膜充血、水肿、易脆, 多发细小溃疡. 该患者治疗选方为

- A. 白头翁汤
- B. 参苓白术散
- C. 理中丸合四神丸
- D. 驻车丸
- E. 膈下逐瘀汤

58. 李某, 女性, 32岁. 因近期工作劳累, 出现发热、小便不适, 尿急, 尿频2天, 伴有小便后疼痛, 腰痛,

肾区叩击痛阳性, 尿沉渣镜检5~8个白细胞/高倍视野. 该患者最可能的诊断为

- A. 急性膀胱炎
- B. 肾结石
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 肾小球肾炎

59. 林某, 女性, 12岁, 因月经量多导致皮肤黏膜苍白, 疲乏无力, 头晕耳鸣、眼花症状出现. 实验室检查发现Bb100g/L, 总铁结合力升高. 症见面色萎黄, 少华, 腹胀, 善食易饥, 恶心呕吐, 嗜食生米、泥土、茶叶等神疲肢软, 气短头晕, 舌质淡, 脉象虚弱. 应治以

- A. 健脾和胃, 益气养血
- B. 益气补血, 养心安神
- C. 温补脾肾
- D. 杀虫消积, 补益气血
- E. 清热凉血, 解毒养阴

60. 高某, 女, 16岁. 两周前患上呼吸道感染, 口服药物治疗后症状减轻, 但近日皮肤多处瘀点、瘀斑, 牙龈出血, 不伴发热. 血常规示: 白细胞 $0.9 \times 10^9 / L$, 血红蛋白129g/L, 血小板 $39 \times 10^9 / L$. 应首先考虑的诊断是

- A. 白血病
- B. 上呼吸道感染
- C. 再生障碍性贫血
- D. 原发免疫性血小板减少症
- E. 过敏性紫癜

61. 李某, 男, 60岁, 口渴欲饮6年. 9月前查体空腹血糖: 8.1mmol/L, 未予重视. 近半年小便频数, 混浊如膏, 甚则饮一溲一, 面色案黑, 耳轮焦干, 腰膝酸软, 形寒畏冷, 阳痿, 舌淡苔白, 脉沉细无力. 其证候应诊断为

- A. 肺热伤津证
- B. 胃热炽盛证
- C. 肾阴亏虚证
- D. 气阴两虚证
- E. 阴阳两虚证

58. 王某, 女性, 46岁. 患者平素头晕头痛, 耳鸣目眩, 突发口眼歪斜, 舌强语謇. 来院诊治. 现症: 头晕头痛, 耳鸣目眩, 左侧肢体无力, 伴有讲话吐字不清, 口舌歪斜, 手足重滞, 半身不遂. 既往高血压病史3年. 查体不合作, 理解力、定向力、记忆力检查欠合作, 言语含糊不清, 左侧鼻唇沟变浅, 口角右歪, 伸舌不合作. 左侧肢体肌张力明显下降, 肌力0级; 共济检查欠合作; 双侧躯体深浅感觉检查欠合作; 四肢腱反射正常存在, 左侧巴氏征阳性. 舌质红苔黄, 脉弦.

辅助检查: 头颅CT: 左小脑高密度影. 首选的治疗方药

为

- A. 天麻钩藤饮
- B. 镇肝熄风汤
- C. 通窍活血汤
- D. 虎潜丸
- E. 大补阴煎

63. 江某, 男性, 31岁, 息粗鼻煽, 喘逆上气. 痰吐稠黏, 咳而不爽, 身痛无汗, 形寒身热, 口渴, 苔薄白、质红, 脉浮数. 治疗方剂宜首选

- A. 麻杏石甘汤
- B. 三子养亲汤
- C. 桑白皮汤
- D. 小青龙汤
- E. 麻黄汤

64. 李某, 女性, 26岁. 胸闷脘痞, 心烦不寐, 泛恶暖气, 伴口苦, 目眩, 头重, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数, 该患者选用的治法是

- A. 益气镇惊, 安神定志
- B. 补益心脾, 养血安神
- C. 滋阴降火, 交通心肾
- D. 疏肝泻火, 镇心安神
- E. 清化痰热, 和中安神

65. 庆某, 女性, 23岁, 近期因工作不顺, 每日排便次数达5-6次, 泄泻肠鸣, 腹痛攻窜, 矢气频作, 伴有胸胁胀闷, 暖气食少, 舌淡红, 脉弦, 该患者治疗首选方药是

- A. 参苓白术散
- B. 葛根芩连汤
- C. 三黄泻心汤
- D. 痛泻要方
- E. 黄连上清丸

66. 钱某, 男性, 65岁, 患鼓胀病多年, 现症见: 腹大胀满, 或见青筋暴露, 唇紫, 面色晦滞, 心烦失眠, 口干而燥, 时或鼻衄, 小便短少, 牙龈出血, 舌质红绛少津、苔少, 脉弦细数. 对该患者的治法为

- A. 温中健脾, 行气利水
- B. 活血化瘀, 行气利水
- C. 温补脾肾, 化气行水
- D. 滋肾柔肝, 养阴利水
- E. 以上都不是

67. 张某, 男性, 48岁, 身目俱黄, 色泽鲜明, 腹部胀满, 发热口渴, 口苦, 口干, 恶心呕吐, 胁胀痛而拒按, 大便秘结, 小便赤黄、短少, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑. 治疗该患者选用的方药为

- A. 茵陈四苓散

- B. 黄芪建中汤
- C. 茵陈术附汤
- D. 茵陈蒿汤
- E. 甘露消毒丹

68. 赵某, 男性, 60岁. 近来胁肋隐痛, 遇劳加重, 悠悠不休, 心中烦热, 口干咽燥, 头晕目眩, 舌红少苔, 脉细弦而数. 该证应选用的治法为

- A. 清热利湿
- B. 养阴柔肝
- C. 祛瘀通络
- D. 疏肝理气
- E. 以上都不是

69. 李某, 女性, 46岁, 水肿多年, 腰以下为甚, 按之不易复起, 脘腹胀闷, 面色萎黄, 纳减便溏, 小便短少, 神倦肢冷. 舌淡胖, 边有齿痕, 舌苔白腻, 脉沉弱, 治疗该患者应选用的方药为

- A. 越婢加术汤
- B. 参苓白术散
- C. 实脾饮
- D. 胃苓汤合五皮饮
- E. 济生肾气丸合真武汤

70. 赵某, 男性, 57岁. 汗出恶风, 周身酸楚, 头痛, 微发热, 苔薄白, 脉浮. 治疗该患者首选

- A. 玉屏风散
- B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- C. 当归六黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 桂枝汤

71. 郑某, 男性, 31岁, 吐血色红或紫暗, 嘈杂不适, 脘腹胀闷, 便秘, 口臭, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 治疗应选用的方药为

- A. 玉女煎合十灰散
- B. 泻心汤合十灰散
- C. 丹参饮合十灰散
- D. 失笑散合四生丸
- E. 白虎汤合四生丸

72. 张某, 女性, 41岁, 腰骶部冷痛重着, "如带五千钱", 活动不利, 不能转侧, 静卧痛不减, 天阴下雨则疼痛尤甚, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉而迟缓. 治疗该患者应选

- A. 散寒行湿, 温经通络
- B. 温补肾阳, 舒筋止痛
- C. 滋补肾阴, 温经通络
- D. 清热利湿, 舒筋止痛
- E. 活血理气, 舒筋止痛

73. 王某, 男, 55岁. 原发性高血压病史3年, 现症:

头晕头痛,口干口苦,面红目赤,烦躁易怒,大便秘结,小便黄赤,舌红苔黄,脉弦.其治疗方法是

- A.平肝潜阳
- B.祛痰降浊
- C.活血化瘀
- D.滋补肝肾,平潜肝阳
- E.温补肾阳

74.吕某,男性,66岁,患者平素头晕头痛,腰酸,3小时前晨起突然发生口眼歪斜,舌强语謇,半身不遂,来院诊治.现症:右侧肢体无力,舌强语謇,口眼歪斜,头晕头痛,耳鸣目眩,膝酸腿软.既往高血压病史3年.查体合作,言语不利,右侧鼻唇沟变浅,口角左歪,伸舌右偏.右侧肢体肌力2级,左侧肢体肌力5级,四肢肌张力基本正常;双侧躯体深浅感觉检查正常;四肢腱反射正常存在,右侧巴氏征阳性.舌质红苔黄,脉弦细而数.辅助检查:头颅CT示:左侧内囊低密度灶.空腹血糖6.2mmol/L,心电图正常.该患者选用的方药为

- A.黄连温胆汤合桃红四物汤
- B.天麻钩藤饮
- C.镇肝息风汤
- D.星萎承气汤
- E.补阳还五汤

75.贾某,男,50岁.反复浮肿,尿血3年.症见:乏力,畏寒肢冷,手足心热,腰膝酸软,舌胖有齿痕,脉沉细.检查:血压140/95mmHg,尿蛋白(++),定量3g/d,尿红细胞21个/高倍视野,内生肌酐清除率47%.其诊断是

- A.慢性肾小球肾炎 阴阳两虚证
- B.慢性肾盂肾炎 阴阳两虚证
- C.慢性肾小球肾炎 肝肾阴虚证
- D.慢性肾小球肾炎肝肾阴虚证
- E.慢性肾小球肾炎 脾肾阳虚证

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(76~78题共用题干)

患者,男,35岁,喝酒后与他人打架,左侧腹部被击中后腹部疼痛剧烈。数分钟后者出现口渴、心慌、烦躁不安,神志模糊,被送至急诊.查体:BP97/70mmHg,P127次/分,听诊心音低钝较弱;全腹有压痛、反跳痛,腹肌轻度抵抗感,叩诊有振水感.腹穿有血性液体.辅助检查:Hb 97g/L.呼吸困难,呼吸音低微,紫绀,大汗淋漓,四肢厥冷;舌淡苔白,脉微弱.

76.该患者首先考虑诊断为

- A.肝破裂
- B.左肾破裂
- C.脾破裂
- D.外伤性血气胸
- E.胃、十二指肠穿孔

77.该患者中医辨证最可能为

- A.血虚气脱证
- B.气脱证
- C.气滞血瘀证
- D.气血两虚证
- E.肝郁气滞证

78.中医治疗应选用的方剂为

- A.复元活血汤
- B.参附汤
- C.四物汤
- D.柴胡疏肝散
- E.当归补血汤合参附汤

(79~81题共用题干)

患者,男,31岁,骑摩托车时不慎被扶手撞到右侧胸部,自觉疼痛逐渐加重,胸闷,呼吸短促,胸胁刺痛,固定不移,面色发青,舌紫暗,脉沉涩.右侧胸部叩诊呈鼓音,呼吸音降低.胸部X线示肺萎陷,胸腔积气.

79.该患者诊断为

- A.闭合性气胸
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.急性肺栓塞
- E.血胸

80.如需进行胸腔穿刺排气,其穿刺点位置应该在

- A.锁骨中线第2肋间
- B.锁骨中线第3肋间

- C. 腋中线第7肋间
- D. 腋后线第7肋间
- E. 腋后线第8肋间

81. 治疗首选的方剂为

- A. 参附汤
- B. 理气止痛汤
- C. 四君子汤
- D. 复元活血汤
- E. 生脉散

(82~84题共用题干)

患者,男,31岁,近3个月出现无痛性间歇性便血、肛中有物脱出,常于疲劳、饮酒后症状加重。多于便后肛门出血,量较多,痔核较大,便时痔核能脱出肛外,便后能自行还纳。现症: 肛内肿物脱出,触之疼痛明显;舌暗红,苔白,脉涩。

82. 首先应考虑的诊断为

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. 血栓性外痔
- E. 结缔组织性外痔

83. 以下哪项治疗方法的本质不是使痔核缺血、坏死并脱落

- A. 结扎术
- B. 冷冻疗法
- C. 枯痔法
- D. 胶圈套扎疗法
- E. 塞药法

84. 该患者治疗宜选用

- A. 凉血地黄汤
- B. 脏连丸
- C. 止痛如神汤
- D. 补中益气汤
- E. 青蒿鳖甲汤合三妙丸

(85~87题共用题干)

患者,女,32岁.GIPIL1A0.现计划妊娠二胎,未避孕,未再孕1年半.患者平素月经量少,50+天一行.平素精神抑郁,胸胁胀满;舌紫暗,边尖有瘀点,脉沉涩.B超示: 双侧卵巢内每个切面可见10余个直径为2~9mm小卵泡.激素测定: LH/FSH值=3,T水平升高.

85. 其诊断是

- A. 排卵障碍性异常子宫出血
- B. 闭经
- C. 多囊卵巢综合征

- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

86. 其证型是

- A. 肾阴虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 肝经湿热证
- D. 痰湿阻滞证
- E. 气滞血瘀证

87. 治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 苍附导痰丸合佛手散

(88~90题共用题干)

赵某,女,29岁,16岁月经初潮,既往月经规律,5天/31天,近4个月月经周期紊乱.初期月经先后无定期,量多或少,曾停经2个半月后突然阴道大量出血,治疗后经量减少,但仍淋漓不净,经血色鲜红而质稠,口燥咽干,心烦潮热,大便干结;舌红,少苔,脉细数.基础体温呈单相型.尿HCG(-).

88. 该患者诊断为

- A. 排卵性月经过多
- B. 子宫内膜不规则脱落
- C. 黄体功能不足
- D. 无排卵性异常子宫出血
- E. 闭经

89. 中医证型为

- A. 肾阳虚证
- B. 脾虚证
- C. 血热-实热证
- D. 血热-虚热证
- E. 血瘀证

90. 治疗方剂是

- A. 清热固经汤
- B. 左归丸合二至丸
- C. 逐瘀止血汤
- D. 固本止崩汤
- E. 保阴煎合生脉散

(91~93题共用题干)

患者,女,31岁,已婚,既往无基础疾病.现孕8个月,

头晕头痛, 耳鸣作响, 颜面潮红, 心悸怔忡, 夜寐多梦, 舌红, 少苔, 脉弦细滑数, 血压150/90mmHg. 蛋白尿阴性。

91. 该疾病的基本病理变化为

- A. 过度水钠潴留
- B. 全身小动脉痉挛
- C. 血液浓缩
- D. 凝血功能障碍, 慢性DIC
- E. 染色体异常

92. 其中医治法为

- A. 健脾温肾, 行水消肿
- B. 理气行滞, 除湿消肿
- C. 滋阴清热, 平肝息风
- D. 滋阴养血, 平肝潜阳
- E. 清热豁痰, 息风开窍

93. 首选方药是

- A. 杞菊地黄丸
- B. 天仙藤散
- C. 白术散合五苓散
- D. 半夏白术天麻汤加钩藤
- E. 牛黄清心丸

(94~96题共用题干)

王某, 女, 1岁. 10天前出现发热等上呼吸道感染症状. 5天前出现呕吐, 随后出现腹泻. 大便呈黄色水样或蛋花汤样. 在家休息观察后, 症状逐渐减轻, 今日未再出现腹泻。

94. 该患儿诊断为

- A. 坏死性肠炎
- B. 金黄色葡萄球菌肠炎
- C. 生理性腹泻
- D. 轮状病毒肠炎
- E. 诺如病毒肠炎

95. 若患儿出现: 泻下过度, 质稀如水, 心烦不安, 目眶及囟门凹陷, 皮肤干燥, 啼哭无泪, 口渴引饮, 小便短少, 唇红而干, 舌红少津, 无苔, 脉细数, 该患儿治疗应选择

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 葛根苓连汤
- C. 人参乌梅汤
- D. 参苓白术散
- E. 藿香正气散

96. 若出现重度脱水, 尤其有明显血容量和组织灌注不足

的症状, 应首选快速应用

- A. 1/3张含钠液
- B. 1/4张含钠液
- C. 2: 1含钠液
- D. 1/2张含钠液
- E. 2/3张含钠液

(97~99题共用题干)

钱某, 女, 6岁. 发热, 咽痛1天后出疹. 皮疹多为散在淡红色斑丘疹. 先见于面部, 一天内波及全身. 伴耳后、枕后及颈部淋巴结肿大. 现症: 壮热口渴, 烦躁不宁, 疹色鲜红, 疹点较密, 小便短赤, 大便秘结, 舌质红, 苔黄糙, 脉洪数.

97. 该患儿诊断为

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 幼儿急疹
- E. 猩红热

98. 中医认为, 本病病位在

- A. 肺卫
- B. 肺胃
- C. 肺脾
- D. 脾胃
- E. 肺脾胃

99. 患儿治疗选方为

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散
- C. 化斑解毒汤
- D. 解肌透痧汤
- E. 凉营清气汤

(100~102题共用题干)

患儿, 男, 7岁, 1年前外出接触花粉后, 出现的喘息、气促、胸闷, 回家后自行缓解. 今日接触冷空气后, 再次出现上述症状且加重, 遂就诊. 检查发现两肺听诊以哮鸣音为主, 呼气延长. 支气管舒张试验阳性. 现症: 咳喘哮鸣, 声高息涌, 痰稠色黄, 发热面红身胸膈满, 渴喜冷饮, 小便黄赤, 大便干燥, 舌红, 舌苔黄腻, 脉象滑数。

100. 该患儿的西医诊断为

- A. 支气管哮喘
- B. 反复呼吸道感染
- C. 支气管肺炎
- D. 急性上呼吸道感染
- E. 合胞病毒肺炎

101. 该患儿首选治疗为

- A. 口服泼尼松
- B. 静脉注射糖皮质激素
- C. 吸入 受体激动剂
- D. 气管插管
- E. 镇静剂

102. 中医治疗首选

- A. 小青龙汤合三子养亲汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 玉屏风散
- D. 六君子汤
- E. 麻杏石甘汤

(103~105题共用题干)

张某, 男性, 54岁. 哮喘病史3年, 每年发作1-2次, 多在冬春季节. 半月前因感受风寒受凉后哮喘复发. 桶状胸, 肋间隙增宽, 双肺叩诊呈过清音, 双肺呼吸音减弱, 可闻及湿啰音, 剑突下可见心尖搏动, 心率99次/分, 律齐, 腹平软, 肝肋下3cm, 剑突下5cm, 质中, 轻度触痛. 双下肢凹陷性水肿. 胸部X线片示: 两肺纹理增多、紊乱, 两肺野透亮度增高, 右心室增大. 心电图: 肺型P波. 超声心动图: 右心室增大, 右心房增大. 现症见: 烦躁, 喘息气粗, 胸满, 黏稠难咯, 溲黄便干, 咳嗽, 痰黄, 口渴, 舌红, 舌苔黄腻, 边尖红, 脉滑数.

103. 该患者的诊断为

- A. 心源性哮喘
- B. 肺气肿
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 慢性阻塞性肺疾病

104. 该患者的中医治法是

- A. 补肺纳肾, 降气平喘
- B. 涤痰开窍, 熄风止痉
- C. 清肺化痰, 降逆平喘
- D. 健脾益肺, 化痰降气
- E. 温肾健脾, 化饮利水

105. 该患者的首选方药为

- A. 涤痰汤加减
- B. 补肺汤加减
- C. 苏子降气汤加减
- D. 越婢加半夏汤加减
- E. 真武汤合五苓散加减

(106~108题共用题干)

肖某, 男性, 56岁. 长期饮酒, 病毒性肝炎病史6年. 近2年来常感疲乏, 1个月前出现腹大, 食欲减退, 进食后上腹部饱胀不适. 检查见黄疸, 肝掌, 蜘蛛痣, 腹部膨隆, 腹壁静脉曲张, 移动性浊音阳性. 肝肋下未抗及, 脾脏肿大. B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大. 现症见: 胁腹刺痛, 腹大胀满, 肋下瘤块, 脉络怒张, 面色晦暗案黑, 面颈可见红点赤缕, 手掌赤痕, 口干不欲饮, 舌质紫暗, 脉细涩.

106. 该患者西医诊断为

- A. 肝血管瘤
- B. 胃癌
- C. 肝硬化
- D. 胃溃疡
- E. 肝癌

107. 该患者证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 肝肾阴虚
- C. 寒湿困脾
- D. 脾肾阳虚
- E. 肝脾血瘀

108. 以下应选用的方药为

- A. 调营饮
- B. 实脾饮
- C. 一贯煎合膈下逐瘀汤
- D. 附子理中汤合五苓散
- E. 中满分消丸合茵陈蒿汤

答案: CE A

解析: 根据患者"长期饮酒, 病毒性肝炎病史6年. 近2年来常感疲乏, 1个月前出现腹大, 食欲减退, 进食后上腹部饱胀不适. 检查见黄疸, 肝掌, 蜘蛛痣, 腹部膨隆, 腹壁静脉曲张, 移动性浊音阳性. 肝肋下未扪及, 脾脏肿大. B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大."诊断为肝硬化. 根据"胁腹刺痛, 腹大胀满, 肋下瘤块, 脉络怒张, 面色晦暗案黑, 面颈可见红点赤缕, 手掌赤痕, 口干不欲饮, 舌质紫暗, 脉细涩."辨证为肝脾血瘀证. 治法为活血化瘀, 化气行水. 方药为调营饮加减

(109~111题共用题干)

王某, 男性, 46岁, 患者半年前无明显诱因出现右上腹钝痛, 为持续性, 有时向右肩背部放射, 纳呆乏力, 噯

气泛酸,体重下降约5kg.查体见慢性病容,腹部膨隆,腹壁静脉曲张,移动性浊音阳性.肝脏于右肋缘下可触及,质硬,有触痛,脾脏肿大,双下肢凹陷性水肿.肝功能: ALT 184IU/L,AST 178IU/L,AFP 880umol/L.B超: 肝右叶实质性占位性病变,肝内外胆管未见扩张.现症见: 形体羸瘦,腹大胀满,积块膨隆,头晕耳鸣,潮热盗汗,腰膝酸软,两胁隐隐作痛,小便短赤,大便干结,舌光剥有裂纹,脉细数.

109. 该患者西医诊断为

- A. 原发性肝癌 肝肾阴虚证
- B. 肝硬化 肝肾阴虚证
- C. 肝硬化脾肾阳虚证
- D. 门静脉高压 脾肾气虚证
- E. 肝性脑病 湿热蕴脾证

110. 该患者中医治法为

- A. 化瘀通络
- B. 养阴柔肝,软坚散结
- C. 疏肝理气,活血化瘀
- D. 清利湿热,化瘀解毒
- E. 滋阴养血,清热化湿

11. 以下应选用的方药为

- A. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- B. 四神丸
- C. 参苓白术散
- D. 逍遥散合桃红四物汤
- E. 滋水清肝饮合鳖甲煎丸

(112~114题共用题干)

张某,女性,30岁.患者于3天前过食辛辣肥甘之品后,出现尿频、尿急、尿道灼痛,未予重视,今日症状加重而来诊治.双肾区无叩痛.舌质红,苔薄黄腻,脉滑数.辅助检查: 尿常规: 尿蛋白(-),尿白细胞8-10个/HP,红细胞3-5个/HP;血常规: WBC $10.2 \times 10^9/L$,N 71%.尿菌培养阳性.泌尿系B超未见异常.现症见: 少腹胀满疼痛,小便不畅,小便灼热刺痛,可见血尿,胸胁苦满,寒热往来,舌质暗红,脉弦.

112. 该患者诊断为

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎急性发作
- C. 慢性肾衰竭
- D. 急性膀胱炎
- E. 急性肾衰竭

113. 该患者中医治法为

- A. 温运脾阳,利水消肿
- B. 滋阴益肾,清热通淋
- C. 清热利湿通淋

D. 健脾补肾

E. 疏肝理气,清热通淋

114. 以下应选用的方药为

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散合石苇散
- C. 知柏地黄丸
- D. 实脾饮
- E. 无比山药丸

(115~117题共用题干)

李某,男,6岁.3日前受凉后出现发热,伴流涕,咽痛.1日前全身皮肤出现瘀点、瘀斑.骨髓象: 巨核细胞数量轻度增加,红系及粒、单核系正常.血象: 血红蛋白110g/L,血小板 $16 \times 10^9/L$.

115. 首先考虑的诊断是

- A. 原发免疫性血小板减少症
- B. 慢性粒细胞性白血病
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 慢性溶血性贫血

116. 本病的首选治疗措施是

- A. 休息及输注血小板
- B. 糖皮质激素
- C. 脾切除
- D. 达那唑治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

117. 若患者紫斑较多,颜色紫红,下肢尤甚,伴头晕目眩,耳鸣,低热,心烦盗汗,齿衄,舌红少津,苔少,脉细数.首选的中医治法是

- A. 益气摄血
- B. 滋阴降火,清热止血
- C. 清热凉血
- D. 健脾养血
- E. 活血化瘀止血

(118~120题共用题干)

王某,男,62岁.高血压病史8年.近3个月来夜尿增多,伴乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退.查体: 轻度贫血貌,血压 175/110mmHg.舌淡红,苔白,有齿痕.脉沉细.肾功能检查: GFR50mL/min,Ccr 65mL/min,Scr255 mol/L.

118. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 肾病综合症
- C. 高血压肾病
- D. 慢性肾衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

119. 以下措施不合理的是

- A. 使用 ACEI 和 ARB 降压
- B. 积极纠正贫血
- C. 蛋白尿控制在 $<0.5\text{g}/24\text{h}$
- D. 低蛋白、低磷饮食
- E. 使用噻嗪类利尿剂

120. 中医治疗方剂选择

- A. 六君子汤加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 参芪地黄汤加减
- D. 杞菊地黄汤加减
- E. 金匱肾气丸加减

(121~123题共用题干)

吕某,女,52岁,两手指间和掌指关节强直不舒3年近2周病情加重,关节疼痛,肿大变形,活动受限,伴发热,口苦,饮食无味,纳呆,全身困乏无力,舌苔黄腻,脉滑数.查血沉 $42\text{mm}/1\text{h}$,类风湿因子(++).

121. 诊断为

- A. 风湿性关节炎
- B. 痛风
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 类风湿关节炎
- E. 骨性关节炎

122. 治法是

- A. 清热利湿,祛风通络
- B. 祛风散寒,清热化湿
- C. 养阴清热,祛风通络
- D. 活血化瘀,祛痰通络
- E. 益肝肾,补气血,祛风湿,通经络

123. 该病的基本病理改变是

- A. 心脏炎
- B. 滑膜炎

B 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(127~128题共用备选答案)

- A. 风毒
- B. 蛇毒内陷
- C. 风火毒
- D. 火毒
- E. 混合毒

- C. 血管炎
- D. 心包炎
- E. 皮炎

(124~126题共用题干)

薛某,男,26岁,患者平素喜食辛辣刺激食物.今日与合伙人应酬饮大量白酒,出现胸脘胀闷,疼痛不适,自服吗丁啉后,症状未缓解.2小时后呕吐紫红色液体两次,每次量约80mL,夹有食物残渣,口臭,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,遂来就诊.查体:腹平软,中上腹有压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未及,肠鸣音7次/分.舌红苔黄,脉滑数.辅助检查:呕吐物隐血(+++);血常规:白细胞 $12.8 \times 10^9/\text{L}$,中性粒细胞73%,血、尿淀粉酶无明显异常。

124. 该患者诊断为

- A. 胃癌气随血脱证
- B. 上消化道出血 胃中积热证
- C. 消化性溃疡脾不统血证
- D. 上消化道出血 肝火犯胃证
- E. 胃癌 肝郁乘脾证

125. 治疗首选的方剂为

- A. 归脾汤
- B. 独参汤
- C. 泻心汤合十灰散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 四味回阳饮

126. 若患者出现乏力、心慌,出血量为

- A. $>5\text{ml}$
- B. $50-100\text{ml}$
- C. $250-300\text{ml}$
- D. $>400-500\text{ml}$
- E. $>1000\text{ml}$

127. 毒蛇咬伤后,局部伤口无红肿,疼痛轻微;全身症状严重,神志模糊,甚至昏迷的属于

128. 毒蛇咬伤后,局部肿痛严重,五官、内脏出血的属于

(129~130题共用备选答案)

- A. 赤游丹

- B.抱头火丹
C.流火
D.内发丹毒
E.腿游风
- 129.新生儿发于臀部的丹毒称为
130.生于小腿足部的丹毒称为
(131~132题共用备选答案)
- A.不超过3小时
B.不超过4小时
C.不超过10小时
D.不超过12小时
E.不超过14小时
- 131.经产妇第一产程
132.初产妇第二产程
(133~134题共用备选答案)
- A.二仙汤合二至丸
B.六味地黄丸
C.知柏地黄汤
D.龙胆泻肝汤
E.五味消毒饮
- 133.外阴炎湿热下注证的选方是
134.外阴炎肝肾阴虚证的选方是
(135~136题共用备选答案)
- A.四妙散
B.葛根黄芩黄连汤
C.银翘散
D.犀角地黄汤
E.知柏地黄丸
- 135.治疗过敏性紫癜阴虚火旺证的方剂是
136.治疗过敏性紫癜湿热痹阻证的方剂是
(137~138题共用备选答案)
- A.高血压,低蛋白血症,水肿
B.高血压,大量蛋白尿
C.血尿,低蛋白血症,高血压
D.血尿,水肿和高血压
E.大量蛋白尿,低蛋白血症,水肿,高脂血症
- 137.以上哪项肾病综合征的主要临床症状
138.以上哪项急性肾小球肾炎的主要临床症状
(139~140题共用备选答案)
- A.肺癌
B.支气管扩张
C.支气管哮喘
D.慢性支气管炎

- E.心源性哮喘
- 139.上述哪项疾病在发作时可闻及散在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长,可经治疗后缓解
140.上述哪项疾病在常咳出粉红色泡沫样痰
(141~142题共用备选答案)
- A.出血倾向及贫血
B.腹壁静脉曲张
C.脾肿大
D.痔静脉曲张
E.腹水
- 141.以上哪项是肝硬化代偿功能减退的最突出体征
142.以上哪项属于肝硬化肝功能减退的临床表现
(143~144题共用备选答案)
- A.>1000ml
B.400~500ml
C.250~300ml
D.50~100ml
E.>5ml
- 143.上消化道出血患者如出现呕血,则出血量约为
144.上消化道出血患者如出现乏力、心慌,则出血量约为
(145~146题共用备选答案)
- A.癫痫典型失神发作
B.癫痫单纯部分性发作
C.癫痫持续状态
D.癫痫不典型失神发作
E.癫痫全面性强直一阵挛发作
- 145.张某,7岁,男孩,吃午饭时,突然意识短暂丧失,双目凝视,面色变白,手中的筷子掉在地下,口角出现细小颤动,持续约15秒后立即清醒.该患者最可能的诊断是
146.李某,男性,12岁.大发作患者,每次连续发作之间意识尚未完全恢复又频繁再发,总时间40分钟左右.该患者最可能的诊断是
(147~148题共用备选答案)
- A.大便时溏时泻,迁延反复,食后脘闷不舒
B.腹痛攻窜,失气频作
C.粪色黄褐,气味臭秽,肛门灼热
D.泄泻清稀,甚则如水样
E.泻下粪便臭如败卵,泻后痛减
- 147.以上哪项是泄泻脾胃虚弱证的特点
148.以上哪项是泄泻食滞肠胃的特点
(149~150题共用备选答案)
- A.祛瘀生新,活血通窍
B.平肝潜阳,清火息风

- C.化痰祛湿,健脾和胃
- D.补益气血,健运脾胃
- E.补益肾精,充养脑髓

149. 以上治法中,治疗眩晕肾精不足证选用的是

150. 以上治法中,治疗眩晕气血亏虚证选用的是

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
- 第二单元 西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
- 第三单元 中西医内科150
- 第四单元 中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
- 第二单元 中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25

