

23 年执业药师《中药一》真题

单选题 1/120 《中国药典》规定

- A. 防己
- B. 洋金花
- C. 川乌
- D. 黄连
- E. 麻黄

您的答案 正确答案 B

2/120 暂无试题

3/120 既能活血通络，又能矫味矫臭的炮制辅料是

- F. 醋
- G. 酒
- H. 姜汁
- I. 蜂蜜
- J. 盐水

您的答案 正确答案 B

解析单选题 4/120 提取热不稳定的中药化学成分宜选用的方法是

- A. 回流提取法
- B. 煎煮法
- C. 渗漉法
- D. 连续回流提取
- E. 水蒸气蒸馏法

您的答案 正确答案 C

5/120 暂无试题

6/120 暂无试题

7/120 暂无试题

8/120 暂无试题

单选题 9/120 散剂按医疗用途

- A. 普通散剂与含毒性药散剂
- B. 分剂量散剂与非剂量散剂
- C. 单味药散剂与复方散剂
- D. 内服散剂与外用散剂
- E. 含低共熔成分散剂与含液体成分散剂

您的答案 正确答案 D

单选题 10/120 关于蜂蜜炼制的说

您的答案 正确答案 B

11/120 暂无试题

单选题 12/120 大鼠灌胃给药后

- A. 橙皮苷
- B. 大豆苷
- C. 金丝桃苷
- D. 木犀草苷
- E. 黄芩苷

您的答案 正确答案 E

13/120 暂无试题

单选题 14/120 主根呈长圆锥形

- A. 金钱草
- B. 紫花地丁
- C. 蒲公英
- D. 车前草
- E. 白花蛇舌草

您的答案 正确答案 B

单选题 15/120 根头略膨大，可见

- A. 党参
- B. 银柴胡
- C. 防风

D. 板蓝根

E. 桔梗

您的答案 正确答案 D

单选题 16/120 糖浆剂中的山梨酸

- A. 3.0~3.5
- B. 3.4~3.8
- C. 4.0~4.5
- D. 5.0~5.5
- E. 4.4~4.8

您的答案 正确答案 E

单选题 17/120 呈结节状扁圆柱形

- A. 天冬
- B. 重楼
- C. 麦冬
- D. 知母
- E. 山药

您的答案 正确答案 B

解析单选题 18/120 碱性最强的化合物

- A. 季铵型小檗碱
- B. 麻黄碱
- C. 可待因
- D. 秋水仙碱
- E. 土的宁

您的答案 正确答案 A

19/120 暂无试题

单选题 20/120 呈不规则块状、片状或盔帽状;表面凹凸不平,

- A. 降香
- B. 沉香
- C. 苏木
- D. 鸡血藤
- E. 大血藤

您的答案 正确答案 B

21/120 暂无试题

单选题 22/120 炉甘石洗剂处方中

- A. 增溶
- B. 乳化
- C. 润湿
- D. 起泡
- E. 助悬

您的答案 正确答案 E

单选题 23/120 略呈类圆四方形;表面暗红色,有光泽;质硬而脆,破碎

- A. 乳香
- B. 没药

C. 血竭

D. 阿魏

E. 儿茶

您的答案 正确答案 C

单选题 24/120 先炒药后加辅料进行炮制的饮片是

- A. 盐杜仲
- B. 酒川芎
- C. 蜜麻黄
- D. 姜厚朴
- E. 醋乳香

您的答案 正确答案 E

单选题 25/120 紫草素的结构类型是

- A. 苯醌
- B. 蒽醌
- C. 菲醌
- D. 萘醌
- E. 蒽酮

您的答案 正确答案 D

单选题 26/120 关于胶囊剂特点的说法,错误的是

- A. 能提高药物的稳定性
- B. 能制成不同释药速度的制剂

- C. 与丸剂比，硬胶囊在胃内崩解慢
- D. 能掩盖药物的不良气味
- E. 能将药物与光线、空气和湿气隔绝

您的答案 正确答案 C

单选题 27/120 吸入气雾剂中药物的主要吸收部位是

- A. 肺泡
- B. 口腔
- C. 咽部
- D. 气管
- E. 支气管

您的答案 正确答案 A

单选题 28/120

呈不规则的厚片，外表面灰白色或淡灰黄色，常有突起的颗粒状小点；切面类白色，略呈

- A. 香加皮
- B. 肉桂
- C. 白鲜皮
- D. 秦皮
- E. 合欢皮

您的答案 正确答案 C

单选题 29/120

关于浸出制剂质量要求的说法，错误的是

- A. 除另有规定外，流浸膏剂每 1ml

相当于原饮片 2-5g

- B. 合剂若加蔗糖，除另有规定外，含糖量一般不是到顶部 20%(g/ml)
- C. 糖浆剂的含糖量应不低于 45%

(g/ml)

- D. 酒剂为澄清液体，允许有少量轻摇易散的沉淀
- E. 除另有规定外，普通中药酊剂每 100ml/相当于原饮片 20g

您的答案 正确答案 A

30/120 暂无试题

单选题 31/120 《中国药典》规定，金银花含量测定的指标成分之一是

- A. 阿魏酸
- B. 丹酚酸
- C. 咖啡酸
- D. 绿原酸
- E. 迷迭香酸

您的答案 正确答案 D

单选题 32/120

在产地加工干燥过程中需时时搓揉，达到油润、饱满、柔软目的的药材是

- A. 人参
- B. 玉竹
- C. 续断
- D. 桔梗

E. 甘草

您的答案 正确答案 B

单选题 33/120

呈类月牙形薄片,外表面紫红色或棕红色,有不规则的深皱纹;切面棕红色;气微清香,味酸的饮片是

- A. 山楂
- B. 瓜蒌
- C. 枳壳
- D. 木瓜
- E. 槟榔

您的答案 正确答案 D

单选题 34/120

关于环糊精包合作用的说法,错误的是

- A. 提高药物的稳定性
- B. 提高药物的靶向性
- C. 减少药物的刺激性
- D. 增加药物的溶解性
- E. 使液体药物粉末化

您的答案 正确答案 B

解析单选题 35/120

三萜皂苷元类化合物结构的共同特点是

- A. 均为四环三萜
- B. 基本母核由 30 个碳原子组成
- C. 均为五环三萜

D. 其中两环以螺缩酮形式相连接

E. C-17 侧链为不饱和内酯环

您的答案 正确答案 B

单选题 36/120

呈棒状,上粗下细,略弯曲;表面密被短柔毛,气清香,味淡、微苦的药材是

- A. 金银花
- B. 丁香
- C. 辛夷
- D. 款冬花
- E. 槐花

您的答案 正确答案 A

37/120 暂无试题

38/120 暂无试题

39/120 暂无试题

40/120 暂无试题

单选题 41/120

具有 1 个侧枝的马鹿茸习称

- A. 四岔
- B. 三岔
- C. 单门
- D. 二杠
- E. 莲花

您的答案 正确答案 C

单选题 42/120

具有 2 个分枝的花鹿茸习称

- A. 四岔
- B. 三岔
- C. 单门
- D. 二杠
- E. 莲花

您的答案 正确答案 B

单选题 43/120

呈类圆形或半圆形的厚片;外表皮淡灰黄色;切面灰白色, 粉性, 有稀疏的放射状纹理, 气微, 味苦的饮片是

- A. 苦参
- B. 续断
- C. 白芍
- D. 牛膝
- E. 防己

您的答案 正确答案 E

单选题 44/120

呈类圆形的薄片;表面淡棕红色或类白色;切面形成层环明显, 可见稍隆起的筋脉纹呈放射状排列;气微, 味微苦、酸的饮片是

- A. 苦参
- B. 续断
- C. 白芍
- D. 牛膝
- E. 防己

您的答案 正确答案 C

单选题 45/120

可用作滴眼剂黏度调节剂的是

- A. 聚乙烯醇
- B. 亚硫酸钠
- C. 苯乙醇
- D. 葡萄糖
- E. 卵磷脂

您的答案 正确答案 A

单选题 46/120

可用作滴眼剂渗透压调节剂的是

- A. 聚乙烯醇
- B. 亚硫酸钠
- C. 苯乙醇
- D. 葡萄糖
- E. 卵磷脂

您的答案 正确答案 D

解析单选题 47/120

可用作滴眼剂抑菌剂的是

- A. 聚乙烯醇
- B. 亚硫酸钠
- C. 苯乙醇
- D. 葡萄糖
- E. 卵磷脂

您的答案 正确答案 C

单选题 48/120

略呈圆柱形, 下部有支根 3~5 条或更多, 表面有纵皱纹及横长皮孔样突

起;质柔韧,断面黄白色或淡棕黄色,有多数棕色点状分泌腔,形成层环黄棕色:有浓郁的香气,味甘、辛、微苦的药材是

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 当归
- D. 藁本
- E. 川芎

您的答案 正确答案 C

单选题 49/120

呈不规则结节状拳形团块;表面有多数平行隆起的轮节,顶端有凹陷的类圆形茎痕;质坚实,断面可见波状环纹及错综纹理,散有黄棕色小油点,气浓香,味苦、辛,稍有麻舌感、微回甜的药材是

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 当归
- D. 藁本
- E. 川芎

您的答案 正确答案 E

单选题 50/120

常用于慢病患者,药效缓和、持久的剂型是

- A. 汤剂

- B. 颗粒剂
- C. 蜜丸
- D. 舌下片
- E. 口服液

您的答案 正确答案 C

单选题 51/120

常用于急症患者,可迅速起效的剂型是

- A. 汤剂
- B. 颗粒剂
- C. 蜜丸
- D. 舌下片
- E. 口服液

您的答案 正确答案 D

单选题 52/120

切片置于载玻片上,滴加 3%氢氧化钠的氯化钠饱和溶液,置显微镜下观察,油室内有针状结晶析出的药材是

- A. 肉桂
- B. 紫苏叶
- C. 丁香
- D. 黄连
- E. 槟榔

您的答案 正确答案 C

单选题 53/120

取少量粉末置载玻片上,滴加 30%硝酸后加盖玻片,置显微镜下观察,可

见针状结晶析出的药材是

- A. 肉桂
- B. 紫苏叶
- C. 丁香
- D. 黄连
- E. 槟榔

您的答案 正确答案 D

单选题 54/120

主产于河南的道地药材是

- A. 白术
- B. 三七
- C. 牛膝
- D. 砂仁
- E. 金钱草

您的答案 正确答案 C

单选题 55/120

主产于四川的道地药材是

- A. 白术
- B. 三七
- C. 牛膝
- D. 砂仁
- E. 金钱草

您的答案 正确答案 E

单选题 56/120

为鲂状、豆状、肾状集合体，呈不规则的扁平块状：暗棕红色或灰黑色，条痕樱红色或红棕色；具“钉头”特

征；气微，味淡的药材是

- A. 自然铜
- B. 硫黄
- C. 雄黄
- D. 朱砂
- E. 赭石

您的答案 正确答案 E

单选题 57/120

多为立方体，表面亮淡黄色，有金属光泽；具条纹，条痕绿黑色或棕红色；体重，断面黄白色，有金属光泽的药材是

- A. 自然铜
- B. 硫黄
- C. 雄黄
- D. 朱砂
- E. 赭石

您的答案 正确答案 A

单选题 58/120

为块状或粒状集合体，呈不规则块状；深红色，条痕淡橘红色，晶面有金刚石样光泽；微有特回到顶部气，味淡的药材是

- A. 自然铜
- B. 硫黄
- C. 雄黄
- D. 朱砂

E. 赭石 70/120 暂无试题

您的答案 正确答案 C 71/120 暂无试题

单选题 59/120 72/120 暂无试题

常用作片剂填充剂的辅料 () 73/120 暂无试题

A. 聚乙二醇 6000 74/120 暂无试题

B. 糊精 75/120 暂无试题

C. 滑石粉 76/120 暂无试题

D. 梭甲淀粉钠 77/120 暂无试题

E. 硬脂酸镁 78/120 暂无试题

您的答案 正确答案 B 79/120 暂无试题

60/120 暂无试题 80/120 暂无试题

61/120 暂无试题 81/120 暂无试题

单选题 62/120 82/120 暂无试题

葛根素的结构类型是 83/120 暂无试题

A. 黄酮 84/120 暂无试题

B. 无 85/120 暂无试题

C. 无 86/120 暂无试题

D. 无 87/120 暂无试题

E. 无 88/120 暂无试题

您的答案 正确答案 A 89/120 暂无试题

63/120 暂无试题 90/120 暂无试题

64/120 暂无试题 91/120 暂无试题

65/120 暂无试题 92/120 暂无试题

66/120 暂无试题 93/120 暂无试题

67/120 暂无试题 94/120 暂无试题

68/120 暂无试题 95/120 暂无试题

69/120 暂无试题 96/120 暂无试题

97/120 暂无试题

98/120 暂无试题

99/120 暂无试题

100/120 暂无试题

101/120 暂无试题

102/120 暂无试题

103/120 暂无试题

104/120 暂无试题

105/120 暂无试题

106/120 暂无试题

107/120 暂无试题

108/120 暂无试题

109/120 暂无试题

110/120 暂无试题

111/120 暂无试题

112/120 暂无试题

113/120 暂无试题

单选题 114/120

药用部位是干燥种子的药材有（）

A. 牵牛子

B. 葶苈子

C. 沙苑子

D. 地肤子

E. 蛇床子

您的答案 正确答案 A

多选题 15/120

关于栀子炮制方法和作用的说法正

确的有（）

A. 栀子炒后京尼平苷含量有所上升

B. 炒栀子比焦栀子苦寒之性略强

C. 炒栀子可缓和対胃的刺激性

D. 炒栀子有清热除烦的功效

E. 栀子长于泻火利湿，凉血解毒

您的答案 正确答案 BCDE

多选题 116/120

中药制剂贮藏过程中，影响其稳定性的因素有（ABCDE）

A. 温度

B. 光线

C. 包装材料

D. 湿度和水分

E. 氧气和金属离子