

## 2023 年临床助理第一单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

A1 型题,每小题 1 分,共 51 分

1. 下列需要临终关怀的患者是

- A. 晚期肿瘤患者
- B. 慢性病患者
- C. 心血管疾病患者
- D. 严重外伤患者
- E. 危重症患者

2. 结肠癌最常见的发病部位是

- A. 直肠
- B. 乙状结肠
- C. 回盲部
- D. 回肠末端
- E. 升结肠

3. 以下属于第二级预防的是

- A. 早期诊断
- B. 健康指导
- C. 人群筛选
- D. 预防接种
- E. 定期体检

4. 治疗胃溃疡最常用的药物为

- A. 法莫替丁
- B. 铝碳酸镁
- C. 奥美拉唑
- D. 雷尼替丁
- E. 胶体秘

5. 生物转化过程中最重要的作用是

- A. 使毒物的毒性降低
- B. 使药物失效
- C. 使生物活性物质灭活
- D. 使某些物质毒性增强
- E. 增强非营养性物质极性, 利于排泄

6. 因对胎儿和婴儿的软骨发育有影响, 孕妇和哺乳期妇女不宜使用的药物是

- A. 喹诺酮类
- B. 氨基糖首类
- C. 四环素类
- D. 磺胺类

- E.青霉素类
- 7.前列腺增生最常见的早期症状
- A.尿潴留  
B.肉眼血尿  
C.尿急  
D.尿频  
E.进行性排尿困难
- 8.急性弥漫性腹膜炎提示病情加重的体征是
- A.肠鸣音减弱或消失  
B.压痛程度加重  
C.恶心呕吐  
D.便秘  
E.腹式呼吸减弱,腹胀加重
- 9.机械性肠梗阻最常见的原因是
- A.炎症性肠炎  
B.术后肠粘连  
C.肿瘤  
D.粪石  
E.蛔虫
- 10.可通过产生激素而导致相应临床表现的肿瘤类型是
- A.甲状腺肉瘤样癌  
B.食管鳞状细胞癌  
C.胃乳头状腺癌  
D.直肠腺鳞癌  
E.肺小细胞癌
- 11.腹外疝内容物回纳后按压住深环,不再复出的疝是下列哪个
- A.腹股沟直疝  
B.腹股沟斜疝  
C.股疝  
D.切口疝  
E.白线疝
- 12.下列关于酶活性中心的说法,正确的是
- A.结合产物的结合基因  
B.结合底物并发挥作用的结合基因  
C.催化底物变成产物的结合基因  
D.一级结构的基因集团  
E.酶活性中心催化基因
- 13.有关于肝性脑病以下措施正确的是
- A.乳果糖导泻灌肠  
B.补充芳香类氨基酸  
C.予苯巴比妥类镇静  
D.给予高蛋白饮食  
E.腹腔积液较多时增加利尿剂用量
- 14.某年某地孕产妇总人数为 600 人,孕产妇死亡人数为 120 人,则该地孕产妇死亡率为

- A.0.15  
B.0.2  
C.0.25  
D.0.3  
E.0.35
15. 治疗反流性食管炎效果最好的药物是  
A.多潘立酮  
B.枸橼酸铋钾  
C.雷尼替丁  
D.铝碳酸镁  
E.奥美拉唑
16. 引起肺动脉主干栓塞的栓子常见于  
A.骨折引起的脂肪栓塞  
B.脱落的左室壁附壁栓子  
C.下肢股静脉脱落的栓子  
D.羊水栓塞  
E.颈静脉破裂的空气栓塞
17. 对确诊肾结核有决定性意义的检查是 A 膀胱镜检查  
B.尿结核杆菌培养  
C.静脉尿路造影  
D.尿液中找抗酸杆菌  
E.CT
18. 慢性肾衰竭患者发生贫血最主要的原因是  
A.骨髓增生低下  
B.促红细胞生成素减少  
C.红细胞寿命减短  
D.营养不良  
E.失血
19. 孕妇贫血最常见于缺乏缺乏下列哪种物质  
A.维生素 B<sub>2</sub>  
B.硫酸亚铁  
C.促红细胞生成素  
D.叶酸  
E.内因子
20. 血清与血浆的主要区别在于  
A.血清易凝固  
B.血清缺乏纤维蛋白原  
C.凝血酶  
D.血液在血液分离的上层
21. 反流性食管炎的首选治疗药物  
A.奥美拉唑  
B.多潘立酮  
C.雷尼替丁  
D.枸橼酸铋钾

- E. 铝碳酸镁
22. 血行转移最常见的是
- A. 子宫颈癌
  - B. 鼻咽癌
  - C. 胃癌
  - D. 乳腺癌
  - E. 绒毛癌
23. 糖原分解得到的初产物是
- A. 丙酮酸
  - B. 葡萄糖-1-磷酸
  - C. 葡萄糖-6-磷酸
  - D. 乙胺丁酸
  - E. 1-磷酸葡萄糖及葡萄糖
24. 国家对传染病的预防方针是什么?
- A. 防治结合
  - B. 预防为主
  - C. 分类管理
  - D. 依靠科学
  - E. 依靠群众
25. 卡托普利治疗慢性心力衰竭的禁忌症
- A. 支气管哮喘
  - B. 消化性溃疡
  - C. 糖尿病
  - D. 双侧肾静脉狭窄
  - E. 心肌缺血
26. 给依法从事终止妊娠的医疗工作机构发放许可证书的是
- A. 省级妇幼保健机构
  - B. 设区的市级妇幼保健机构
  - C. 设区的市级卫生行政部门
  - D. 省级卫生行政部门
  - E. 县级卫生行政部门
27. 在检验病因假设时，以下研究设计论述强度最高的是
- A. 队列研究
  - B. 生态研究
  - C. 病例系统研究
  - D. 现况研究
  - E. 病例对照研究
28. 腹部损伤后，最先查看哪个脏器
- A. 肝、脾
  - B. 小肠
  - C. 胃、十二指肠
  - D. 胰腺
  - E. 盆腔器官
29. 某市进行老年人新型冠状病毒疫苗接种率调查，首先按照经济情况将该地区分为好、中、

差三类，然后在每类中随机抽取 1/10 的老年人进行调查，该方法为

- A. 单纯随机抽样
- B. 分层抽样
- C. 整群抽样
- D. 系统抽样
- E. 多级抽样

30. 医生诊断该患者为癌症，患者态度消极，考虑为

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为减退
- D. 角色行为强化
- E. 角色行为异常

31. 调查乙肝患者中肝癌的发病率，最快的方法是

- A. 病例对照研究
- B. 队列研究
- C. 随机对照研究
- D. 横断面研究
- E. 试验性研究

32. 在社区经过的肺炎中，抗生素实验的疗程的长短，主要依靠于

- A. 外周白细胞和中性粒细胞是否恢复到正常值
- B. 咳嗽咳痰体征是否消失
- C. 肺部体征是否消失
- D. 体温是否恢复正常
- E. 胸部 X 线病灶是否好转

33. 支气管扩张咳血损伤的是哪个血管

- A. 肺毛细血管
- B. 肺小动脉
- C. 肺静脉
- D. 肺大动脉
- E. 支气管静脉

34. 一医师应被暂停执业 3 个月。医师定期考核几年一次

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

35. 妊娠期巨幼细胞性贫血的原因

- A. 铁
- B. 蛋白质
- C. 锌
- D. 叶酸
- E. 维生素 B<sub>2</sub>

36. 女童，4 岁，因父母离婚导致抑郁，适合该患者的心理评估为

- A. 卡特尔测试
- B. 16 型人格测试

C.绘画投射评估

D.抑郁症状评估

E.艾特森人格评估

37.肾病综合征的诊断

A.肾脏超声

B.造影

C.血常规

D.UCG

E.尿常规

38.职业资格调查时，一医师未通过，被暂停执业活动3个月，暂停执业活动期满后再次进行考核，暂停职业活动的时间为

A.5年

B.4年

C.3年

D.1年

E.2年

39.在伦理分科中，医学伦理属于哪类

A.环境伦理

B.元伦理

C.规范伦理

D.应用性伦理

E.描述原理

40.可诊断医院感染的是

A.新生儿住院分娩时感染

B.入院前感染

C.入院时感染

D.入院后感染

E.就诊后感染

41.能够加快 $\beta$ 氧化的是

A.低血糖

B.低血脂

C.血红蛋白

D.高血压

E.高血糖

42.开放性气胸主要的病理生理改变是

A.胸壁反常呼吸运动

B.肺内气体对流

C.纵隔扑动

D.纵隔显著向健侧移位

43.将骨骼肌细胞膜的电变化和肌细胞内的收缩过程耦联起来的关键部位是

A.横管系统

B.纵管系统

C.肌浆

D.纵管终末池

E.三联管结构

44.不能作为医学道德评价依据的是

- A.行为目的
- B.行为动机
- C.行为手段
- D.行为主体
- E.行为效果

45.男, PH7.38, PaCO<sub>2</sub>>67mmHg, PaO<sub>2</sub><50mmHg, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>> 47mmol/L 该患者是什么类型的酸碱失衡

- A.代谢性酸中毒
- B.呼吸性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

46.男孩, 3岁。右侧阴囊内肿块, 光滑有波动感, 右侧睾丸未触及, 卧位时肿块不消失, 透光实验阴性。首先考虑的诊断是

- A.腹股沟疝
- B.精索鞘膜积液
- C.隐睾
- D.睾丸鞘膜积液
- E.交通性鞘膜积液

47.男, 60岁, 乏力明显, 黄疸、消瘦, 下腹膜有肿块

- A.急性胆囊炎
- B.胆囊结石
- C.胆道结石
- D.胰腺癌
- E.胰腺炎

48.患者腹痛行手术治疗, 术中见阑尾黑色

- A.绞窄性阑尾炎
- B.坏疽阑尾炎
- C.穿孔性阑尾炎
- D.阑尾周围脓肿
- E.单纯性阑尾炎

49.女性, 35岁, 乳房进行性胀痛3月, 月经前明显, 孕3产1。查体:肿物囊性, 边界不清, 腋窝未触及肿大淋巴结, 轻压痛考虑诊断为

- A.乳腺癌
- B.乳房纤维腺瘤
- C.乳腺囊性增生病
- D.乳头导管内瘤
- E.急性乳腺炎

50.以下不是通过血液传播的疾病有

- A.乙型肝炎
- B.巨细胞病毒
- C.单纯疱疹病毒

D.艾滋病

E.梅毒

51.男, 25 岁, 由 120 送往医院, 患者昏迷, 需要紧急做手术, 需告知谁

A.管床医生

B.上级医生

C.120

D.警察

E.医院领导

52.空调维修师傅擦拭空调后, 于当天晚上出现呼吸困难, 口唇发绀, 最符合以下哪项中毒的表现

A.一氧化碳中毒

B.二氧化碳中毒

C.氮氧化物

D.硝酸盐

E.氧化氯

53.男, 60 岁, 身体瘙痒, 大便白色乏力纳差 3 周, 既往体健, 偶饮酒。查体:T36.5.P80 次/分, R18 次/分 BP120/80mmHg, 皮肤、巩膜黄染, 未见肝掌、蜘蛛痣, 腹软, 上腹触及边界不清包块, 轻压痛。患者主要的可能诊断是

A.胆囊结石

B.急性病肝炎

C.胰腺癌

D.急性胆管炎

E.胆总管结石

54.男, 63 岁, 体检现肺门占位 1 周, 既往吸烟 30 年。CT 示:右上肺肺门肿块 3x2x2cm, 手术切除右肺上叶, 最可能改变为

A.异细胞增生, 排列成腺样

B.上皮样肉芽肿, 伴干酪样坏死

C.软骨增生, 排列乱, 见支气管上皮陷入

D.上皮样肉芽肿, 伴纤维组织增生

E.异形细胞巢内可见角化珠

55.2015 年调查 1000 名肝炎病人, 其中 600 人患有肝癌, 其中 120 人死于肝癌, 请问 2015 肝癌死亡率为

A.0.3

B.0.2

C.0.15

D.0.4

E.0.25

56.男, 18 岁, 剧烈活动后突发右侧胸痛伴 5 小时, 查体:右胸叩诊呈鼓音, 右侧呼吸音 x 线视气胸腔 70%, 最可能的诊断是

A.原发性自发性气胸

B.自发性支气管破裂

C.发性自发性气胸

D.自发性血胸

E.自发性食管破裂



57.女, 28岁, 咳嗽、咳痰两周, 体温 38°C, 听诊肺部有湿罗音。胸部显示:有外高内低弧形影, 首选应做什么检查

- A.肺活检
- B.痰找结核杆菌
- C.胸水常规加生化
- D.痰培养
- E.CT

58.男性, 车祸外伤撞击到左肋部, 呼吸深快, 血压 110/80mmHg, 腹部穿刺抽出不凝血。此时最可能的诊断是

- A.肝损伤
- B.肾损伤
- C.脾破裂
- D.结肠脾曲破裂
- E.小肠损伤

59.工厂工人食物中毒, 检测发现是食盐问题, 中毒原因是

- A.亚硝酸盐中毒
- B.金黄色葡萄球菌
- C.溶血性链球菌
- D.大肠杆菌
- E.厌氧菌

60.某地区心肌炎频发, 重者心脏衰竭, 是缺乏以下哪种元素

- A.钙
- B.硒
- C.铁
- D.锌
- E.铜

61.女, 59岁, 多发性骨折入院, 血压 70/30mmHg, 给予补充血容量及静脉滴注去甲肾上腺素治疗, 症状缓解, 但滴注处皮肤出现发白、变冷。这时应皮下浸润注射下列哪种药物

- A.阿托品
- B.山莨菪碱
- C.普萘洛尔
- D.普鲁卡因胺
- E.酚妥拉明

62.女, 32岁, 阴道分泌物增多 1月。查体:阴道内稀薄白带。阴道 pH 值为 5, 阴道分泌物线索细胞阳性, 患者首选的治疗药物是

- A.链霉素
- B.甲硝唑
- C.红霉素
- D.氧氟沙星
- E.青霉素

63.男, 65岁, 患再生障碍性贫血 2年, 多次输血治疗。最近 2次输血过程中出现发热, 体温达 39°C 以上, 经对症处理症状缓解。此次拟输血改善贫血症状, 应输注的血液成分是

- A.辐照红细胞
- B.浓缩红细胞

- C.去除白细胞的红细胞  
D.悬浮红细胞  
E.冰冻红细胞
- 64.控制支气管哮喘气道慢性炎症最有效的息
- A.H 受体拮抗剂  
B.M 受体拮抗剂  
C.白三烯调节剂  
D. $\beta$ 受体激动剂  
E.糖皮质激素
- 65.某人做胃镜发现胃窦部有一圆形溃疡边缘平整，活检后最有可能是下列哪种结果
- A.黏膜破损  
B.大量炎性细胞浸润  
C.渗出，增生，肉芽肿  
D.腺上皮肠黏膜化生  
E.异型细胞大量坏死
- 66.男，30岁，因乱开处方被禁止处方权3个月，到期后重新参加考核恢复执业，请问医师定期考核多长时间一次
- A.1年  
B.2年  
C.3年  
D.4年  
E.5年
- 67.连枷胸最突出的症状是
- A.胸膜反常活动  
B.皮下气肿  
C.纵隔扑动  
D.反常呼吸运动  
E.气管偏向患侧
- 68.检查某患者血清滴度，1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:220，预描述其抗体滴度的平均水平，用哪种指标较好
- A.中间平均数  
B.算术平均数  
C.极差  
D.标准差  
E.几何均数
- 69.为了解新型乙肝疫苗和常规乙肝疫苗对 HBSAg 阳性母亲的影响。接种情况表如下都是 1000 人，新型感染是 3 人，感染率是 3%常规感染是 8 人，感染率是 8%，与常规乙肝疫苗相比新型乙肝疫苗的保护率是
- A. $(8\%-3\%)/(8\%+3\%) \times 100\%$   
B. $3\%/(8\%+3\%) \times 100\%$   
C. $8\%/(8\%-3\%) \times 100\%$   
D. $8\%/(8\%+3\%) \times 100\%$   
E. $8\% \times 3\% \times 100\%$
- 70.男性，58岁，上腹隐痛10余年，加重3个月，腹痛无明显规律，伴早饱乏力，近3个

月体重减少 5kg，查体:腹平软，上腹压痛无肌紧张、反跳痛，肝脾未见异常，粪潜血阳性，最可能

- A.胃溃疡
- B.慢性浅表性胃炎
- C.慢性萎缩性胃炎
- D.胃癌
- E.急性糜烂性出血性胃炎

71.男孩，6岁，被妈妈带去动物园游玩回来后给爷爷表演长颈鹿吃树叶和树袋熊喝水。此种记忆属于什么

- A.瞬时记忆
- B.长时记忆
- C.逻辑记忆
- D.短暂记忆
- E.永久记忆

72.女，54岁，腰痛，血尿1年，左肾切除6年，血压180/100mmHg，肌酐值560umol/L，可能的诊断是

- A.血栓
- B.肿瘤
- C.囊破裂
- D.肾结核
- E.肾结石

73.某心理医生成功通过认知治疗挽救一名自杀倾向患者。在某次学术交流会中，该医生用真实姓名介绍这例成功的个案，违背了心理治疗原则

- A.回避原则
- B.理性原则
- C.真诚原则
- D.保密原则
- E.中立原则

74.以下哪一项肺功能测定对阻塞性肺气肿的诊断有决定性意义

- A.RV/TLC>40%，MVV<预计值80%，FEV<sub>1</sub>>正常60%
- B.RV/TLC>40%，MVV>预计值80%，FEV<sub>1</sub><正常60%
- C.RV/TLC>40%，FEV<sub>1</sub><预计值80%，FEV<sub>1</sub>/FVC<正常70%
- D.RV/TLC<40%，MVV<预计值80%，FEV<sub>1</sub>>正常60%
- E.RV/TLC<40%，MVV<预计值80%，FEV<sub>1</sub><正常60%

75.男性，30岁。间歇出现颜面及下肢浮肿已经五年，伴乏力，头痛，查血压180/110mmHg，Hb80g/L，尿蛋白(++)尿红细胞6-8个/HP。下列治疗措施中，不选用

- A.糖皮质激素
- B.氢氯噻嗪
- C.阿司匹林
- D.卡托普利
- E.普萘洛尔

76.女性，44岁，双侧乳房胀痛，月经前加重，查体:T36.5°C，双侧乳房可扣及团块样肿物，表面光滑，边界清楚，可推动。最可能的诊断是

- A.乳腺囊性增生

B.乳腺纤维囊肿

C.乳腺癌

D.急性乳腺炎

E.乳腺脓肿

77.妊娠 29 周，HB70g/L，R20 次/分 P100 次/分，舌乳头消失，光滑，巨细胞呈椭圆形改变，该孕妇需要补充什么

A.脂肪类物质

B.叶酸

C.vitB12

D.葡萄糖类物质

E.胆固醇物质

78.某患者反酸，暖气，胸骨后疼痛，最适合什么治疗

A.奥美拉唑

B.美托洛尔

C.阿司匹林

D.止血药

E.法莫替丁

79.女，16 岁，月经不规律，近期有乏力面色苍白，食欲差等症状。检查：Hb96g/L，MCV60.96fl，该患者首选治疗为

A.硫酸亚铁

B.叶酸

C.维生素 B<sub>12</sub>

D.丙种球蛋白

E.血浆

80.患者女，糖尿病史 10 余年，下肢溃烂入院治疗，医生诊断建议截肢，患者表现神情淡漠，不配合治疗，该患者属于

A.角色行为冲突

B.角色行为异常

C.角色行为缺如

D.角色行为强化

E.角色行为减退

81.男性，30 岁，上腹部疼痛数小时，现出现右下腹疼痛加重，肠鸣音减弱伴有压痛反跳痛，考虑诊断为

A.急性胰腺炎

B.急性阑尾炎

C.急性胆囊炎

D.肠梗阻

E.自发性腹膜炎

82.患者出现上腹部疼痛，伴恶心呕吐呕吐后不缓解，伴尿色深。查体：体温 39.5° C，血压 80/40mmHg，神志模糊巩膜可见黄染，右上腹有深压痛，以下治疗中最重要的治疗措施是

A.镇痛

B.大量补液，补充血容量

C.手术切开胆管减压，T 管引流

D.抗感染

E.利尿

83.老年男性，进行性吞咽困难 6 年，行胃镜检查提示:胃与食管连接数见管壁僵硬，充盈性缺损。考虑诊断为

- A.食管平滑肌瘤
- B.胃食管反流病
- C.慢性胃炎
- D.食管贲门癌
- E.消化道溃疡

84.男性，48 岁，因“咳嗽咳痰 3 年，加重出血 2 天”入院。查体:状指。听诊肺部有固定湿性罗音。该患者出血的原因是

- A.支气管动脉破裂出血
- B.支气管静脉破裂出血
- C.肺脓肿
- D.毛细血管小动脉出血
- E.肺结核

85.女性，52 岁，间断上腹疼痛 3 年。查体:上腹部轻压痛。胃镜示:胃窦皱袋平坦，黏膜粗糙无光泽，黏膜下血管透见。此病例考虑诊断为

- A.消化性溃疡
- B.慢性萎缩性胃炎
- C.非慢性萎缩性胃炎
- D.胃癌
- E.急性胃炎

86.女性，45 岁，饱餐后突发右上腹痛两天，恶心、呕吐胃内容物 1 次。查体:T: 37.3° C。BT130/80mmhg，右上肢压痛无反跳痛，Murphy 征阳性，血 WBC14x10<sup>9</sup>/L，N0.82，为明确诊断首选

- A.腹部 CT
- B.内镜逆行胰胆管造影
- C.腹部立位 x 线平片
- D.腹部 B 超
- E.磁共振肝胆胰

87.男性，70 岁。右腹股沟区肿块 3 周。查体:右腹股沟区触及 3cmx3cm 肿块，质地软，无压痛。肿块在咳嗽时冲击感明显平卧后消失压迫内环站立不再突出。最可能的诊断是

- A.腹股沟脂肪瘤
- B.精索鞘膜积液
- C.腹股沟斜疝
- D.股疝
- E.直疝

88.男性，70 岁，排便次数增加、大便变细 3 月余，血便 2 周，伴有里急后重感，首选的检查是

- A.结肠镜
- B.大便常规
- C.CEA 检查
- D.直肠指检
- E.腹部 CT

89.48 岁中年女性，三年来感上腹部隐痛餐后加重，偶有反酸暖气，无呕吐、便血。口服奥

美拉唑可缓解，餐造影示:胃窦小弯侧充盈缺损，可见 5cm 龛影。诊断考虑

- A.胃癌
- B.胃溃疡
- C.淋巴结炎
- D.慢性胃炎
- E.肠结核

90.一孕妇产检发现是三胞胎，28 周早产住院保胎后，医生建议减胎治疗，建议留胎 1 孩，但家属拒绝。出生后死亡两胎，该医生没有违背的原则是

- A.尊重与不伤害
- B.不利与尊重
- C.有利与公平
- D.有利与尊重
- E.尊重与公正

91.女性，23 岁，咽痛、发热伴咳嗽 2 周颜面水肿 3 天，BP:150/100mmHg，皮肤无皮疹，尿常规及沉渣镜检:尿蛋白(++), RBC: 20~30/高倍视野，血肌酐:115ummol/L，补体 C3 降低，ASO 升高下列不适配的处理措施是

- A.利尿
- B.休息
- C.控制血压
- D.应用抗生素
- E.应用糖皮质激素

92.女性，40 岁，初产妇，分娩发生大出血，予以输血治疗，患者曾有输血既往史，上一次输血曾出现体温升高，达 39° C，经对症处理后好转，现输血应用血液及血液成分是

- A.冰冻解冻去甘油红细胞
- B.浓缩红细胞
- C.去白细胞红细胞
- D.全血
- E.悬浮红细胞

93.男性，46 岁，低热盗汗乏力数天，近期出现腹胀，查体可有柔韧感，移动性浊音阳性。考虑诊断为

- A.结核性腹膜炎
- B.恶性腹膜炎
- C.肝硬化继发性腹水
- D.原发性肝癌
- E.炎性渗出性腹膜炎

94.男性，36 岁，夏季一天下午用硝酸清洗工厂模具突发胸闷，气促，呼吸困难，入院治疗。该患者最可能是吸入什么气体导

- A.氯气
- B.氰化氢
- C.一氧化碳
- D.二氧化碳
- E.氮氧化合物

95.老年男性，大便无色，中上腹部可触及包块，伴消瘦，查体:巩膜黄染，腹部可触及一大小为 5x6cm 包块，考虑诊断为

- A.胆管肿瘤
- B.胰腺肿瘤
- C.慢性胰腺炎
- D.急性胰腺炎
- E.慢性胆囊炎

96.女性，41岁，刺激性干咳、偶尔痰中带血两周，肺部X线检查片状阴影，触诊触及左侧锁骨上两个肿大淋巴结。该患者考虑诊断为

- A.喉癌
- B.淋巴瘤
- C.肺癌
- D.支气管炎
- E.肺淋巴瘤

97.青年男性患者，右上腹痛2小时，伴有高热可见躯体轻度黄染，首先考虑的诊断是

- A.急性胆囊炎
- B.急性阑尾炎
- C.急性梗阻性化脓性胆管炎
- D.急性胰腺炎
- E.急性化脓性梗阻性胆管炎

98.某阑尾炎患者，医师开医嘱头孢克肟49，静脉注射，护士按照医嘱下药，后护士抄写医嘱时发现医师未开皮试，自己也忘记了应观察患者输液后有无异常，该医护人员违背的伦理原则是

- A.知情同意原则
- B.有利原则
- C.尊重原则
- D.患者至上原则
- E.公正原则

99.男性，38岁，肾病综合征1月余，Y腰痛伴双下肢不对称性水肿。为明确诊断下列检查首选

- A.下肢淋巴系统造影
- B.下肢静脉彩超
- C.下肢静脉造影
- D.肾动脉造影
- E.双肾B超

100.男性，18岁，肝硬化病史WBC $18.6 \times 10^9/L$ ，N0.9

- A.低蛋白血症
- B.淋巴水肿
- C.肝静脉水肿
- D.门脉压增高
- E.肝脓肿

101.一小儿发热一周，X片可见双肺有小空洞肺底有细湿罗音，该患儿除了抗菌以外，还需要应用哪种解热药物

- A.对乙酰氨基酚
- B.耐普生
- C.阿托品

D.地西洋

E.美托洛尔

102.女性，18岁，晨起眼睑水肿3个月查体:可见颜面、下肢水肿。尿常规:尿蛋白(++++)，其水肿原因主要考虑

A.毛细血管血压增高

B.血浆胶体渗透压降低

C.淋巴回流受阻

D.组织液静水压降低

E.组织液胶体渗透压升高

103.男性，50岁，突发右脚第一距趾关节剧痛，3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查血尿酸为650 $\mu$ mol/L，尿酸是什么代谢的最终产物

A.核苷酸

B.嘌呤

C.氨基酸

D.嘧啶

E.甘油三酯

104.男性，64岁，咳嗽咳痰，痰中带血可触及锁骨上窝淋巴结肿大，可诊断为

A.腺癌

B.鳞癌

C.小细胞癌

D.大细胞癌

E.类癌

105.患者因休克注射去甲肾上腺素，出现局部疼痛、冰冷、皮肤苍白，需进行局部注射下列哪种药物

A.布比卡因

B.利多卡因

C.酚妥拉明

D.丁卡因

E.普萘洛尔

106.患者男性，37岁，受外伤，有尿意无排尿，心肺体征为阴性，呼吸系统无特殊，骨盆挤压分离试验阳性，考虑为

A.后尿道损伤

B.尿道球部损伤

C.膀胱破裂

D.输尿管损伤

E.肾脏损伤

107.患者男性，呕血黑便两天，虹膜黄染，既往乙肝肝炎病史20年，该患者上消化道出血最可能的原因是

A.胃溃疡

B.十二指肠溃疡

C.食管胃底静脉曲张

D.急性胃炎

E.急性胆囊炎

108.患者上腹部间断疼痛10年，加重3个月，与进食无关，疼痛不规律，消瘦3.2kg。粪隐



血 (+) , 诊断为

- A 十二指肠溃疡
- B.胃癌
- C.慢性胆囊炎
- D.请等待更新
- E.请等待更新

109.患者憋喘数月, 气管左偏, 同吞咽移动, 处理措施

- A.手术治疗
- B.药物治疗
- C.<sup>131</sup>I 放射治疗
- D.请等待更新
- E.请等待更新

110.患者车祸撞击左季肋区, 心率 110 次/分, 血压 120/84mmHg, 腹部压痛, 腹肌稍紧张, 腹部抽出少量不凝液体, 考虑

- A.脾损伤
- B.胰腺损伤
- C.肠破裂
- D.肝损伤
- E.请等待更新

111.女, 68 岁, 排便习惯和排便形状改变 3 个月, 里急后重, 大便带血, 近 1 月出现消瘦, 体重下降约 5kg。腹平软, 无压痛反跳痛。血 CEA: 10.1ng/ml, 首选检查

- A.B 超
- B.肠镜
- C.X 线
- D.直肠指检
- E.粪培养

112.女, 68 岁, 排便习惯和排便形状改变 3 个月, 里急后重, 大便带血, 近 1 月出现消瘦, 体重下降约 5kg。腹平软, 无压痛反跳痛。血 CEA: 10.1ng/ml, 最合理的治疗是

- A 化疗
- B.放疗
- C.免疫制剂
- D.肠造瘘口
- E.根治性切除手术

113.男, 48 岁, 6 小时前聚餐后左上腹剧烈腹痛, 伴恶心呕吐, 疼痛向腰背部放射, 呕吐后疼痛不缓解, 查体:T:38.6 摄氏度, P:100 次/分, 血压 130/90mmhg, 左中上压痛, 肌紧张肠鸣音减反跳痛(-), 移动性浊音 (-), 弱。首选什么检查

- A.血常规
- B.血清、尿淀粉酶
- C.胃镜
- D.腹部 X 线
- E.CT

114.男, 48 岁, 6 小时前聚餐后左上腹剧烈腹痛, 伴恶心呕吐, 疼痛向腰背部放射, 呕吐后疼痛不缓解, 查体:T:38.6 摄氏度, P:100 次/分, 血压 130/90mmhg, 左中上压痛, 肌紧张肠鸣音减反跳痛(-), 移动性浊音 (-), 弱。考虑的疾病是

- A.急性阑尾炎
- B.急性胆囊炎
- C.急性胰腺炎
- D.十二指肠溃疡穿孔
- E.肠梗阻

115.男, 48岁, 6小时前聚餐后左上腹剧烈腹痛, 伴恶心呕吐, 疼痛向腰背部放射, 呕吐后疼痛不缓解, 查体:T:38.6摄氏度, P:100次/分, 血压 130/90mmhg, 左中上压痛, 肌紧张反跳痛(-), 移动性浊音(), 肠鸣音减弱。下列哪项不是该疾病首选的治疗措施?

- A.奥曲肤
- B.急诊手术
- C.雷贝拉坐
- D.头抱呱酮
- E.禁食, 胃肠减压

116.男, 70岁, 咳嗽, 咳痰 10年, 气促 1周。入院, 查体:心率 98次/分, 呼吸 24次/分, 血压 120/80mmhg, 端坐呼吸颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。最可能诊断的是

- A.肺炎
- B.肺结核
- C.慢性阻塞性肺疾病急性发作
- D.肺气肿
- E.肺源性心脏病

117.男, 70岁, 咳嗽, 咳痰 10年, 气促 1周。入院, 查体:心率 98次/分, 呼吸 24次/分, 血压 120/80mmhg, 端坐呼吸颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。不需治疗的是

- A.吸氧
- B.抗感染
- C.强心利尿
- D.应用气管扩张剂
- E.机械通气

118.男, 28岁, 脐周痛伴恶心 8小时转移性右下腹剧烈疼痛, 无呕吐, 排稀便一次, 查体:体温 38°C, 血压 110/80mmHg, 有压痛, 反跳痛, 肌紧张。以下检查对诊断有重要意义的是

- A.血常规
- B.肝功能
- C.粪便常规和隐血
- D.血尿酸淀粉酶
- E.尿常规

119.男, 28岁, 脐周痛伴恶心 8小时转移性右下腹剧烈疼痛, 无呕吐, 排稀便一次, 查体:体温 38°C, 血压 110/80mmHg, 有压痛, 反跳痛, 肌紧张。哪个诊断正确

- A.急性胆囊炎
- B.急性胰腺炎
- C.十二指肠溃疡穿孔
- D.急性肠梗阻
- E.急性阑尾炎

120.对诊断呼吸衰竭最重要的指标是

- A.肺功能

- B.动脉血气分析
- C.CT 肺动脉造影
- D.胸部 x 线
- E.胸部增强 CT

121.鉴别肺门占位最准确的检查

- A.肺功能
- B.动脉血气分析
- C.CT 肺动脉造影
- D.胸部 X 线
- E.胸部增强 CT

122.非静脉曲张上消化道出血治疗用

- A.抑制胃酸
- B.根治幽门螺杆菌
- C.止血药
- D.修护胃黏膜
- E.降低静脉压力

123 防治十二指肠溃疡复发的治疗是

- A.抑制胃酸
- B.根治幽门螺旋杆菌
- C.止血药
- D.修护胃黏膜
- E.降低静脉压力

124.外痔的主要表现是

- A.肛周持续性跳动，肛周皮肤明显红痒
- B.肛门不适，潮湿不洁
- C.肛门疼痛、便秘和出血
- D.间歇性无痛性肛门便后出血
- E.肛旁脓血性或粘液性分泌物排出

125.肛周脓肿的临床表现

- A.肛周持续性跳动，肛周皮肤明显红肿
- B.肛门不适，潮湿不洁
- C.肛门疼痛、便秘和出血
- D.间歇性无痛性肛门便后出血
- E.肛旁脓血性或粘液性分泌物排出

126.临床表现为无痛性肉眼血尿，路造影显示肾盂充盈缺损，诊断为

- A.肾盂癌
- B.肾结石
- C.肾结核
- D.肾细胞瘤
- E.肾积水

127.临床表现为无痛性肉眼血尿，静脉尿路造影显示肾盂拉长，推挤，变形，诊断

- A.肾盂癌
- B.肾结石
- C.肾结核

D.肾细胞瘤

E.肾积水

129.患者食入生鱼胆后出现少尿，尿比重 1.010，尿钠 45mmol/L，最可能的诊断是

A.肾前性肾小球肾炎

B.肾后舍芭奋碍绊捌矮挨竞敬鸞光戕抽互私翱诡小球肾炎

C.急性肾小管坏死

D.急进性肾小球肾炎

E.急性肾间质炎



答案：

1-5ABACE

6-10ACEBE

11-15BCABE

16-20CBBBB

21-25AEBBD

26-30EAABE

31-35DDBBD

36-40BEDCD

41-45ACEED

46-50ADBCC

51-55EECEB

56-60ACCAB

61-65EBCED

66-70BDECD

71-75BADCA

76-80ABAAB

81-85BCDDB

86-90DCDBA

91-95ECAEB

96-100CCDED

101-105ABBCC

106-110ACBAA

111-115DEBCB

116-120EEAEB

121-125EABBA

126-130ADC

